


令和7年度 ウチノ海プランクトン調査（6月25日調査） 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (°C)	塩分	透明度 (m)	細胞/mL	
						シャットネラ オバータ	
1	09:08	0-5			5.8	-	
		0	21.16	32.02			
		1	21.09	32.00			
		5	20.45	32.01			
		10	20.28	32.03			
		B-1	20.28	32.03			
2	09:12	0-5			6.0	-	
		0	21.67	32.05			
		1	21.55	32.05			
		5	20.64	32.19			
		B-1	20.59	32.20			
3'	09:16	0-5			6.0	-	
		0	21.81	32.03			
		1	21.81	32.03		0.01	
		5	20.97	32.11		0.01	
		10	20.43	32.22			
		B-1	20.51	32.20			
4	09:24	0-5			5.9	-	備 考 ・有害種のシャットネラオバータが検出されましたが低密度でした。 ・珪藻はキートセロス属主体で前回調査時より増加しました。 珪藻細胞密度 : 556cells/ml (St.5 0-5m)
		0	21.40	32.06			
		1	21.24	32.08			
		5	20.81	32.12			
		10	20.50	32.20			
5	09:29	0-5			5.9	-	
		0	21.39	32.10			
		1	21.12	32.10		-	
		5	20.56	32.20		-	
		10	20.26	32.27		-	
		B-1	20.35	32.26		-	
6	09:39	0-5			5.5	-	
		0	21.17	32.18			
		1	21.12	32.13			
		5	20.62	32.20			
		10	20.17	32.25			
		B-1	20.26	32.27			