


令和7年度 北灘 有害プランクトン調査（7月3日調査） 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (°C)	塩分	透明度 (m)	細胞/mL			
						シャットネラ アンティーカ	シャットネラ マリーナ	シャットネラ 区分不能	シャットネラ オバータ
2	10:08	0-5			11.0	-	-	-	-
		0	24.88	31.66					
		1	23.63	31.70		-	-	0.01	-
		5	22.65	31.81		-	0.01	-	-
		10	22.03	31.83		-	-	-	0.02
		15	21.66	31.83					
		20	21.43	31.84					
		B-1	21.25	31.85		-	-	-	-
4	09:10	0-5			10.0	-	-	-	-
		0	23.93	31.74		-	-	-	-
		1	23.32	31.73		-	-	0.01	-
		5	22.19	31.82		-	0.01	-	0.10
		10	21.63	31.84		-	-	-	-
		15	21.46	31.86					
		20	21.32	31.90		-	0.01	-	0.10
		25	20.97	32.01					
		30	20.45	32.10		-	-	-	0.01
		35	19.23	32.34					
		40							
		B-1	19.16	32.34		-	0.01	-	0.01
5	09:37	0-5			9.1	0.01	-	0.01	0.13
		0	23.07	31.81					
		1	23.05	31.83		-	-	0.01	0.01
		5	22.04	31.80		-	-	-	-
		10	21.50	31.86		-	0.02	0.01	0.02
		15	21.38	31.88					
		20	21.21	31.96					
		25	20.75	32.08					
		30	20.54	32.20					
		B-1	20.25	32.19		-	-	-	-



備 考

・有害種のシャットネラ属(アンティーカ, マリーナ, 区分不能, オバータ)が検出されましたが低密度でした。

・珪藻はキートセロス属主体で, 前回調査時より減少しました。

珪藻細胞数 St.4(0-5m): 54cells/ml