


令和7年度 ウチノ海環境調査（7月4日調査） 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (°C)	塩分	透明度 (m)	シャットネラ オバータ	コクロディニウム ポリクリコイデス
1	09:01	0-5			5.8	0.22	0.16
		0	23.79	31.92			
		1	23.40	31.84			
		5	22.86	31.93			
		10	22.60	31.94			
		B-1	22.55	31.96			
2	09:05	0-5			6.5	0.01	-
		0	23.55	31.99			
		1	23.23	32.02			
		5	22.46	32.05			
		B-1	22.45	32.06			
3'	09:13	0-5			6.0	-	-
		0	24.72	31.95		0.01	-
		1	23.32	31.99		0.03	-
		5	22.25	32.10		-	-
		10	21.75	32.08			
		B-1	22.03	32.01		0.03	-
4	09:19	0-5			6.2	-	-
		0	23.66	32.02			
		1	23.31	32.06			
		5	22.34	32.10			
		10	22.15	32.11			
5	09:26	0-5			6.5	-	-
		0	23.46	31.99			
		1	22.68	31.89		0.03	-
		5	22.39	32.05		-	-
		10	21.46	32.09		-	-
6	09:36	0-5			6.9	0.01	-
		0	23.37	32.00			
		1	23.05	31.93			
		5	22.60	32.04			
		10	21.76	32.08			
		B-1	21.76	32.08			



備考

・有害種のシャットネラオバータ, コクロディニウム ポリクリコイデスが検出されましたが低密度でした。

・珪藻はキートセロス属主体で前回調査時から減少しました。
珪藻細胞密度 : 87cells/ml (St.5 0-5m)