


令和7年度 北灘 環境調査（7月10日調査） 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (℃)	塩分	透明度 (m)	細胞/mL				
						シャットネラ アンティーカ	シャットネラ マリーナ	シャットネラ 区分不能	シャットネラ オーバータ	コクロディニウム ポリクリコイデス
2	09:29	0-5			7.2	-	-	-	0.01	0.04
		0	25.26	31.84						
		1	25.05	31.79		-	-	-	0.04	-
		5	23.73	31.80		0.01	-	-	0.05	0.25
		10	23.27	31.83		-	-	-	-	-
		15	22.63	31.84						
		20	22.33	31.85						
		B-1	21.14	31.99		-	-	-	-	-
4	09:02	0-5			8.1	-	-	-	-	0.02
		0	24.97	31.77		-	-	-	-	-
		1	24.85	31.79		-	-	-	-	-
		5	24.30	31.84		0.01	0.01	-	0.02	-
		10	22.97	31.85		0.01	0.02	-	0.07	0.47
		15	22.30	31.88						
		20	22.19	32.05		-	-	-	-	-
		25	22.05	32.08						
		30	20.86	32.06		-	-	-	-	-
		35	19.69	32.30						
		40								
		B-1	19.62	32.30		-	-	-	-	0.08
5	09:58	0-5			8.3	-	-	-	-	-
		0	25.91	31.73						
		1	25.33	31.79		-	-	-	-	-
		5	24.70	31.82		-	-	-	0.01	0.16
		10	23.53	31.79		-	-	-	0.04	-
		15	22.85	31.88						
		20	22.58	31.97						
		25	22.63	32.18						
		30	22.01	32.17						
		B-1	19.79	32.29		-	-	-	-	-



備 考

・有害種のシャットネラ属(アンティーカ, マリーナ, オーバータ), コクロディニウム ポリクリコイデスが検出されましたが低密度でした。

・珪藻はキートセロス属主体で, 前回調査時より減少しました。

珪藻細胞数 St.4(0-5m): 50cells/ml