


令和7年度 北灘 有害プランクトン調査（7月17日調査） 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (℃)	塩分	透明度 (m)	細胞/mL				
						シャットネラ アンティーカ	シャットネラ マリーナ	シャットネラ 区分不能	シャットネラ オバータ	コクロディニウム ポリクリコイデス
2		0-5								
		0								
		1								
		5								
		10								
		15								
		20								
		B-1								
4	08:56	0-5			5.7	-	-	-	-	0.05
		0	23.84	31.87		-	-	-	-	0.04
		1	23.83	31.86		-	-	-	-	-
		5	23.82	31.89		-	-	-	-	0.08
		10	23.75	31.95		-	-	-	-	-
		15	23.19	32.00						
		20	22.76	32.11		-	-	-	-	-
		25	22.52	32.18						
		30	22.21	32.19		-	-	-	-	-
		35	21.79	32.19						
		40	20.81	32.28						
		B-1	20.81	32.28		-	-	-	-	-
5		0-5								
		0								
		1								
		5								
		10								
		15								
		20								
		25								
		30								
		B-1								



備 考

- ・st.2及びst.5は荒天のため欠測。
- ・有害種のコクロディニウム ポリクリコイデスが検出されましたが低密度でした。
- ・珪藻はキートセロス属主体で、前回調査時より増加しました。
珪藻細胞数 St.4(0-5m): 432cells/ml