


令和7年度 北灘 環境調査（7月24日調査） 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (℃)	塩分	透明度 (m)	細胞/mL				
						シャットネラ アンティーカ	シャットネラ マリーナ	シャットネラ 区分不能	シャットネラ オバータ	コクロディニウム ポリクリコイデス
2	09:41	0-5			8.1	-	-	-	-	-
		0	26.37	31.85						
		1	26.06	31.88		-	-	-	-	-
		5	25.01	31.87		-	-	-	-	0.06
		10	24.70	31.89		-	-	0.01	-	-
		15	24.30	31.89						
		20	24.01	32.03						
		B-1	23.44	31.96		-	-	-	-	-
4	09:03	0-5			8.6	-	-	-	-	0.08
		0	26.46	31.89		-	-	-	-	-
		1	26.39	31.83		-	-	-	-	-
		5	25.47	31.81		-	-	-	-	0.08
		10	24.51	31.93		-	-	-	-	0.08
		15	24.32	32.00						
		20	23.73	32.04		-	-	-	-	-
		25	23.63	32.07						
		30	23.25	32.06		-	-	-	-	-
		35	22.97	32.10						
		40	22.92	32.12						
		B-1	22.92	32.12		-	-	-	-	-
5	10:07	0-5			8.9	-	-	-	-	0.02
		0	26.98	31.97						
		1	26.43	31.91		-	-	-	-	-
		5	25.76	31.96		-	-	-	-	-
		10	25.66	31.93		-	-	-	-	-
		15	25.27	31.93						
		20	23.92	32.09						
		25	23.60	32.08						
		30	23.18	32.09						
		B-1	22.65	32.11		-	-	-	-	-



備 考

・有害種のシャットネラ属(区分不能)、コクロディニウム ポリクリコイデスが検出されましたが低密度でした。

・珪藻はキートセロス属主体で、前回調査時より減少しました。
珪藻細胞数 St.4(0-5m): 421cells/ml