


令和7年度 北灘 環境調査（7月31日調査）徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (℃)	塩分	透明度 (m)	細胞/mL				
						シャットネラ アンティーカ	シャットネラ マリーナ	シャットネラ 区分不能	シャットネラ オーバータ	コクロディニウム ポリクリコイデス
2	09:36	0-5			9.0	-	-	0.01	0.01	-
		0	26.97	31.86						
		1	26.66	31.83		-	-	-	-	-
		5	26.26	31.87		0.01	-	0.01	0.02	-
		10	25.93	31.86		-	-	-	0.03	-
		15	25.78	31.87						
		20	25.49	31.89						
		B-1	25.24	31.85		-	-	-	0.02	-
4	09:09	0-5			9.0	0.02	-	-	-	-
		0	26.94	31.87		-	-	-	-	-
		1	26.77	31.88		-	-	-	-	-
		5	26.45	31.88		-	-	-	-	-
		10	25.94	31.89		-	-	-	-	-
		15	25.84	31.90						
		20	25.71	31.90		-	-	-	0.01	-
		25	25.32	31.94						
		30	24.49	32.04		-	-	-	-	-
		35	24.26	32.06						
		40	24.11	32.07						
		B-1	24.12	32.07		-	-	-	-	-
5	10:03	0-5			9.1	-	-	-	-	-
		0	27.17	31.88						
		1	26.92	31.83		-	-	-	-	-
		5	26.17	31.84		-	-	-	-	-
		10	25.92	31.86		-	-	0.03	0.02	-
		15	25.74	31.86						
		20	25.62	31.88						
		25	25.21	31.92						
		30	24.53	31.99						
		B-1	24.19	32.03		-	-	-	-	-



備 考

・有害種のシャットネラ属(アンティーカ、区分不能、オーバータ)が検出されましたが低密度でした。

・珪藻はキートセロス属主体で、前回調査時より減少しました。

珪藻細胞数 St.4(0-5m):247cells/ml