

各関係機関長 殿

徳島県立農林水産総合技術支援センター病害虫防除所長
(公 印 省 略)

令和 7 年度農作物病害虫発生予察情報について

令和 7 年度農作物病害虫発生予報第 7 号を発表したので送付します。

令和 7 年度農作物病害虫発生予報第 7 号

令和 7 年 8 月 1 日
徳 島 県

I. 普通作物

普通期水稻

穂いもち

1) 予報内容

発生量 平年より少なく(前年よりやや少ない)、発生程度は「少」

2) 予報の根拠

(1) 7 月第 5 半旬の巡回調査では、葉いもちの発生圃場率が 26.1%と、平年(52.3%)に比べてやや低く、発病度が 0.4 と、平年(4.6)に比べて低い。

(2) 高松地方气象台が 7 月 31 日に発表した 1 か月予報では、気温は平年より高く、降水量はほぼ平年並で、日照時間は平年並か多いと予想されており、発生抑制的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

(1) 葉いもちの発生の多い圃場では、出穂直前までに薬剤防除を行う。

(2) 出穂後曇雨天が続いた場合は穂揃期にも防除を行う。

紋枯病

1) 予報内容

発生量 平年並(前年並)で、発生程度は「少～中」

2) 予報の根拠

(1) 7 月第 5 半旬の巡回調査では、発生圃場率が 30.4%、発病株率が 6.4%と、平年(48.1%、11.3%)並の発生である。

(2) 高松地方气象台が 7 月 31 日に発表した 1 か月予報では、気温は平年より高く、降水量はほぼ平年並で、日照時間は平年並か多いと予想されており、発生助長的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

(1) 粒剤による防除は、出穂 30 日～10 日前頃に行う。

(2) 茎葉散布剤による防除は、幼穂形成期～穂ばらみ期に行う。

セジロウンカ

1) 予報内容

発生量 平年並(前年並)で、発生程度は「少」

2) 予報の根拠

- (1) 7月第5半旬の巡回調査では、発生圃場率が39.1%と、平年(53.4%)並の発生であるが、株当たり寄生虫数は0.1頭と、平年(0.2頭)に比べてやや低い。
- (2) 高松地方気象台が7月31日に発表した1か月予報では、気温は平年より高く、降水量はほぼ平年並で、日照時間は平年並か多いと予想されており、やや発生助長的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

- (1) 今後の発生に十分注意し、特に、苗箱処理剤による防除を行っていない圃場では、防除に努める。

トビイロウンカ

1) 予報内容

発生量 平年並(前年並)で、発生程度は「少」

2) 予報の根拠

- (1) 7月第5半旬の巡回調査では、発生を認めていない(平年同時期は、発生圃場率が0.8%、株当たり寄生虫数が0.0頭)。
- (2) 高松地方気象台が7月31日に発表した1か月予報では、気温は平年より高く、降水量はほぼ平年並で、日照時間は平年並か多いと予想されており、発生助長的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

- (1) 今後の発生に十分注意し、発生を認めたら速やかに防除を行う。

斑点米カメムシ類(アカスジカスミカメ、クモヘリカメムシ等)

1) 予報内容

発生量 平年並(前年より少ない)で、発生程度は「中」

2) 予報の根拠

- (1) 7月第5半旬の水田周辺雑草地における生息調査(1地点当たり捕虫網20回振り)では、23調査地点のうち15地点で生息を確認した。捕獲地点率が65.2%と、平年(72.9%)並の発生であるが、地点当たりの捕獲虫数が6.9頭と、平年(12.3頭)に比べてやや低い。
- (2) 高松地方気象台が7月31日に発表した1か月予報では、気温は平年より高く、降水量はほぼ平年並で、日照時間は平年並か多いと予想されており、発生助長的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

- (1) 斑点米カメムシ類の生息場所となる周辺雑草を、水稻出穂の10~15日前までに除去・処分する。
- (2) 出穂直前の除草は本田内に斑点米カメムシ類を追い込むことになるので行わない。
- (3) 出穂が早い圃場に集中して飛来する傾向があるので、周辺雑草地や本田での発生に注意し、発生を認めたら早急に防除を行う。
- (4) 薬剤散布については、液剤等で出穂期と乳熟期(出穂後約2週間頃)の2回防除を行う。

コブノメイガ

1) 予報内容

発生量 平年並(前年よりやや少ない)で、発生程度は「少」

2) 予報の根拠

- (1) 7月第5半旬の巡回調査では、発生圃場率が8.7%、被害株率が0.5%と、平年(12.4%、0.8%)並の発生である。
- (2) 高松地方気象台が7月31日に発表した1か月予報では、気温は平年より高く、降水量はほぼ平年並で、日照時間は平年並か多いと予想されており、発生助長的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

- (1) 現在葉巻内で加害している老齢幼虫に対しては薬剤の効果が高いので、次世代の若齢幼虫を対象に防除する。
- (2) 過肥田や肥料切れの悪い湿田で多発する傾向があるので、窒素質肥料の施用は控えめにする。

サツマイモ

食葉性害虫(ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウ、ナカジロシタバ等) (うちシロイチモジヨトウは令和7年6月17日付けで注意報発令)

1) 予報内容

発生量 平年よりやや多く(前年並)、発生程度は「中」

2) 予報の根拠

(1) 7月第6半旬の巡回調査では、食葉性害虫による被害発生圃場率が100%、葉の被害度が10.5と、平年(97.9%、17.3)並の発生である。

(2) 7月のフェロモントラップへのハスモンヨトウの誘殺数は、平年に比べてやや少なく推移している(図1)。また、シロイチモジヨトウの誘殺数は、第4半旬までの平均誘殺数が1,009頭と、平年(564頭)の約1.8倍誘殺された(図2)。




図1 ハスモンヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(甘藷圃場)
* 徳島市、鳴門市、松茂町の4地点平均




図2 シロイチモジヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(甘藷圃場)
* 徳島市、鳴門市、松茂町の4地点平均

(3) 高松地方気象台が7月31日に発表した1か月予報では、気温は平年より高く、降水量はほぼ平年並で、日照時間は平年並か多いと予想されており、発生助長的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

(1) 多発すると防除が困難になるので、若齢幼虫時に徹底防除を図る。

ハダニ類(令和7年7月22日付けで注意報発令)

1) 予報内容

発生量 平年より多く(前年より多い)、発生程度は「少～中」

2) 予報の根拠

(1) 7月第6半旬の巡回調査では、発生圃場率が50.0%、寄生葉率は9.1%と、平年(8.3%、0.4%)に比べて高い。

(2) 高松地方気象台が7月31日に発表した1か月予報では、気温は平年より高く、降水量はほぼ平年並で、日照時間は平年並か多いと予想されており、発生助長的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

(1) 多発すると防除が困難になるので、初期防除に努める。

(2) 葉裏にも十分な量の薬液がかかるよう丁寧に散布する。

(3) 薬剤抵抗性が発達する恐れがあるので、同一系統薬剤の連用は避ける。

II. 果樹

カキ

うどんこ病

1) 予報内容

発生量 平年よりやや少なく(前年よりやや少ない)、発生程度は「少」

2) 予報の根拠

(1) 7月第5半旬の巡回調査では、発生圃場率が50.0%と、平年(66.7%)並の発生であるが、発病葉率は1.2%と、平年(7.4%)に比べて低い。

(2) 高松地方気象台が7月31日に発表した1か月予報では、気温は平年より高く、降水量はほぼ平年並

で、日照時間は平年並か多いと予想されており、やや発生助長的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

- (1) 今春、病斑の目立った園および多発生園では、防除を徹底する。

果樹共通

カメムシ類(ツヤアオカメムシ、チャバネアオカメムシ等)

1) 予報内容

発生量 平年より少なく(前年より少ない)、発生程度は「少」

2) 予報の根拠

- (1) 7月第5半旬のカキにおける巡回調査では、被害果を認めていない(平年同時期は、被害果の発生圃場率が6.7%、被害果率が0.3%)。
- (2) 7月第1半旬から第5半旬の予察灯調査において、勝浦町及び上板町の誘殺数は、各種カメムシとも、平年より少なく推移している(表1)。

[ツヤアオカメムシの誘殺数]							[チャバネアオカメムシの誘殺数]								
月	半旬	勝浦町			上板町			月	半旬	勝浦町			上板町		
		2025年	2024年	平年	2025年	2024年	平年			2025年	2024年	平年	2025年	2024年	平年
7	1	2	183	55	1	301	18	7	1	1	448	59	0	373	71
	2	0	107	37	3	350	17		2	0	718	80	0	332	73
	3	0	123	49	0	128	12		3	2	307	68	6	111	28
	4	7	144	51	1	295	24		4	3	547	119	3	334	63
	5	3	45	44	0	121	9		5	2	340	78	0	480	37
	6		66	76		168	19		6		745	177		413	62
8	1		47	73		104	12	8	1		368	120		301	31
	2		13	80		74	22		2		265	123		250	38

表1 果樹カメムシ類の予察灯による誘殺数推移

- (3) 高松地方気象台が7月31日に発表した1か月予報では、気温は平年より高く、降水量はほぼ平年並で、日照時間は平年並か多いと予想されており、発生助長的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

- (1) 果樹園周辺の雑木林から成虫が飛来するので、園内を巡回し飛来に注意するとともに、飛来を認めたら早急に防除を行う。
- (2) 夜行性なので、薬剤の散布は夕方か早朝に実施すると効果が高い。
- (3) 移動性が大きいので、広域一斉防除により防除効果の向上に努める。

Ⅲ. 野菜

夏秋ナス

うどんこ病

1) 予報内容

発生量 平年よりやや多く(前年より多い)、発生程度は「少」

2) 予報の根拠

- (1) 7月第5半旬の巡回調査では、発生圃場率が25.0%と、平年(14.2%)並の発生であるが、発病葉率は1.6%と、平年(0.6%)に比べてやや高い。
- (2) 高松地方気象台が7月31日に発表した1か月予報では、気温は平年より高く、降水量はほぼ平年並で、日照時間は平年並か多いと予想されており、やや発生助長的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

- (1) 窒素質肥料の過用を避ける。
- (2) 落葉した罹病葉は適切に処分する。
- (3) 病斑が進展し葉の表面が菌叢で覆われると、薬液が弾かれ防除効果が劣るので、展着剤を利用する。
- (4) 多発すると防除が困難になるので初期防除に努める。

アブラムシ類

1) 予報内容

発生量 平年よりやや少なく(前年より少ない)、発生程度は「少」

2) 予報の根拠

- (1) 7月第5半旬の巡回調査では、発生を認めていない(平年同時期は、発生圃場率が8.1%、1葉当たりの寄生虫数が0.0頭)。
- (2) 高松地方気象台が7月31日に発表した1か月予報では、気温は平年より高く、降水量はほぼ平年並で、日照時間は平年並か多いと予想されており、発生助長的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

- (1) 多発すると防除が困難になるので、初期防除に努める。
- (2) 葉裏や芯芽に寄生しているため、薬液が葉裏にも十分付着するよう丁寧に散布する。
- (3) 薬剤抵抗性が発達する恐れがあるので、同一系統の薬剤の連用は避ける。

ハダニ類

1) 予報内容

発生量 平年より多く(前年より多い)、発生程度は「少～中」

2) 予報の根拠

- (1) 7月第5半旬の巡回調査では、発生圃場率が50.0%と、平年(29.9%)に比べてやや高く、寄生葉率が10.1%と、平年(3.3%)に比べて高い。
- (2) 高松地方気象台が7月31日に発表した1か月予報では、気温は平年より高く、降水量はほぼ平年並で、日照時間は平年並か多いと予想されており、発生助長的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

- (1) 多発すると防除が困難になるので初期防除に努める。
- (2) 葉裏にも十分な量の薬液がかかるよう丁寧に散布する。
- (3) 薬剤抵抗性が発達する恐れがあるので、同一系統の薬剤の連用は避ける。

アザミウマ類

1) 予報内容

発生量 平年並(前年並)で、発生程度は「少」

2) 予報の根拠

- (1) 7月第5半旬の巡回調査では、発生圃場率が50.0%、寄生葉率が0.9%と、平年(49.4%、1.6%)並の発生である。なお、被害果実は認めていない(平年同時期は、発生圃場率が14.1%、被害果率が0.7%)。
- (2) 高松地方気象台が7月31日に発表した1か月予報では、気温は平年より高く、降水量はほぼ平年並で、日照時間は平年並か多いと予想されており、発生助長的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

- (1) 多発すると防除が困難になるので、初期防除に努める。
- (2) 花器、新葉、葉裏、葉の重なった部分などに集まる習性があるので、それらの部分に薬液が十分かかるよう丁寧に散布する。
- (3) 薬剤抵抗性が発達する恐れがあるので、同一系統の薬剤の連用は避ける。

オオタバコガ(令和7年5月15日付けで注意報発令)

1) 予報内容

発生量 平年より多く(前年よりやや多い)、発生程度は「中」

2) 予報の根拠

- (1) 7月第5半旬の巡回調査では、産下卵確認圃場率が75.0%、100葉当たり平均卵数が1.5個と、平年(27.9%、0.4個)に比べて高い。なお、幼虫による被害果実の発生圃場率が28.6%、被害果率が0.3%と、平年(5.6%、0.1%)に比べて高い。
- (2) 7月のフェロモントラップへの誘殺数は、第4半旬までの平均誘殺数が130頭と、平年(68.2頭)の約1.9倍誘殺された(図3)。




図3 オオタバコガ フェロモントラップ誘殺数推移
*阿波市、三好市、東みよし町、石井町の6地点平均

(3)高松地方気象台が7月31日に発表した1か月予報では、気温は平年より高く、降水量はほぼ平年並で、日照時間は平年並か多いと予想されており、発生助長的な気象条件である。

3)防除上注意すべき事項

- (1)被害部位(果実、花蕾)や剪定後の茎葉には卵や幼虫が付着している可能性があるため、圃場外に持ち出して適切に処分する。
- (2)果実や茎、花蕾に食入した幼虫や発育が進んだ幼虫に対しては薬効が著しく低下するので、若齢幼虫主体の時期に薬剤防除を行う。
- (3)本虫は作物の花蕾や生長点付近の新葉に1個ずつ産卵するので、寄生部位を注意深く観察してから防除する。

秋冬ネギ

ネギアザミウマ

1)予報内容

発生量 平年並(前年並)、発生程度は「少」

2)予報の根拠

- (1)7月第5半旬の巡回調査では、発生圃場率が55.6%、被害度は3.3と、平年(54.7%、2.1)並の発生である。
- (2)高松地方気象台が7月31日に発表した1か月予報では、気温は平年より高く、降水量はほぼ平年並で、日照時間は平年並か多いと予想されており、発生助長的な気象条件である。

3)防除上注意すべき事項

- (1)多発すると防除が困難になるので、初期防除に努める。

シロイチモジヨトウ

1)予報内容

発生量 平年より少なく(前年より少ない)、発生程度は「少」

2)予報の根拠

- (1)7月第5半旬の巡回調査では、発生を認めていない(平年同時期は、発生圃場率が34.7%、寄生株率が1.4%)。
- (2)高松地方気象台が7月31日に発表した1か月予報では、気温は平年より高く、降水量はほぼ平年並で、日照時間は平年並か多いと予想されており、発生助長的な気象条件である。

3)防除上注意すべき事項

- (1)幼虫の齢期が進むと薬剤の効果が著しく低下するので、早期発見に努め、若齢幼虫時に防除を行う。

ネギハモグリバエ

1) 予報内容

発生量 平年よりやや少なく(前年よりやや多い)、発生程度は「少」

2) 予報の根拠

(1) 7月第5半旬の巡回調査では、発生圃場率が33.3%と、平年(60.0%)に比べてやや低く、被害度は0.2と、平年(3.1)に比べて低い。

(2) 高松地方気象台が7月31日に発表した1か月予報では、気温は平年より高く、降水量はほぼ平年並で、日照時間は平年並か多いと予想されており、発生助長的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

(1) 多発すると防除が困難になるので、初期防除に努める。

(2) 被害葉は発生源となるので、絶対に圃場周辺に野積み・放置せず、速やかに処分する。

IV. その他

1) 防除にあたっては、圃場をよく観察し、適期を逃さないようにする。

2) 薬剤の使用にあたっては必ず使用基準を遵守し、周辺作物等へ飛散しないように注意する。

発生量の表示

発生程度：甚>多>中>少>無

発生量：多い>やや多い>並>やや少ない>少ない

徳島県立農林水産総合技術支援センター病害虫防除所

URL：<https://www.pref.tokushima.lg.jp/tafftsc/t-boujoso/>

○ 病害虫の発生予察情報、発生状況、防除法等をお知らせしています。