

令和7年度発生予察月報(7月)

徳島県立農林水産総合技術支援センター
病害虫防除所

I. 気象概況 (徳島地方気象台観測値)

	平均気温(℃)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	本年	平年	差	本年	平年	差	本年	平年	差
上旬	29.9	25.5	+ 4.4	0.0	65.8	- 65.8	104.9	48.5	+ 56.4
中旬	28.4	26.9	+ 1.5	174.0	69.1	+ 104.9	73.5	61.2	+ 12.3
下旬	29.2	28.0	+ 1.2	1.5	42.1	- 40.6	125.3	82.7	+ 42.6

※本年下旬の値は7/21-7/30のデータで計算しています(7/31のデータは入っていません)。

II. 病害虫の発生状況

[普通作物]

早期イネ

徳島市、小松島市、阿南市、美波町、海陽町調査: 7/10、11

病害虫名	発生程度別圃場数						発生圃場率(%)	発生程度指数*	調査項目及び発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
葉いもち	12	6	0	0	0	18	33.3	8.3	発病度:	1.3
(東部沿岸)	11	3	0	0	0	14	21.4	5.4		0.8
(南部)	1	3	0	0	0	4	75.0	18.8		3.0
紋枯病	14	4	0	0	0	18	22.2	5.6	発病度:	1.3
もみ枯細菌病	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発病穂率(%):	0.0
ばか苗病	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発病株率(%):	0.0
縞葉枯病	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発病株率(%):	0.0
"	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発病度:	0.0
ヒメトビウンカ	10	8	0	0	0	18	44.4	11.1	虫数/株(頭):	0.0
(東部沿岸)	9	5	0	0	0	14	35.7	8.9		0.1
(南部)	1	3	0	0	0	4	75.0	18.8		0.0
ニカメイガ	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	被害株率(%):	0.0
セシロウンカ	7	11	0	0	0	18	61.1	15.3	虫数/株(頭):	0.1
(東部沿岸)	7	7	0	0	0	14	50.0	12.5		0.1
(南部)	0	4	0	0	0	4	100.0	25.0		0.1
トビイロウンカ	16	2	0	0	0	18	11.1	2.8	虫数/株(頭):	0.0
ツマグロヨコバイ	14	4	0	0	0	18	22.2	5.6	虫数/株(頭):	0.0
(東部沿岸)	11	3	0	0	0	14	21.4	5.4		0.0
(南部)	3	1	0	0	0	4	25.0	6.3		0.1
斑点米カメムシ類 (雑草地調査)	12	3	3	0	0	18	33.3	12.5	虫数/20フリ(頭):	1.5
(東部沿岸)	8	3	3	0	0	14	42.9	16.1		1.9
(南部)	4	0	0	0	0	4	0.0	0.0		0.0
フタオビコヤガ	16	2	0	0	0	18	11.1	2.8	虫数/株(頭):	0.0
(東部沿岸)	12	2	0	0	0	14	14.3	3.6		0.0
(南部)	4	0	0	0	0	4	0.0	0.0		0.0
コブノメイガ	15	2	1	0	0	18	16.7	5.6	被害株率(%):	1.6
(東部沿岸)	12	2	0	0	0	14	14.3	3.6		0.6
(南部)	3	0	1	0	0	4	25.0	12.5		5.0
黄化萎縮病	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発病度:	0.0
ごま葉枯病	17	1	0	0	0	18	5.6	1.4	発病度:	0.1
白葉枯病	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発病度:	0.0
萎縮病	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発病株率(%):	0.0
イチモンシセセリ	17	1	0	0	0	18	5.6	1.4	苞数/25株(個):	0.1
イネクロカメムシ	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	虫数/25株(頭):	0.0

早期イネ

徳島市、小松島市、阿南市、美波町、海陽町調査: 7/25、29

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
穂 い も ち	14	4	0	0	0	18	22.2	5.6	発 病 穂 率 (%)	0.0
(東 部 沿 岸)	10	4	0	0	0	14	28.6	7.1		0.1
(南 部)	4	0	0	0	0	4	0.0	0.0		0.0
紋 枯 病	12	6	0	0	0	18	33.3	8.3	発 病 度 :	1.9
(東 部 沿 岸)	9	5	0	0	0	14	35.7	8.9		2.1
(南 部)	3	1	0	0	0	4	25.0	6.3		1.5
ば か 苗 病	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発 病 株 率 (%)	0.0
(東 部 沿 岸)	14	0	0	0	0	14	0.0	0.0		0.0
(南 部)	4	0	0	0	0	4	0.0	0.0		0.0
縞 葉 枯 病	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発 病 株 率 (%)	0.0
(東 部 沿 岸)	14	0	0	0	0	14	0.0	0.0		0.0
(南 部)	4	0	0	0	0	4	0.0	0.0		0.0
縞 葉 枯 病	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発 病 度 :	0.0
(東 部 沿 岸)	14	0	0	0	0	14	0.0	0.0		0.0
(南 部)	4	0	0	0	0	4	0.0	0.0		0.0
ヒメトビウンカ	9	9	0	0	0	18	50.0	12.5	虫 数 / 株 (頭)	0.1
(東 部 沿 岸)	7	7	0	0	0	14	50.0	12.5		0.1
(南 部)	2	2	0	0	0	4	50.0	12.5		0.0
ニ カ メ イ ガ	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	被 害 株 率 (%)	0.0
(東 部 沿 岸)	14	0	0	0	0	14	0.0	0.0		0.0
(南 部)	4	0	0	0	0	4	0.0	0.0		0.0
セ シ ´ ロ ウ ン カ	7	11	0	0	0	18	61.1	15.3	虫 数 / 株 (頭)	0.1
(東 部 沿 岸)	5	9	0	0	0	14	64.3	16.1		0.1
(南 部)	2	2	0	0	0	4	50.0	12.5		0.0
ト ヒ ´ イ ロ ウ ン カ	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	虫 数 / 株 (頭)	0.0
(東 部 沿 岸)	14	0	0	0	0	14	0.0	0.0		0.0
(南 部)	4	0	0	0	0	4	0.0	0.0		0.0
ツ マ グ ロ ヨ コ バ イ	15	3	0	0	0	18	16.7	4.2	虫 数 / 株 (頭)	0.0
(東 部 沿 岸)	11	3	0	0	0	14	21.4	5.4		0.0
(南 部)	4	0	0	0	0	4	0.0	0.0		0.0
斑点米カメムシ類	10	4	4	0	0	18	44.4	16.7	虫 数 /20 フリ (頭)	1.3
(本 田 調 査)										
(東 部 沿 岸)	8	3	3	0	0	14	42.9	16.1		1.4
(南 部)	2	1	1	0	0	4	50.0	18.8		1.3
フタオビコヤガ	17	1	0	0	0	18	5.6	1.4	虫 数 / 株 (頭)	0.0
(東 部 沿 岸)	13	1	0	0	0	14	7.1	1.8		0.0
(南 部)	4	0	0	0	0	4	0.0	0.0		0.0
コ ブ ノ メ イ ガ	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	上 位 2 葉 の 被 害 葉 率 (%)	0.0
(東 部 沿 岸)	14	0	0	0	0	14	0.0	0.0		0.0
(南 部)	4	0	0	0	0	4	0.0	0.0		0.0
黄 化 萎 縮 病	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発 病 度 :	0.0
ご ま 葉 枯 病	16	2	0	0	0	18	11.1	2.8	発 病 度 :	0.9
白 葉 枯 病	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発 病 度 :	0.0
萎 縮 病	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発 病 株 率 (%)	0.0
イチモンシ´セセリ	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	苞 数 /25 株 (個)	0.0
イネクロカメムシ	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	虫 数 /25 株 (頭)	0.0

東部沿岸 : 徳島市(川内町、不動西町)、阿南市(那賀川町、山口町、新野町、長生町、中林町、福井町、見能林町)
小松島市(櫛渚町、立江町、田野町)
南 部 : 美波町(西河内)、牟岐町(辺川)、海陽町(四方原、多良)

普通期イネ

藍住町、板野町、上板町、阿波市、美馬市、吉野川市、石井町、東みよし町、三好市調査：7/10、11

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
葉 い も ち	16	7	0	0	0	23	30.4	7.6	発 病 度 :	0.8
(北 中 部)	9	4	0	0	0	13	30.8	7.7		0.5
(西 部)	7	3	0	0	0	10	30.0	7.5		1.2
紋 枯 病	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 株 率 (%):	0.0
(北 中 部)	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0		0.0
(西 部)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0		0.0
ば か 苗 病	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 株 率 (%):	0.0
(北 中 部)	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0		0.0
(西 部)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0		0.0
縞 葉 枯 病	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 株 率 (%):	0.0
(北 中 部)	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0		0.0
(西 部)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0		0.0
縞 葉 枯 病	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 度 :	0.0
(北 中 部)	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0		0.0
(西 部)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0		0.0
ヒメトビウンカ	11	12	0	0	0	23	52.2	13.0	虫 数 / 株 (頭):	0.1
(北 中 部)	4	9	0	0	0	13	69.2	17.3		0.1
(西 部)	7	3	0	0	0	10	30.0	7.5		0.1
ニ カ メ イ ガ	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	被 害 株 率 (%):	0.0
セ シ ` ロ ウ ン カ	20	3	0	0	0	23	13.0	3.3	虫 数 / 株 (頭):	0.0
(北 中 部)	10	3	0	0	0	13	23.1	5.8		0.0
(西 部)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0		0.0
ト ヒ ` イ ロ ウ ン カ	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	虫 数 / 株 (頭):	0.0
(北 中 部)	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0		0.0
(西 部)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0		0.0
ツ マ グ ロ ヨ コ バ イ	14	9	0	0	0	23	39.1	9.8	虫 数 / 株 (頭):	0.1
(北 中 部)	5	8	0	0	0	13	61.5	15.4		0.1
(西 部)	9	1	0	0	0	10	10.0	2.5		0.0
斑点米カメムシ類 (雑草地調査)	6	6	3	7	1	23	73.9	40.2	虫 数 /20 フリ (頭):	16.0
(北 中 部)	3	2	3	5	0	13	76.9	44.2		6.9
(西 部)	3	4	0	2	1	10	70.0	35.0		27.9
フタオビコヤガ	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	幼 虫 数 / 株 (頭):	0.0
(北 中 部)	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0		0.0
(西 部)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0		0.0
コブノメイガ	22	1	0	0	0	23	4.3	1.1	被 害 株 率 (%):	0.2
(北 中 部)	12	1	0	0	0	13	7.7	1.9		0.3
(西 部)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0		0.0
黄化萎縮病	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 度 :	0.0
ごま葉枯病	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 度 :	0.0
白葉枯病	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 度 :	0.0
萎 縮 病	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 株 率 (%):	0.0
イチモンシセセリ	22	1	0	0	0	23	4.3	1.1	苞 数 /25 株 (個):	0.0
イネクロカメムシ	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	虫 数 /25 株 (頭):	0.0
イネシンガレセンチュウ	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	被 害 株 率 (%):	0.0

普通期イネ

藍住町、板野町、上板町、阿波市、美馬市、吉野川市、石井町、東みよし町、三好市調査：7/24、25

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
葉 い も ち	16	7	0	0	0	23	30.4	7.6	発 病 度 :	0.4
(北 中 部)	9	4	0	0	0	13	30.8	7.7		0.3
(西 部)	7	3	0	0	0	10	30.0	7.5		0.6
紋 枯 病	16	4	2	1	0	23	30.4	12.0	発 病 株 率 (%):	6.4
(北 中 部)	10	1	1	1	0	13	23.1	11.5		6.8
(西 部)	6	3	1	0	0	10	40.0	12.5		6.0
ば か 苗 病	22	0	0	1	0	23	4.3	3.3	発 病 株 率 (%):	0.7
(北 中 部)	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0		0.0
(西 部)	9	0	0	1	0	10	10.0	7.5		1.6
縞 葉 枯 病	22	1	0	0	0	23	4.3	1.1	発 病 株 率 (%):	0.3
(北 中 部)	12	1	0	0	0	13	7.7	1.9		0.6
(西 部)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0		0.0
縞 葉 枯 病	22	1	0	0	0	23	4.3	1.1	発 病 度 :	0.1
(北 中 部)	12	1	0	0	0	13	7.7	1.9		0.2
(西 部)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0		0.0
ヒメトビウンカ	11	12	0	0	0	23	52.2	13.0	虫 数 / 株 (頭):	0.1
(北 中 部)	5	8	0	0	0	13	61.5	15.4		0.2
(西 部)	6	4	0	0	0	10	40.0	10.0		0.0
ニ カ メ イ ガ	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	被 害 株 率 (%):	0.0
セ シ ` ロ ウ ン カ	14	9	0	0	0	23	39.1	9.8	虫 数 / 株 (頭):	0.1
(北 中 部)	7	6	0	0	0	13	46.2	11.5		0.1
(西 部)	7	3	0	0	0	10	30.0	7.5		0.0
ト ヒ ` イ ロ ウ ン カ	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	虫 数 / 株 (頭):	0.0
(北 中 部)	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0		0.0
(西 部)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0		0.0
ツ マ グ ロ ヨ コ バ イ	15	8	0	0	0	23	34.8	8.7	虫 数 / 株 (頭):	0.1
(北 中 部)	6	7	0	0	0	13	53.8	13.5		0.1
(西 部)	9	1	0	0	0	10	10.0	2.5		0.0
斑点米カメムシ類 (雑草地調査)	8	3	8	3	1	23	65.2	34.8	虫 数 /20 フリ (頭):	6.9
(北 中 部)	5	2	6	0	0	13	61.5	26.9		3.6
(西 部)	3	1	2	3	1	10	70.0	45.0		11.1
フタオビコヤガ	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	幼 虫 数 / 株 (頭):	0.0
(北 中 部)	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0		0.0
(西 部)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0		0.0
コ ブ ノ メ イ ガ	21	2	0	0	0	23	8.7	2.2	被 害 株 率 (%):	0.5
(北 中 部)	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0		0.0
(西 部)	8	2	0	0	0	10	20.0	5.0		1.2
黄 化 萎 縮 病	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 度 :	0.0
ご ま 葉 枯 病	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 度 :	0.0
白 葉 枯 病	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 度 :	0.0
萎 縮 病	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 株 率 (%):	0.0
イチモンシ`セセリ	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	苞 数 /25 株 (個):	0.0
イネクロカメムシ	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	虫 数 /25 株 (頭):	0.0
イネシンガ`レセンチュウ	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	被 害 株 率 (%):	0.0

北中部： 板野郡(藍住町、板野町、上板町)、阿波市(吉野町、土成町、市場町)、吉野川市(鴨島町、山川町)
 名西郡石井町
 西部： 東みよし町、三好市

サツマイモ

徳島市、鳴門市、松茂町調査：7/10

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
食 葉 性 害 虫	3	13	0	0	0	16	81.3	20.3	被 害 度	: 4.3
イ モ キ バ ガ	11	5	0	0	0	16	31.3	7.8	被 害 葉 率 (%)	: 0.6
ア ブ ラ ム シ 類	16	0	0	0	0	16	0.0	0.0	寄 生 株 率 (%)	: 0.0
ハ ダ ニ 類	4	10	1	1	0	16	75.0	23.4	寄 生 葉 率 (%)	: 14.6

サツマイモ

徳島市、鳴門市、松茂町調査：7/29

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
食 葉 性 害 虫	0	15	1	0	0	16	100.0	26.6	被 害 度	: 10.5
イ モ キ バ ガ	11	5	0	0	0	16	31.3	7.8	被 害 葉 率 (%)	: 0.7
ハ ダ ニ 類	8	6	2	0	0	16	50.0	15.6	寄 生 葉 率 (%)	: 9.1
立 枯 病	16	0	0	0	0	16	0.0	0.0	発 生 面 積 率 (%)	: 0.0
タハ'ココナシ'ラミ	11	4	0	0	1	16	31.3	12.5	寄 生 株 率 (%)	: 9.0

[果 樹]

温州ミカン

徳島市、勝浦町、佐那河内村調査: 7/14

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
アブラムシ類	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	寄 生 新 梢 率 :	0.0
ミカンハダニ	4	4	0	0	0	8	50.0	12.5	春 葉 の 寄 生 率 :	4.4

スダチ

徳島市、神山町、佐那河内村、勝浦町調査: 7/14

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
か い よ う 病	1	7	0	0	0	8	87.5	21.9	果 実 の 発 病 程 度 :	1.2
アブラムシ類	7	1	0	0	0	8	12.5	3.1	寄 生 新 梢 率 :	0.2
ミカンハダニ	5	3	0	0	0	8	37.5	9.4	春 葉 の 寄 生 率 :	2.5
ミカンハモグリガ	2	6	0	0	0	8	75.0	18.8	寄 生 葉 率 :	2.0
ゴマダラカミキリ	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	10樹当たり寄生虫数(頭):	0.0

ナシ

鳴門市、松茂町調査: 7/10

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
黒 星 病	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	発 病 葉 率 (%):	0.0
〃	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	発 病 果 率 (%):	0.0
カメムシ類	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	被 害 果 率 (%):	0.0
ナシヒメシシクイ	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	被 害 果 率 (%):	0.0
ハダニ類	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	寄 生 葉 率 (%):	0.0
ハマキムシ類	2	2	2	1	1	8	75.0	40.6	被 害 果 率 (%):	18.8
うどんこ病	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	葉 の 発 病 程 度 :	0.0

カキ

上板町、つるぎ町、東みよし町調査: 7/24、25

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
炭 疽 病	6	0	0	0	0	6	0.0	0.0	新 梢 発 病 率 (%):	0.0
カキノヘタムシガ	6	0	0	0	0	6	0.0	0.0	被 害 果 率 (%):	0.0
フシ'コナカイカ'ラムシ	4	1	0	1	0	6	33.3	16.7	寄 生 果 率 (%):	1.5
チャノキイロアサ'ミウマ	6	0	0	0	0	6	0.0	0.0	被 害 果 率 (%):	0.0
カキクダ'アサ'ミウマ	6	0	0	0	0	6	0.0	0.0	被 害 果 率 (%):	0.0
カメムシ類	6	0	0	0	0	6	0.0	0.0	被 害 果 率 (%):	0.0
ハマキムシ類	6	0	0	0	0	6	0.0	0.0	被 害 果 率 (%):	0.0
うどんこ病	3	3	0	0	0	6	50.0	12.5	発 病 葉 率 (%):	1.2
イ ラ ガ	6	0	0	0	0	6	0.0	0.0	寄 生 葉 率 (%):	0.0

[野 菜]

夏秋ナス

阿波市、美馬市、三好市調査：7/10、11

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度 指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
う ど ん こ 病	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	発 病 度 : 0.0
アブラムシ類	7	1	0	0	0	8	12.5	3.1	1葉当たりの寄生虫数(頭): 0.0
ハスモンヨトウ	2	6	0	0	0	8	75.0	18.8	被 害 度 : 2.3
〃	7	1	0	0	0	8	12.5	3.1	被 害 果 率 (%) : 2.3
ハ ダ ニ 類	7	1	0	0	0	8	12.5	3.1	寄 生 葉 率 (%) : 0.1
オオタバコガ	7	1	0	0	0	8	12.5	3.1	100葉当たりの卵数(個): 0.1
〃	4	4	0	0	0	8	50.0	12.5	被 害 果 率 (%) : 0.6
青 枯 病	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	発 病 株 率 (%) : 0.0
褐色腐敗病	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	発 病 果 率 (%) : 0.0
ニシ'ュウヤホシテントウ	4	4	0	0	0	8	50.0	12.5	被 害 葉 率 (%) : 0.8

夏秋ナス

阿波市、美馬市、三好市調査：7/24、25

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度 指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
う ど ん こ 病	6	2	0	0	0	8	25.0	6.3	発 病 度 : 1.6
アブラムシ類	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	1葉当たりの寄生虫数(頭): 0.0
ハスモンヨトウ	3	5	0	0	0	8	62.5	15.6	被 害 度 : 1.5
〃	3	5	0	0	0	8	62.5	15.6	被 害 果 率 (%) : 1.5
ハ ダ ニ 類	4	2	2	0	0	8	50.0	18.8	寄 生 葉 率 (%) : 10.1
アザミウマ類	4	4	0	0	0	8	50.0	12.5	寄 生 葉 率 (%) : 0.9
〃	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	被 害 果 率 (%) : 0.0
オオタバコガ	2	5	1	0	0	8	75.0	21.9	100葉当たりの卵数(個): 1.5
〃	6	2	0	0	0	8	25.0	6.3	被 害 果 率 (%) : 0.3
青 枯 病	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	発 病 株 率 (%) : 0.0
褐色腐敗病	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	発 病 果 率 (%) : 0.0
ニシ'ュウヤホシテントウ	4	4	0	0	0	8	50.0	12.5	被 害 葉 率 (%) : 1.6

秋冬ネギ

徳島市調査: 7/25

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率 (%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
黒 斑 病	8	1	0	0	0	9	11.1	2.8	発 病 度	: 0.1
ネギアザミウマ	4	4	0	1	0	9	55.6	19.4	被 害 度	: 3.3
ハスモンヨトウ	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	寄 生 株 率 (%)	: 0.0
シロイチモジヨトウ	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	寄 生 株 率 (%)	: 0.0
〃	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	寄 生 虫 数 (頭)	: 0.0
ネギハモグリバエ	6	3	0	0	0	9	33.3	8.3	被 害 度	: 0.2

冬春イチゴ

徳島市、小松島市、阿南市、佐那河内村、阿波市調査: 7/10

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目および発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
炭 疽 病	11	2	0	0	0	13	15.4	3.8	発 病 株 率 (%)	: 0.1
ハ ダ ニ 類	5	8	0	0	0	13	61.5	15.4	寄 生 株 率 (%)	: 4.6
萎 黄 病	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0	発 病 株 率 (%)	: 0.0

ハ ス

徳島市、鳴門市、板野町調査: 7/25、29

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*		
	無	少	中	多	甚	合計				
ハスモンヨトウ	5	2	0	0	0	7	28.6	7.1	被 害 葉 率 (%)	: 0.6
褐 斑 病	5	2	0	0	0	7	28.6	7.1	発 病 度	: 0.1

注1)発生程度指数*は以下の式より求めている。

$$\text{発生程度指数} = \frac{(\text{少} \times 1 + \text{中} \times 2 + \text{多} \times 3 + \text{甚} \times 4)}{\text{調査圃場数} \times 4} \times 100$$

各種フェロモントラップ




図1 ナシヒメシンクイムシ フェロモントラップ誘殺数推移
※鳴門市、松茂町の7地点平均




図2 ナシヒメシンクイムシ フェロモントラップ誘殺数推移
※無防除圃場(農総技支センター上板)




図3 3種果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ)フェロモントラップ誘殺数(石井町)




図4 予察灯による果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ)の誘殺数(勝浦町)




図5 予察灯による果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ)の誘殺数(上板町)




図6 オオタバコガ フェロモントラップ誘殺数推移
*阿波市・三好市・東みよし町・石井町の6地点平均




図7 ハスモンヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(野菜圃場)
*徳島市・石井町・阿波市・吉野川市・東みよし町・三好市の9地点平均




図8 シロイチモジヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(野菜圃場)
*徳島市・石井町・阿波市・吉野川市の7地点平均




図9ハスモンヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(甘藷圃場)
* 徳島市・鳴門市・松茂町の4地点平均




図10 シロイチモジヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(甘藷圃場)
* 徳島市・鳴門市・松茂町の4地点平均