令和7年度　播磨灘広域共同調査（6月23日調査）　徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層(m)	水温(℃)	塩分	透明度(m)	シャットネラ オバータ	ディノフィシス アキュミナータ	ディノフィシス ロツンダータ	アレキサンドリウム sp.
T4	08:21	0-5			8.5	−	−	−	0.07
		0	21.84	31.95					
		1	21.79	31.94		−	−	−	−
		5	19.76	32.24		−	−	−	0.04
		10	19.29	32.29		−	0.02	0.02	0.04
		15	18.96	32.33					
		20	18.64	32.31		−	−	−	−
		25	17.91	32.40					
		30	16.81	32.44		−	−	−	−
		B-1	16.70	32.45		−	−	−	−
T1	08:53	0-5			8.9	−	0.01	−	−
		0	22.56	31.87					
		1	22.54	31.87		−	−	0.02	−
		5	20.44	32.07		−	−	−	0.04
		10	19.87	32.12		−	−	−	0.02
		15	19.72	32.37					
		20	19.13	32.38					
		25	18.34	32.44					
		30	18.23	32.46					
		B-1	18.24	32.45		−	−	−	−
St.4	09:07	0-5			7.5	−	−	−	−
		0	21.63	31.73		0.01	−	−	−
		1	20.88	31.95		−	−	−	0.01
		5	20.58	31.97		−	−	−	−
		10	20.06	31.97		−	−	−	−
		15	19.61	32.03					
		20	19.21	32.18		−	−	−	0.02
		25	18.69	32.30					0.01
		30	18.41	32.47		−	−	−	−
		35	18.29	32.49					
		B-1	18.29	32.49		−	0.01	−	−



・有害種のシャットネラ オバータが検出されましたが、低密度でした。

・ 麻痺性貝毒原因種のアレキサンドリウム属が検出されましたが低密度でした。

・下痢性貝毒原因種であるディノフィシス属（ロツンダータ、アキュミナータ）が検出されましたが低密度でした。

・ 珪藻はキートセロス属主体で前回調査時より増加しました。

珪藻細胞数
St.4(0-5m): 1,177cells/ml
T4(0-5m): 365cells/ml