令和7年度　播磨灘広域共同調査（6月30日調査）　徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層(m)	水温(℃)	塩分	透明度(m)	細胞/mL					
						シャットネラアンティーカ	シャットネラマリーナ	シャットネラオバータ	カレニアミキモトイ	シャットネラグロボーサ	コクロディニウムポリクリコイデス
T4	08:18	0-5			9.2	−	−	−	−	−	0.04
		0	23.01	31.95							
		1	22.39	31.80		−	−	−	−	−	−
		5	21.75	32.14		−	−	0.02	−	−	−
		10	21.58	32.18		−	−	−	−	−	0.16
		15	21.36	32.22							
		20	21.08	32.22		−	−	−	−	−	−
		25	20.96	32.24							
		30	20.68	32.24		−	−	−	−	−	−
		B-1	20.00	32.25		−	−	−	−	−	−
T1	08:49	0-5			10.5	−	−	−	−	−	0.32
		0	22.66	31.96							
		1	22.19	31.97		−	−	−	−	−	−
		5	21.53	32.08		−	−	−	−	−	−
		10	21.18	32.18		−	−	−	−	−	−
		15	21.04	32.23							
		20	20.64	32.23							
		25	20.22	32.22							
		30									
		B-1	20.11	21.75		−	−	−	−	−	−
St.4	09:02	0-5			10.5	−	−	−	−	−	−
		0	24.25	31.76		−	−	−	−	−	−
		1	23.81	31.77		−	−	−	−	−	−
		5	21.90	31.78		−	−	−	−	−	−
		10	21.16	31.87		−	−	0.05	−	−	−
		15	20.82	31.92							
		20	20.60	31.99		−	−	−	−	−	−
		25	20.70	32.22							
		30	20.36	32.22		−	−	0.02	−	−	−
		35	18.78	21.14							
		B-1	18.81	21.10		−	−	−	−	−	−



・有害種のシャットネラ オバータが検出されましたが低密度でした。

・有害種のコクロディニウム ポリクリコイデスが検出されましたが低密度でした。

・ 珪藻はキートセロス属主体で前回調査時より減少しました。

珪藻細胞数
St.4(0-5m): 192cells/ml
T4(0-5m): 23cells/ml