

令和7年度 播磨灘広域共同調査（7月7日調査） 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (°C)	塩分	透明度 (m)	細胞/mL				播磨灘
						シャットネラ アンティーカ	シャットネラ マリーナ	シャットネラ オバータ	コクロディニウム ポリクリコイデス	
T4	08:24	0-5			13.0	-	0.01	0.06	-	播磨灘
		0	25.71	31.87						
		1	25.77	31.85		-	-	-	-	
		5	25.28	31.79		-	-	0.02	-	
		10	23.65	32.11		-	-	-	0.36	
		15	22.35	31.99						
		20	22.14	32.01		-	-	-	-	
		25	22.00	32.18						
		30	22.00	32.20		-	-	-	-	
		B-1	19.67	32.28		-	-	-	-	
T1	08:53	0-5			12.4	-	-	-	0.12	・有害種のシャットネラ属(アンティーカ, マリーナ, オバータ)が検出されましたが低密度でした。 ・有害種のコクロディニウム ポリクリコイデスが検出されましたが低密度でした。 ・珪藻は,St.4ではキートセロス属主体で前回調査時より増加しましたが,T4では減少しました。 珪藻細胞数 St.4(0-5m): 81cells/ml T4(0-5m): 8cells/ml
		0	25.83	31.87						
		1	25.55	31.80		-	-	-	-	
		5	25.19	31.97		-	-	-	-	
		10	23.80	31.99		-	-	0.02	0.06	
		15	22.82	32.13						
		20	22.37	32.17						
		25	22.20	32.20						
		30	22.13	32.21						
		B-1	22.02	32.22		-	-	0.02	-	
St.4	09:07	0-5			12.4	-	-	-	-	
		0	25.59	31.81		-	-	-	-	
		1	25.50	31.82		-	-	-	-	
		5	25.28	31.83		-	0.01	0.05	-	
		10	23.01	31.84		-	-	0.02	0.06	
		15	22.34	31.83						
		20	21.79	32.00		0.01	-	0.11	-	
		25	21.85	32.17						
		30	21.49	32.18		-	-	-	-	
		35	21.13	32.20						
		B-1	20.39	32.15		-	-	-	-	