

令和7年度 播磨灘広域共同調査（7月14日調査） 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (℃)	塩分	透明度 (m)	細胞/mL					
						シャットネラ アンティーカ	シャットネラ マリーナ	シャットネラ 区分不能	シャットネラ オバータ	カレニア ミキモトイ	コクロディニウム ポリクリコイデス
T4	08:29	0-5			6.2	-	-	-	-	-	0.16
		0	24.17	32.11							
		1	24.17	32.11		-	-	-	-		
		5	24.13	32.12		-	-	-	-		
		10	23.97	32.12		-	-	-	-		
		15	23.26	32.18							
		20	23.01	32.23		-	-	-	-		
		25	22.98	32.23							
		30	22.60	32.25		-	-	-	-		
		B-1	21.87	32.21		-	-	-	-		
T1	08:59	0-5			6.0	-	-	-	-	-	-
		0	24.04	32.01							
		1	24.04	32.00		-	-	-	-	0.28	
		5	24.02	32.00		-	-	-	-	-	
		10	23.75	32.13		-	-	-	-	-	
		15	23.27	32.22							
		20	22.78	32.25							
		25	22.63	32.26							
		30	21.50	32.20							
		B-1	20.14	32.29		-	-	-	-	-	
St.4	09:14	0-5			5.2	-	-	-	-	-	0.75
		0	23.82	31.98		-	-	-	-	-	0.79
		1	23.82	31.98		-	-	-	-	-	0.06
		5	23.75	31.98		-	-	-	-	-	-
		10	22.74	32.10		-	-	-	-	-	0.08
		15	22.75	32.26							
		20	22.59	32.21		-	-	-	-	-	-
		25	21.47	32.22							
		30	20.36	32.26		-	-	-	0.01	-	-
		35	20.08	32.29							
		B-1	20.03	32.30		-	-	-	-	-	-

播磨灘

◎ T4

◎ T1

◎ St.4

大浦 栗田 折野

淡路島

・有害種のシャットネラ オバータ、コクロディニウム ポリクリコイデスが検出されましたが低密度でした。

・珪藻は、T4はシュードニッチア属主体、St.4はキートセロス属主体で、前回調査時から増加しました。

珪藻細胞数
St.4(0-5m): 170cells/ml
T4(0-5m): 115cells/ml