

令和7年度 播磨灘広域共同調査（7月28日調査） 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層(m)	水温(℃)	塩分	透明度(m)	細胞/mL					
						シャットネラアンティーカ	シャットネラマリーナ	シャットネラ区分不能	シャットネラオーバータ	カレニアミキモトイ	コクロディニウムポリクリコイデス
T4	08:31	0-5			7.0	-	-	-	-	-	-
		0	25.40	32.06							
		1	25.38	32.07		-	-	-	-	-	-
		5	25.24	32.10		-	-	-	-	-	-
		10	25.22	32.14		-	-	-	-	-	-
		15	25.21	32.14							
		20	25.20	32.15		-	-	-	-	-	-
		25	25.20	32.15							
		30	25.20	32.16		-	-	-	-	-	-
		B-1	25.20	32.16		-	-	-	-	-	-
T1	09:01	0-5			8.5	-	-	-	0.01	-	-
		0	25.90	32.05							
		1	25.63	32.04		-	-	-	0.02	-	-
		5	25.54	32.07		-	-	-	-	-	-
		10	25.48	32.04		-	-	-	-	-	-
		15	25.38	32.07							
		20	25.10	32.06							
		25	24.80	32.09							
		30	23.79	32.07							
		B-1	23.77	32.08		-	-	-	-	-	-
St.4	09:16	0-5			8.0	-	-	-	0.02	-	-
		0	25.60	31.99		-	-	-	-	-	-
		1	25.55	32.00		-	-	-	0.03	-	-
		5	25.33	32.01		-	-	0.01	0.01	-	-
		10	25.09	32.01		-	-	-	-	-	-
		15	24.70	32.04							
		20	24.47	32.07		-	-	-	-	-	-
		25	23.95	32.07							
		30	23.85	32.08		-	-	-	-	-	-
		35	23.73	32.08							
		B-1	23.73	32.08		-	-	-	-	-	-

播磨灘

◎ T4

◎ T1

◎ St.4

大栗田

折浦野

淡路島

・有害種のシャットネラ属(区分不能、、オーバータ)が検出されましたが低密度でした。

・珪藻はキートセロス属主体で前回調査時より増加しました。

珪藻細胞数
St.4(0-5m): 831cells/ml
T4(0-5m): 169cells/ml