

令和7年度 播磨灘広域共同調査（8月4日調査） 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (℃)	塩分	透明度 (m)	細胞/mL					
						シャットネラ アンティーカ	シャットネラ マリーナ	シャットネラ 区分不能	シャットネラ オーバータ	カレニア ミキモトイ	コクロディニウム ポリクリコイデス
T4	08:31	0-5			9.8	-	0.01	0.01	0.02	-	-
		0	27.82	32.07							
		1	27.82	32.07		-	-	-	-	-	-
		5	27.31	32.05		-	-	-	-	-	-
		10	26.17	32.24		-	-	-	-	-	-
		15	26.09	32.23							
		20	25.94	32.22		-	-	-	-	-	-
		25	25.30	32.18							
		30	24.57	32.06		-	-	-	-	-	-
		B-1	22.59	32.12		-	-	-	-	-	-
T1	09:06	0-5			10.4	-	-	-	-	-	-
		0	28.37	31.92							
		1	28.33	31.92		-	-	-	-	-	-
		5	28.04	31.91		-	-	-	-	-	-
		10	25.99	31.91		-	-	-	0.02	-	-
		15	25.77	32.00							
		20	25.26	32.07							
		25	25.07	32.14							
		30	24.35	32.12							
		B-1	24.08	32.12		-	-	0.06	0.02	-	-
St.4	09:21	0-5			9.5	0.01	-	-	-	-	-
		0	28.37	31.92		-	-	-	-	-	-
		1	28.27	31.93		-	-	-	-	-	-
		5	27.18	31.85		-	-	-	-	-	-
		10	26.43	31.88		-	-	-	0.05	-	-
		15	26.21	31.91							
		20	25.90	31.92		0.01	-	-	0.03	-	-
		25	24.91	31.98							
		30	24.45	32.04		-	-	-	-	-	-
		35	23.91	32.07							
		B-1	23.89	32.07		-	-	-	-	-	-

播磨灘

◎ T4

◎ T1

◎ St.4

大栗田

折浦野

淡路島

・有害種のシャットネラ属(アンティーカ、区分不能、マリーナ、オーバータ)が検出されましたが低密度でした。

・珪藻はキートセロス属主体で前回調査時より増加しました。

珪藻細胞数
T4(0-5m): 362cells/ml
St.4(0-5m): 546cells/ml