

令和7年度発生予察月報(8月)

徳島県立農林水産総合技術支援センター
病虫害防除所

I. 気象概況 (徳島地方気象台観測値)

	平均気温(℃)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	本年	平年	差	本年	平年	差	本年	平年	差
上旬	29.9	28.5	+ 1.4	50.0	90.7	- 40.7	75.3	80.3	- 5.0
中旬	29.1	28.4	+ 0.7	39.5	51.4	- 11.9	59.3	73.5	- 14.2
下旬	-	27.6	-	-	50.8	-	-	76.8	-

※本年中旬の値は8/11-8/17のデータで計算しています(8/18-8/20のデータは入っていません)。

II. 病虫害の発生状況

[普通作物]

早期イネ

徳島市、小松島市、阿南市、美波町、牟岐町、海陽町調査: 8/12,14

病虫害名				発生程度別圃場数						発生圃場率(%)	発生程度指数*	調査項目及び発生の特徴	
				無	少	中	多	甚	合計				
穂	い	も	ち	9	6	0	0	0	15	40.0	10.0	発病穂率(%):	0.4
紋		枯	病	11	4	0	0	0	15	26.7	6.7	発病度:	1.4
稲	こ	う	じ	15	0	0	0	0	15	0.0	0.0	発病株率(%):	0.0
縞	葉		枯	15	0	0	0	0	15	0.0	0.0	発病株率(%):	0.0
		〃		15	0	0	0	0	15	0.0	0.0	発病度:	0.0
ニ	カ	メ	イ	15	0	0	0	0	15	0.0	0.0	被害株率(%):	0.0
セ	シ	・	ロ	12	3	0	0	0	15	20.0	5.0	虫数/株(頭):	0.0
ト	ヒ	・	イ	15	0	0	0	0	15	0.0	0.0	虫数/株(頭):	0.0
ツ	マ	グ	ロ	12	3	0	0	0	15	20.0	5.0	虫数/株(頭):	0.0
斑	点	米	カ	8	6	1	0	0	15	46.7	13.3	虫数/20フリ(頭):	1.2
(	本	田	調										
フ	タ	オ	ビ	15	0	0	0	0	15	0.0	0.0	虫数/株(頭):	0.0
コ	ブ	ノ	メ	15	0	0	0	0	15	0.0	0.0	上位2葉の被害率(%):	0.0
ご	ま	葉	枯	14	1	0	0	0	15	6.7	1.7	発病度:	0.3
白	葉		枯	15	0	0	0	0	15	0.0	0.0	発病度:	0.0
イ	チ	モン	シ	15	0	0	0	0	15	0.0	0.0	苞数/25株(個):	0.0
イ	ネ	クロ	カ	11	4	0	0	0	15	26.7	6.7	虫数/25株(頭):	0.5

東部沿岸 : 徳島市、小松島市、阿南市

南部 : 美波町、牟岐町、海陽町

普通期イネ

藍住町、板野町、上板町、阿波市、美馬市、吉野川市、石井町、東みよし町、三好市調査: 8/12,14

病 害 虫 名					発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴	
					無	少	中	多	甚	合計				
穂	い	も	ち		22	1	0	0	0	23	4.3	1.1	発 病 穂 率 (%)	0.0
(	北	中	部	)	12	1	0	0	0	13	7.7	1.9		0.0
(	西	部		)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0		0.0
紋	枯	病			12	7	0	3	1	23	47.8	21.7	発 病 株 率 (%)	14.4
(	北	中	部	)	8	3	0	2	0	13	38.5	17.3		10.5
(	西	部		)	4	4	0	1	1	10	60.0	27.5		19.6
も	み	枯	細 菌 病		23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 穂 率 (%)	0.0
ば	か	苗 病			20	1	1	1	0	23	13.0	6.5	発 病 株 率 (%)	1.2
(	北	中	部	)	12	1	0	0	0	13	7.7	1.9		0.3
(	西	部		)	8	0	1	1	0	10	20.0	12.5		2.4
稲	こ	う	じ 病		23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 株 率 (%)	0.0
縞	葉	枯	病		23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 株 率 (%)	0.0
(	北	中	部	)	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0		0.0
(	西	部		)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0		0.0
縞	葉	枯	病		23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 度 :	0.0
(	北	中	部	)	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0		0.0
(	西	部		)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0		0.0
ヒ	メ	ト	ビ ウ ン カ		10	12	1	0	0	23	56.5	15.2	虫 数 / 株 (頭)	0.2
(	北	中	部	)	5	7	1	0	0	13	61.5	17.3		0.3
(	西	部		)	5	5	0	0	0	10	50.0	12.5		0.1
ニ	カ	メ	イ ガ		23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	被 害 株 率 (%)	0.0
セ	シ	ロ	ウ ン カ		18	5	0	0	0	23	21.7	5.4		0.0
(	北	中	部	)	9	4	0	0	0	13	30.8	7.7		0.1
(	西	部		)	9	1	0	0	0	10	10.0	2.5		0.0
ト	ヒ	イ	ロ ウ ン カ		23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	虫 数 / 株 (頭)	0.0
ツ	マ	グ	ロ ヨ コ バ イ		15	8	0	0	0	23	34.8	8.7		0.3
(	北	中	部	)	8	5	0	0	0	13	38.5	9.6		0.3
(	西	部		)	7	3	0	0	0	10	30.0	7.5		0.3
斑	点	米	カ メ ム シ 類		7	11	5	0	0	23	69.6	22.8	虫 数 /20 フリ (頭)	2.1
(	本	田	調 査)											
(	北	中	部	)	2	8	3	0	0	13	84.6	26.9		2.3
(	西	部		)	5	3	2	0	0	10	50.0	17.5		1.9
フ	タ	オ	ビ コ ヤ ガ		23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	幼 虫 数 / 株 (頭)	0.0
(	北	中	部	)	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0		0.0
(	西	部		)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0		0.0
コ	ブ	ノ	メ イ ガ		22	1	0	0	0	23	4.3	1.1	被 害 株 率 (%)	0.2
(	北	中	部	)	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0		0.0
(	西	部		)	9	1	0	0	0	10	10.0	2.5		0.4
ご	ま	葉	枯 病		23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 度 :	0.0
白	葉	枯	病		23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 度 :	0.0
萎	縮	病			23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 株 率 (%)	0.0
イ	チ	モン	シ セ セ リ		22	1	0	0	0	23	4.3	1.1	苞 数 /25 株 (個)	0.0
イ	ネ	ク	ロ カ メ ム シ		23	0	0	0	0	23	0.0	0.0		0.0

北中部: 藍住町、板野町、上板町、阿波市、吉野川市、石井町

西部: 東みよし町、三好市、美馬市

サツマイモ

徳島市、鳴門市、松茂町調査: 8/14

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
食 葉 性 害 虫	0	16	0	0	0	16	100.0	25.0	被 害 度 : 8.8
イ モ キ バ ガ	13	3	0	0	0	16	18.8	4.7	被 害 葉 率 (%): 0.3
ハ ダ ニ 類	15	1	0	0	0	16	6.3	1.6	寄 生 葉 率 (%): 1.3
立 枯 病	16	0	0	0	0	16	0.0	0.0	発 生 面 積 率 (%): 0.0
タハ'ココナシ'ラミ	8	6	2	0	0	16	50.0	15.6	寄 生 株 率 (%): 10.8

[果 樹]

温州ミカン

徳島市、勝浦町、佐那河内村調査: 8/13

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
そ う か 病	2	6	0	0	0	8	75.0	18.8	果 実 の 発 病 程 度 : 1.9
ア ブ ラ ム シ 類	5	2	0	1	0	8	37.5	15.6	寄 生 新 梢 率 : 2.1
ミ カ ン ハ ダ ニ	2	6	0	0	0	8	75.0	18.8	春 葉 の 寄 生 率 : 8.0
ミ カ ン ハ モ グ リ ガ	3	3	2	0	0	8	62.5	21.9	寄 生 葉 率 : 5.0
ゴ マ ダ ラ カ ミ キ リ	7	1	0	0	0	8	12.5	3.1	10樹当たり寄生虫数(頭): 0.3

スダチ

徳島市、神山町、佐那河内村、勝浦町調査: 8/13

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
か い よ う 病	0	8	0	0	0	8	100.0	25.0	果 実 の 発 病 程 度 : 2.7
そ う か 病	4	4	0	0	0	8	50.0	12.5	春 葉 の 発 病 程 度 : 1.9
〃	3	4	1	0	0	8	62.5	18.8	果 実 の 発 病 程 度 : 3.4
ア ブ ラ ム シ 類	5	3	0	0	0	8	37.5	9.4	寄 生 新 梢 率 : 1.3
ミ カ ン ハ ダ ニ	1	5	1	1	0	8	87.5	31.3	春 葉 の 寄 生 率 : 18.1
ミ カ ン サ ビ ダ ニ	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	1 樹 当 たり 被 害 果 数 : 0.0
ミ カ ン ハ モ グ リ ガ	2	6	0	0	0	8	75.0	18.8	寄 生 葉 率 : 2.9
ゴ マ ダ ラ カ ミ キ リ	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	10 樹 当 たり 寄 生 虫 数 (頭): 0.0

ナシ

鳴門市、松茂町調査: 8/12

病 害 虫 名			発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴	
			無	少	中	多	甚	合計				
黒	星	病	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	発 病 果 率 (%)	0.0
カ	メ	ムシ類	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	被 害 果 率 (%)	0.0
ナ	シ	ヒメシシクイ	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	被 害 果 率 (%)	0.0
ハ	ダ	ニ類	0	3	3	1	1	8	100.0	50.0	寄 生 葉 率 (%)	21.0
ハ	マ	キムシ類	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	被 害 果 率 (%)	0.0
う	ど	んこ病	6	2	0	0	0	8	25.0	6.3	葉 の 発 病 程 度	0.1
輪		紋 病	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	発 病 果 率 (%)	0.0

注1) 発生程度指数*は以下の式より求めている。

$$\text{発生程度指数} = \frac{(\text{少} \times 1 + \text{中} \times 2 + \text{多} \times 3 + \text{甚} \times 4)}{\text{調査圃場数} \times 4} \times 100$$

各種フェロモントラップ




図1 ナシヒメシンクイムシ フェロモントラップ誘殺数推移
※鳴門市、松茂町の7地点平均




図2 ナシヒメシンクイムシ フェロモントラップ誘殺数推移
※無防除圃場(農総技支センター上板)




図3 3種果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ)フェロモントラップ誘殺数(石井町)




図4 予察灯による果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ)の誘殺数(勝浦町)




図5 予察灯による果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ)の誘殺数(上板町)




図6 オオタバコガ フェロモントラップ誘殺数推移
*阿波市・三好市・東みよし町・石井町の6地点平均




図7 ハスモンヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(野菜圃場)
*徳島市・石井町・阿波市・吉野川市・東みよし町・三好市の9地点平均




図8 シロイチモジヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(野菜圃場)
* 徳島市・石井町・阿波市・吉野川市の7地点平均




図9 ハスモンヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(甘藷圃場)
* 徳島市・鳴門市・松茂町の4地点平均




図10 シロイチモジヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(甘藷圃場)
* 徳島市・鳴門市・松茂町の4地点平均