


令和7年度 北灘 環境調査（8月21日調査）徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (°C)	塩分	透明度 (m)	細胞/mL					
						シャットネラ アンティーカ	シャットネラ マリーナ	シャットネラ 区分不能	シャットネラ オバータ	カレニア ミキモトイ	コクロディニウム ポリクリコイデス
2	09:26	0-5			16.0	0.01	0.01	-	0.03	0.01	0.97
		0	29.87	31.84							
		1	29.39	31.78		-	-	-	-	-	-
		5	29.27	31.80		-	-	-	-	-	-
		10	28.68	31.78		0.04	0.01	-	0.26	-	5.05
		15	28.04	31.86							
		20	27.84	31.90							
		B-1	26.08	32.18		-	-	-	-	-	-
4	08:58	0-5			16.3	-	-	-	-	-	-
		0	29.31	31.70		-	-	-	-	-	-
		1	29.07	31.67		-	-	-	-	-	-
		5	28.90	31.70		-	-	-	-	-	0.19
		10	28.64	31.81		-	-	-	0.07	-	1.32
		15	28.44	31.80							
		20	28.21	31.82		-	-	-	-	-	-
		25	27.50	31.96							
		30	26.48	32.24		-	-	-	-	-	-
		35	26.18	32.30							
		40	25.92	32.29							
		B-1	25.89	32.29		-	-	-	-	-	-
5	09:53	0-5			15.7	-	-	-	-	-	-
		0	29.18	31.73							
		1	28.97	31.74		-	-	-	-	-	-
		5	28.83	31.83		0.01	-	-	0.03	-	2.53
		10	28.28	31.84		-	-	-	-	-	-
		15	28.08	31.85							
		20	27.89	31.89							
		25	27.04	32.14							
		30	26.81	32.29							
		B-1	25.97	32.31		-	-	-	-	-	0.02



備 考

・有害種のシャットネラ属(アンティーカ、マリーナ、オバータ)、カレニアミキモトイが検出されましたが低密度でした。

・有害種のコクロディニウム ポリクリコイデスは低密度でしたが前回調査時より増加しました。

・珪藻は前回調査時より減少しました。
珪藻細胞数 St.4(0-5m): 1cells/ml