


令和7年度 北灘 有害プランクトン調査（8月25日調査）徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (℃)	塩分	透明度 (m)	細胞/mL					
						シャットネラ アンティーカ	シャットネラ マリーナ	シャットネラ 区分不能	シャットネラ オバータ	コクロディニウム ポリクリコイデス	コクロディニウム フルベセンス
2	09:19	0-5			11.8	-	0.01	-	6.0	-	0.06
		0	29.21	31.79							
		1	28.84	31.78		-	-	-	-	-	-
		5	28.38	31.79		-	-	-	8.3	-	0.21
		10	28.28	31.80		-	-	-	0.11	-	0.11
		15	27.95	31.84							
		20	27.56	31.93							
		B-1	26.06	32.23		-	-	-	-	-	-
4	08:56	0-5			13.1	-	-	-	4.3	-	0.19
		0	28.85	31.72		-	-	-	-	0.02	0.06
		1	28.77	31.72		0.01	0.03	-	2.46	-	0.04
		5	28.59	31.75		0.01	0.01	-	3.0	0.06	0.18
		10	28.25	31.80		0.01	-	0.02	2.38	-	0.24
		15	27.90	31.87							
		20	27.62	31.97		-	-	-	0.30	0.03	0.06
		25	27.04	32.30							
		30	26.57	32.37		-	-	-	-	-	-
		35	25.93	32.28							
		40	25.84	32.30							
		B-1	25.84	32.31		-	-	-	0.02	-	-
5	09:47	0-5			13.1	-	-	-	6.3	-	0.02
		0	28.64	31.83							
		1	28.61	31.84		-	-	-	0.22	-	0.01
		5	28.62	31.93		-	-	-	1.58	-	0.09
		10	28.13	31.92		-	-	-	0.01	-	-
		15	27.97	31.95							
		20	27.40	32.10							
		25	26.99	32.27							
		30	26.68	32.46							
		B-1	25.95	32.33		-	-	-	-	-	-



備 考

・シャットネラ オバータが前回調査時より増加しました。
最高細胞数:8.3cells/ml(st.2 5m層)

・コクロディニウム フルベセンスが低密度ながら検出されました。

※ 本種は同属のポリクリコイデス同様、赤潮化すると魚介類を斃死させる可能性があります。

・その他、有害種のシャットネラ属(アンティーカ、マリーナ)、コクロディニウム ポリクリコイデスが低密度ながら検出されました。

・珪藻は非常に低密度でした。

珪藻細胞数 St.4(0-5m):3cells/ml