


令和7年度 北灘 環境調査（9月16日調査）徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (℃)	塩分	DO (ml/L)	透明度 (m)	細胞/mL				
							シャットネラ アンティーカ	シャットネラ マリーナ	シャットネラ 区分不能	シャットネラ オバータ	コクロディニウム ポリクリコイデス
2	09:45	0-5				13.6	-	-	-	0.05	-
		0	29.28	31.88	5.09						
		1	29.22	31.90	5.09		-	-	-	-	-
		5	29.15	31.88	5.07		-	-	-	0.03	-
		10	29.01	31.89	4.89		-	-	-	0.13	-
		15	28.83	31.93	4.26						
		20	28.57	31.99	1.82						
		B-1	27.88	32.16	0.42		-	-	-	-	-
4	09:11	0-5				13.9	-	-	-	0.02	-
		0	29.30	31.86	4.97		-	-	-	-	-
		1	29.25	31.88	4.98		-	-	-	0.01	-
		5	29.17	31.90	5.00		-	-	-	-	-
		10	28.91	31.93	4.60		-	-	-	-	-
		15	28.72	31.99	3.99						
		20	28.57	32.02	2.87		-	-	-	-	-
		25	28.17	32.15	2.75						
		30	26.76	32.50	3.39		-	-	-	-	-
		35	26.56	32.49	2.04						
		40	26.35	32.47	1.22						
		B-1	26.39	32.44	1.33		-	-	-	-	-
5	10:17	0-5				13.1	-	-	-	0.21	-
		0	29.43	31.95	5.03						
		1	29.26	31.97	5.04		-	-	-	-	-
		5	29.01	31.98	4.76		-	-	-	-	-
		10	28.92	31.98	4.58		-	-	-	0.10	-
		15	28.74	32.01	4.07						
		20	28.50	32.02	3.19						
		25	27.37	32.38	2.45						
		30	26.78	32.54	3.57						
		B-1	26.60	32.54	2.17		-	-	-	-	-



備 考

・有害種のシャットネラオバータが検出されましたが低密度でした。

・珪藻はスケルトネマ属主体で、前回調査時より増加しました。

珪藻細胞数 St.4(0-5m): 28cells/ml

・溶存酸素量(DO)は表層では前回調査時より増加していますが、St.2の底層付近、St.4及びSt.5の中層(20-25m)及び底層で貧酸素状態です。