


令和7年度 ウチノ海環境調査（9月19日調査） 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (℃)	塩分	透明度 (m)	細胞/mL					
						シャットネラ アンティーカ	シャットネラ マリーナ	シャットネラ 区分不能	シャットネラ オバータ	カレニア ミキモトイ	コクロディニウム フルベセンス
1	08:59	0-5			7.9	-	-	-	0.10	-	0.02
		0	28.64	31.88							
		1	28.64	31.89							
		5	28.47	32.04							
		10	28.36	32.08							
		B-1	28.36	32.09							
2	09:05	0-5			6.6	-	-	-	-	-	-
		0	28.37	31.94							
		1	28.41	31.99							
		5	28.12	32.18							
		B-1	28.08	32.16							
3'	09:09	0-5			8.7	-	-	-	-	-	-
		0	28.31	32.03		-	-	-	-	-	-
		1	28.25	32.07		-	-	-	0.02	-	-
		5	28.01	32.13		-	-	-	0.02	-	-
		10									
		B-1	27.93	32.16		-	-	-	-	-	-
4	09:15	0-5			10.5	-	-	-	0.02	-	0.02
		0	28.38	32.08							
		1	28.37	32.09							
		5	28.20	32.10							
		10	27.97	32.12							
		B-1	27.98	32.12							
5	09:21	0-5			9.5	-	-	-	0.01	-	0.02
		0	28.65	31.99							
		1	28.46	31.95		-	-	-	0.03	-	0.05
		5	28.16	32.14		-	-	-	0.06	-	0.04
		10				-	-	-	0.01	-	-
		B-1	27.96	32.19							
6	09:28	0-5			9.0	-	-	-	0.09	-	0.04
		0	28.70	31.97							
		1	28.69	32.03							
		5	28.19	32.16							
		10									
		B-1	27.90	32.18							



備 考

- ・有害種のシャットネラオバータ、コクロディニウムフルベセンスが検出されましたが低密度でした。
- ・珪藻は非常に低密度でした。
珪藻細胞密度 : 0cells/ml (St.5 0-5m)