

令和7年度発生予察月報（9月）

徳島県立農林水産総合技術支援センター
病害虫防除所

I. 気象概況 (徳島地方気象台観測値)

	平均気温(℃)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	本年	平年	差	本年	平年	差	本年	平年	差
上旬	28.8	26.4	+ 2.4	94.5	79.7	+ 14.8	80.5	60.4	+ 20.1
中旬	27.8	25.0	+ 2.8	63.0	103.2	- 40.2	56.8	55.2	+ 1.6
下旬	17.5	22.9	- 5.4	49.0	88.3	- 39.3	34.7	46.5	- 11.8

※本年下旬の値は9/21-9/28のデータで計算しています(9/29-9/30のデータは入っていません)。

II. 病害虫の発生状況

[普通作物]

普通期イネ

藍住町、板野町、阿波市、美馬市、吉野川市、東みよし町、三好市調査：9/12

病害虫名	発生程度別圃場数						発生圃場率(%)	発生程度指数*	調査項目及び発生の特徴			
	無	少	中	多	甚	合計						
穂 い も ち	6	2	0	0	0	8	25.0	6.3	発 病 穂 率 (%)	:		0.1
(北 中 部)	1	0	0	0	0	1	0.0	0.0				0.0
(西 部)	5	2	0	0	0	7	28.6	7.1				0.1
紋 枯 病	2	4	2	0	0	8	75.0	25.0	発 病 度	:		11.5
(北 中 部)	0	0	1	0	0	1	100.0	50.0				27.0
(西 部)	2	4	1	0	0	7	71.4	21.4				9.3
もみ枯細菌病	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	発 病 穂 率 (%)	:		0.0
(北 中 部)	1	0	0	0	0	1	0.0	0.0				0.0
(西 部)	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0				0.0
稲 こう じ 病	6	2	0	0	0	8	25.0	6.3	発 病 株 率 (%)	:		1.0
(北 中 部)	1	0	0	0	0	1	0.0	0.0				0.0
(西 部)	5	2	0	0	0	7	28.6	7.1				1.1
縞 葉 枯 病	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	発 病 株 率 (%)	:		0.0
(北 中 部)	1	0	0	0	0	1	0.0	0.0				0.0
(西 部)	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0				0.0
縞 葉 枯 病	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	発 病 度	:		0.0
(北 中 部)	1	0	0	0	0	1	0.0	0.0				0.0
(西 部)	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0				0.0
トビ`イロウンカ	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	虫 数 / 株 (頭)	:		0.0
(北 中 部)	1	0	0	0	0	1	0.0	0.0				0.0
(西 部)	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0				0.0
ツマグロヨコバイ	6	2	0	0	0	8	25.0	6.3	虫 数 / 株 (頭)	:		0.7
(北 中 部)	1	0	0	0	0	1	0.0	0.0				0.0
(西 部)	5	2	0	0	0	7	28.6	7.1				0.6
斑点米カメムシ類	3	3	1	1	0	8	62.5	25.0	虫 数 /20 フリ (頭)	:		3.3
(本 田 調 査)												
(北 中 部)	0	1	0	0	0	1	100.0	25.0				1.0
(西 部)	3	2	1	1	0	7	57.1	25.0				3.6
フタオビコヤガ	7	1	0	0	0	8	12.5	3.1	幼 虫 数 / 株 (頭)	:		0.0
(北 中 部)	0	1	0	0	0	1	100.0	25.0				0.1
(西 部)	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0				0.0
コブノメイガ	7	1	0	0	0	8	12.5	3.1	上 位 2 葉 の 被 害 葉 率 (%)	:		0.0
(北 中 部)	1	0	0	0	0	1	0.0	0.0				0.0
(西 部)	6	1	0	0	0	7	14.3	3.6				0.0
ごま葉枯病	6	0	2	0	0	8	25.0	12.5	発 病 度	:		8.0
白 葉 枯 病	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	発 病 度	:		0.0
萎 縮 病	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	発 病 株 率 (%)	:		0.0
イネクロカメムシ	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	虫 数 /25 株 (頭)	:		0.0

北中部:藍住町、吉野川市、阿波市、板野町
西 部 :美馬市、三好市、東みよし町

[果 樹]

温州ミカン

徳島市、勝浦町、佐那河内村調査: 9/25

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
アブラムシ類	1	7	0	0	0	8	87.5	21.9	寄 生 新 梢 率 : 7.9
ミカンハダニ	7	1	0	0	0	8	12.5	3.1	春 葉 の 寄 生 率 : 0.4
ヤノネカイカラムシ	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	果 実 の 幼 虫 寄 生 率 : 0.0

ナシ

鳴門市、松茂町調査: 9/12

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
黒 星 病	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	発 病 葉 率 (%): 0.0
ハダニ類	3	3	2	0	0	8	62.5	21.9	寄 生 葉 率 (%): 7.0
うどんこ病	6	0	1	1	0	8	25.0	15.6	葉 の 発 病 程 度 : 5.3

カキ

上板町、つるぎ町、東みよし町調査: 9/25,26

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
炭 疽 病	6	0	0	0	0	6	0.0	0.0	発 病 果 率 (%): 0.0
カキノヘタムシガ	6	0	0	0	0	6	0.0	0.0	被 害 果 率 (%): 0.0
フシコナカイカラムシ	5	0	0	1	0	6	16.7	12.5	寄 生 果 率 (%): 1.0
カメムシ類	6	0	0	0	0	6	0.0	0.0	被 害 果 率 (%): 0.0
ハマキムシ類	6	0	0	0	0	6	0.0	0.0	被 害 果 率 (%): 0.0
円 星 落 葉 病	4	2	0	0	0	6	33.3	8.3	発 病 葉 率 (%): 0.7
角 斑 落 葉 病	2	4	0	0	0	6	66.7	16.7	発 病 葉 率 (%): 3.3
イ ラ ガ	6	0	0	0	0	6	0.0	0.0	寄 生 葉 率 (%): 0.0

[野 菜]

ブロッコリー・カリフラワー

徳島市、阿波市調査： 9/25,26

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
コ ナ ガ	9	4	0	0	0	13	30.8	7.7	10 株 当 たり 幼 虫 ・ 蛹 数 (頭):	0.1
ハ ス モ ン ヨ ト ウ	5	5	2	1	0	13	61.5	23.1	寄 生 株 率 (%):	4.3
シ ロ イ チ モ ジ ヨ ト ウ	9	1	2	1	0	13	30.8	15.4	寄 生 株 率 (%):	3.2
根 こ ぶ 病	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0	萎 ち ょ う 株 率 (%):	0.0
ア ブ ラ ム シ 類	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0	寄 生 株 率 (%):	0.0
モ ン シ ロ チ ョ ウ	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0	10 株 当 たり 幼 虫 数 (頭):	0.0

秋冬ネギ

徳島市調査： 9/25

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率 (%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
黒 斑 病	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	発 病 度 :	0.0
ネギアザミウマ	4	1	2	2	0	9	55.6	30.6	被 害 度 :	8.6
ハ ス モ ン ヨ ト ウ	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	寄 生 株 率 (%) :	0.0
シ ロ イ チ モ ジ ヨ ト ウ	5	3	1	0	0	9	44.4	13.9	寄 生 株 率 (%) :	3.1
〃	5	2	2	0	0	9	44.4	16.7	寄 生 虫 数 (頭) :	1.6
ネギハモグリバエ	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	被 害 度 :	0.0

秋冬ネギ

徳島市調査： 9/25

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率 (%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
さ び 病	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	発 病 株 率 (%) :	0.0
黒 斑 病	8	1	0	0	0	9	11.1	2.8	発 病 度 :	0.1
ベ と 病	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	発 病 株 率 (%) :	0.0
ア ブ ラ ム シ 類	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	寄 生 株 率 (%) :	0.0
ネギアザミウマ	2	6	1	0	0	9	77.8	22.2	被 害 度 :	3.3
ハ ス モ ン ヨ ト ウ	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	寄 生 株 率 (%) :	0.0
シ ロ イ チ モ ジ ヨ ト ウ	4	5	0	0	0	9	55.6	13.9	寄 生 株 率 (%) :	3.3
〃	4	5	0	0	0	9	55.6	13.9	寄 生 虫 数 (頭) :	0.8
ネギハモグリバエ	8	1	0	0	0	9	11.1	2.8	被 害 度 :	0.1

冬春イチゴ

徳島市、小松島市、阿南市、佐那河内村、阿波市調査: 9/26

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目および発生の特徴				
	無	少	中	多	甚	合計							
うどんこ病	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0	発	病	葉	率 (%)	0.0
炭 疽 病	11	2	0	0	0	13	15.4	3.8	発	病	株	率 (%)	0.3
アブラムシ類	12	1	0	0	0	13	7.7	1.9	寄	生	株	率 (%)	0.3
ハダニ類	11	2	0	0	0	13	15.4	3.8	寄	生	株	率 (%)	2.0
〃	11	2	0	0	0	13	15.4	3.8	寄	生	葉	率 (%)	1.3
ハスモンヨトウ	12	1	0	0	0	13	7.7	1.9	被	害	株	率 (%)	0.6
〃	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0	幼	虫	寄	生 株 率 (%)	0.0
萎 黄 病	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0	発	病	株	率 (%)	0.0

注1) 発生程度指数*は以下の式より求めている。

$$\text{発生程度指数} = \frac{(\text{少} \times 1 + \text{中} \times 2 + \text{多} \times 3 + \text{甚} \times 4)}{\text{調査圃場数} \times 4} \times 100$$

各種フェロモントラップ




図1 ナシヒメシンクイムシ フェロモントラップ誘殺数推移
※鳴門市、松茂町の7地点平均




図2 ナシヒメシンクイムシ フェロモントラップ誘殺数推移
※無防除圃場(農総技支センター上板)




図3 3種果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ)フェロモントラップ誘殺数(石井町)




図4 予察灯による果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ)の誘殺数(勝浦町)




図5 予察灯による果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ)の誘殺数(上板町)




図6 オオタバコガ フェロモントラップ誘殺数推移
*阿波市・三好市・東みよし町・石井町の6地点平均




図7 ハスモンヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(野菜圃場)

* 徳島市・石井町・阿波市・吉野川市・東みよし町・三好市の9地点平均




図8 シロイチモジヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(野菜圃場)

* 徳島市・石井町・阿波市・吉野川市の7地点平均




図9 ハスモンヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(甘藷圃場)

* 徳島市・鳴門市・松茂町の4地点平均




図10 シロイチモジヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(甘藷圃場)

* 徳島市・鳴門市・松茂町の4地点平均