


令和7年度 ウチノ海環境調査（10月24日調査） 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (℃)	塩分	透明度 (m)	細胞/mL		
						シャットネラ オバータ	カレニア ミキモトイ	ヘテロカプサ サーキュリスカーマ
1	09:10	0-5			6.5	-	-	-
		0	23.79	32.76				
		1	23.79	32.75				
		5	23.79	32.76				
		10	23.79	32.76				
		B-1	23.81	32.77				
2	09:15	0-5			5.0	0.01	-	-
		0	23.53	32.70				
		1	23.36	32.67				
		5	23.21	32.69				
		B-1	23.14	32.63				
3'	09:22	0-5			4.2	0.01	-	-
		0	23.32	32.70		-	-	-
		1	23.33	32.70		-	-	-
		5	23.33	32.70		-	-	-
		10	23.32	32.69				
		B-1	23.29	32.69		-	-	-
4	09:30	0-5			4.8	-	-	-
		0	23.32	32.70				
		1	23.33	32.70				
		5	23.31	32.70				
		10	23.28	32.70				
		B-1	23.28	32.71				
5	09:37	0-5			5.0	-	-	-
		0	23.27	32.66				
		1	23.27	32.66		0.01	-	-
		5	23.23	32.67		0.01	-	-
		10	23.20	32.72		-	-	-
6	09:45	0-5			5.7	-	-	-
		0	23.26	32.64				
		1	23.24	32.63				
		5	23.19	32.63				
		B-1	22.91	32.64				



備考

・有害種のシャットネラオバータが検出されましたが低密度でした。

・珪藻は非常に低密度でした。
珪藻細胞密度 : 1ells/ml (St.5 0-5m)