


令和7年度 北灘 環境調査（10月30日調査）徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (℃)	塩分	透明度 (m)	細胞/L	細胞/mL		
						コンノディスカス ワイレシー	アレキサンドリウム sp.	シャットネラ オバータ	ユーカンピア ゾディアクス
2	09:37	0-5			9.3	1360	0.11	0.02	0.46
		0	22.54	32.46					
		1	22.53	32.46		1300	-	-	0.04
		5	22.51	32.46		1370	-	-	0.16
		10	22.50	32.47		1860	0.08	0.02	0.31
		15	22.50	32.47					
		20	22.49	32.47					
		B-1	22.50	32.47		1790	-	-	-
4	09:10	0-5			8.5	1040	-	0.03	0.13
		0	22.88	32.47		900	-	-	-
		1	22.88	32.48		1030	-	-	-
		5	22.88	32.53		510	-	-	-
		10	22.88	32.52		930	-	-	0.40
		15	22.88	32.52					
		20	22.93	32.55		1440	-	-	0.17
		25	22.93	32.55					
		30	22.94	32.56		870	-	-	0.09
		35	22.96	32.61					
		40							
		B-1	22.97	32.68		1190	0.01	-	0.05
5	10:05	0-5			9.0	650	0.14	0.01	0.06
		0	23.02	32.63					
		1	23.01	32.63		640	-	-	-
		5	22.98	32.63		540	-	-	-
		10	22.97	32.63		1040	-	0.01	0.24
		15	22.97	32.64					
		20	22.96	32.65					
		25	22.94	32.64					
		30	22.91	32.64					
		B-1	22.76	32.75		1530	-	-	0.72



備 考

- ・藻類を色落ちさせる珪藻であるコンノディスカス ワイレシーが検出されました。
- ・麻痺性貝毒原因種を含むアレキサンドリウム属が検出されましたが低密度でした。
- ・有害種のシャットネラ オバータが検出されましたが低密度でした。
- ・珪藻は前回に引き続き低密度でした。
珪藻細胞数： 3cells/ml (St.4 0-5m)