


令和7年度 ウチノ海環境調査（12月19日調査）徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層(m)	水温(°C)	塩分	透明度(m)	細胞/ml	アレキサンドリウム sp.	備考
						アレキサンドリウム sp.		
1	09:07	0-5			7.9	0.01	アレキサンドリウム sp.	島田島 北泊 撫佐 大毛島 堂浦 真島 1 2 3' 4 5 6
		0	15.52	32.87				
		1	15.52	32.87				
		5	15.48	32.87				
		10	15.47	32.87				
		B-1	15.47	32.87				
2	09:12	0-5			5.8	0.01	アレキサンドリウム sp.	島田島 北泊 撫佐 大毛島 堂浦 真島 1 2 3' 4 5 6
		0	14.74	32.83				
		1	14.73	32.83				
		5	14.55	32.85				
		B-1	14.53	32.84				
3'	09:16	0-5			4.9	0.04	アレキサンドリウム sp.	島田島 北泊 撫佐 大毛島 堂浦 真島 1 2 3' 4 5 6
		0	14.67	32.87		—		
		1	14.67	32.87		—		
		5	14.64	32.87		0.01		
		10						
		B-1	14.63	32.87		—		
4	09:23	0-5			6.1	0.06	アレキサンドリウム sp.	島田島 北泊 撫佐 大毛島 堂浦 真島 1 2 3' 4 5 6
		0	14.81	32.86				
		1	14.81	32.87				
		5	14.68	32.88				
		10	14.63	32.87				
		B-1	14.62	32.87				
5	09:29	0-5			6.0	—	アレキサンドリウム sp.	島田島 北泊 撫佐 大毛島 堂浦 真島 1 2 3' 4 5 6
		0	14.80	32.80				
		1	14.70	32.81		0.04		
		5	14.52	32.87		—		
		10	14.51	32.88		—		
		B-1	14.51	32.88		—		
6	09:36	0-5			5.5	—	アレキサンドリウム sp.	島田島 北泊 撫佐 大毛島 堂浦 真島 1 2 3' 4 5 6
		0	14.44	32.87				
		1	14.44	32.87				
		5	14.43	32.87				
		B-1	14.43	32.88				



備 考

麻痺性貝毒原因種を含むアレキサンドリウム属が検出されました。

・下痢性貝毒原因種のディノフィシス属は検出されませんでした。

・珪藻は前回に引き続き低密度でした。  
珪藻細胞密度 : 17cells/ml (St.5 0-5m)