

令和8年度 播磨灘広域共同調査 (7月14日調査) 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (℃)	塩分	DO (mg/L)	透明度 (m)	細胞/mL					
							シャットネラ アンティーカ	シャットネラ マリーナ	シャットネラ 区分不能	シャットネラ オーバータ	カレニア ミキモトイ	コクロディニウム ポリクリコイデス
T4	8:34	0-5				12.5	-	-	-	-	-	-
		0	25.36	31.26	7.35							
		1	24.45	31.27	7.44		-	-	-	-	-	-
		5	23.86	31.42	7.38		-	-	-	-	-	0.24
		10	23.41	31.49	7.08		-	-	-	-	-	-
		15	23.26	31.57	6.45							
		20	23.10	31.70	6.20		-	-	-	-	-	-
		25	22.88	31.75	6.05							
		30	22.56	31.76	5.93		-	-	-	-	-	-
		B-1	20.09	32.20	4.23		-	-	-	-	-	-
T1	9:07	0-5				12.6	-	-	-	-	-	-
		0	26.25	31.42	7.09							
		1	26.24	31.40	7.08		-	-	-	-	-	-
		5	23.77	31.45	7.34		-	-	-	-	-	-
		10	23.26	31.53	6.29		-	-	-	-	-	-
		15	23.02	31.66	6.04							
		20	23.04	31.67	6.08							
		25	23.04	31.68	6.09							
		30	22.99	31.68	6.18							
		B-1	22.70	31.79	6.25		-	-	-	-	-	-
St.4	9:23	0-5				10.5	0.03	0.01	-	-	-	-
		0	26.39	30.96	7.44		-	-	-	-	-	-
		1	26.12	31.00	7.53		0.02	0.01	0.02	-	-	0.04
		5	25.12	31.14	7.40		-	-	-	-	-	-
		10	23.43	31.09	7.32		-	-	-	-	-	-
		15	23.27	31.19	6.99							
		20	22.84	31.26	6.53		-	-	-	-	-	-
		25	22.17	31.73	5.90							
		30	21.82	31.96	5.59		-	-	-	-	-	-
		35										
		B-1	20.40	32.20	4.31		-	-	-	-	-	-

播磨灘

◎ T4

◎ T1

◎ St.4

大瀬田

折野

淡路島

備考

・有害種のシャットネラ属(アンティーカ、マリーナ)、コクロディニウム ポリクリコイデスが検出されましたが低密度でした。

・珪藻はキートセロス属主体で前回調査時より減少しました。

珪藻細胞数
St.4(0-5m): 71cells/ml
T4(0-5m): 41cells/ml