

令和8年度発生予察月報(7月)

徳島県立農林水産総合技術支援センター
病虫害防除所

I. 気象概況 (徳島地方気象台観測値)

	平均気温(℃)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	本年	平年	差	本年	平年	差	本年	平年	差
上旬	25.6	25.5	+ 0.1	31.0	65.8	- 34.8	55.7	48.5	+ 7.2
中旬	29.6	26.9	+ 2.7	0.0	69.1	- 69.1	55.4	61.2	- 5.8
下旬	-	28.0	-	-	42.1	-	-	82.7	-

※本年中旬の値は7/11-7/15のデータで計算しています(7/16-20のデータは入っていません)。

II. 病虫害の発生状況

[普通作物]

早期イネ

徳島市、小松島市、阿南市、美波町、海陽町調査：7/14

病虫害名	発生程度別圃場数						発生圃場率(%)	発生程度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	0	甚	合計			
葉いもち	14	4	0	0	0	18	22.2	5.6	発病度：0.9
(東 部 沿 岸)	12	2	0	0	0	14	14.3	3.6	0.9
(南 部)	2	2	0	0	0	4	50.0	12.5	1.0
紋枯病	13	5	0	0	0	18	27.8	6.9	発病度：1.0
もみ枯細菌病	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発病穂率(%)：0.0
ばか苗病	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発病株率(%)：0.0
縞葉枯病	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発病株率(%)：0.0
〃	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発病度：0.0
ヒメトビウンカ	8	10	0	0	0	18	55.6	13.9	虫数/株(頭)：0.1
(東 部 沿 岸)	6	8	0	0	0	14	57.1	14.3	0.1
(南 部)	2	2	0	0	0	4	50.0	12.5	0.2
ニカメイガ	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	被害株率(%)：0.0
セシ・ロウンカ	14	4	0	0	0	18	22.2	5.6	虫数/株(頭)：0.0
(東 部 沿 岸)	12	2	0	0	0	14	14.3	3.6	0.0
(南 部)	2	2	0	0	0	4	50.0	12.5	0.1
トビ・イロウンカ	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	虫数/株(頭)：0.0
ツマグロヨコバイ	14	4	0	0	0	18	22.2	5.6	虫数/株(頭)：0.0
(東 部 沿 岸)	10	4	0	0	0	14	28.6	7.1	0.0
(南 部)	4	0	0	0	0	4	0.0	0.0	0.0
斑点米カメムシ類	10	7	1	0	0	18	44.4	12.5	虫数/20フリ(頭)：1.1
(雑 草 地 調 査)									
(東 部 沿 岸)	6	7	1	0	0	14	57.1	16.1	1.4
(南 部)	4	0	0	0	0	4	0.0	0.0	0.0
フタオビコヤガ	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	虫数/株(頭)：0.0
(東 部 沿 岸)	14	0	0	0	0	14	0.0	0.0	0.0
(南 部)	4	0	0	0	0	4	0.0	0.0	0.0
コブノメイガ	16	1	1	0	0	18	11.1	4.2	被害株率(%)：1.8
(東 部 沿 岸)	13	1	0	0	0	14	7.1	1.8	0.6
(南 部)	3	0	1	0	0	4	25.0	12.5	6.0
黄化萎縮病	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発病度：0.0
ごま葉枯病	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発病度：0.0
白葉枯病	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発病度：0.0
萎縮病	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発病株率(%)：0.0
イチモンシ・セセリ	17	1	0	0	0	18	5.6	1.4	苞数/25株(個)：0.1
イネクロカメムシ	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	虫数/25株(頭)：0.0

東部沿岸： 徳島市(川内町、不動西町)、阿南市(那賀川町、山口町、新野町、長生町、中林町、福井町、見能林町)
小松島市(櫛渕町、立江町、田野町)
南 部： 美波町(西河内)、牟岐町(辺川)、海陽町(四方原、多良)

普通期イネ

藍住町、板野町、上板町、阿波市、美馬市、吉野川市、石井町、東みよし町、三好市調査：7/13、14

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	0	合計			
葉 い も ち	14	9	0	0	0	23	39.1	9.8	発 病 度 : 2.1
(北 中 部)	10	3	0	0	0	13	23.1	5.8	1.5
(西 部)	4	6	0	0	0	10	60.0	15.0	3.0
紋 枯 病	19	4	0	0	0	23	17.4	4.3	発 病 株 率 (%): 0.9
(北 中 部)	11	2	0	0	0	13	15.4	3.8	0.6
(西 部)	8	2	0	0	0	10	20.0	5.0	1.2
ば か 苗 病	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 株 率 (%): 0.0
(北 中 部)	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0	0.0
(西 部)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0	0.0
縞 葉 枯 病	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 株 率 (%): 0.0
(北 中 部)	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0	0.0
(西 部)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0	0.0
縞 葉 枯 病	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 度 : 0.0
(北 中 部)	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0	0.0
(西 部)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0	0.0
ヒメトビウンカ	15	8	0	0	0	23	34.8	8.7	虫 数 / 株 (頭): 0.0
(北 中 部)	6	7	0	0	0	13	53.8	13.5	0.1
(西 部)	9	1	0	0	0	10	10.0	2.5	0.0
ニ カ メ イ ガ	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	被 害 株 率 (%): 0.0
セ シ ・ ロ ウ ン カ	20	3	0	0	0	23	13.0	3.3	虫 数 / 株 (頭): 0.0
(北 中 部)	10	3	0	0	0	13	23.1	5.8	0.0
(西 部)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0	0.0
ト ヒ ・ イ ロ ウ ン カ	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	虫 数 / 株 (頭): 0.0
ツ マ グ ロ コ バ イ	12	11	0	0	0	23	47.8	12.0	虫 数 / 株 (頭): 0.2
(北 中 部)	3	10	0	0	0	13	76.9	19.2	0.3
(西 部)	9	1	0	0	0	10	10.0	2.5	0.0
斑 点 米 カ メ ム シ 類	3	6	7	2	5	23	87.0	50.0	虫 数 / 20 フリ (頭): 22.8
(雑 草 地 調 査)									
(北 中 部)	2	4	3	1	3	13	84.6	48.1	20.5
(西 部)	1	2	4	1	2	10	90.0	52.5	25.8
フ タ オ ビ コ ヤ ガ	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	幼 虫 数 / 株 (頭): 0.0
コ ブ ノ メ イ ガ	21	2	0	0	0	23	8.7	2.2	被 害 株 率 (%): 0.3
(北 中 部)	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0	0.0
(西 部)	8	2	0	0	0	10	20.0	5.0	0.8
黄 化 萎 縮 病	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 度 : 0.0
ご ま 葉 枯 病	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 度 : 0.0
白 葉 枯 病	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 度 : 0.0
萎 縮 病	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 株 率 (%): 0.0
イ チ モ ン シ ・ セ セ リ	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	苞 数 / 25 株 (個): 0.0
イ ネ ク ロ カ メ ム シ	22	1	0	0	0	23	4.3	1.1	虫 数 / 25 株 (頭): 0.1
イ ネ シ ン カ レ セ ン チ ュ ウ	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	被 害 株 率 (%): 0.0

北 中 部 : 板野郡(藍住町、板野町、上板町)、阿波市(吉野町、土成町、市場町)、吉野川市(鴨島町、山川町)
名西郡石井町

西 部 : 東みよし町、三好市、美馬市

サツマイモ

徳島市、鳴門市、松茂町調査：7/13

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
食 葉 性 害 虫	3	13	0	0	0	16	81.3	20.3	被 害 度 : 4.8
イ モ キ バ ガ	12	4	0	0	0	16	25.0	6.3	被 害 葉 率 (%): 0.3
ア ブ ラ ム シ 類	10	5	1	0	0	16	37.5	10.9	寄 生 株 率 (%): 6.5
ハ ダ ニ 類	7	6	2	1	0	16	56.3	20.3	寄 生 葉 率 (%): 12.7

[果 樹]

温州ミカン

徳島市、勝浦町、佐那河内村調査：7/15

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
黒 点 病	4	4	0	0	0	8	50.0	12.5	果 実 の 発 病 程 度 : 1.2
ア ブ ラ ム シ 類	6	2	0	0	0	8	25.0	6.3	寄 生 新 梢 率 : 0.6
ミ カ ン ハ ダ ニ	4	2	2	0	0	8	50.0	18.8	春 葉 の 寄 生 率 : 9.8

スダチ

徳島市、神山町、佐那河内村、勝浦町調査：7/15

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
か い よ う 病	0	7	1	0	0	8	100.0	28.1	果 実 の 発 病 程 度 : 4.7
ア ブ ラ ム シ 類	5	3	0	0	0	8	37.5	9.4	寄 生 新 梢 率 : 1.5
ミ カ ン ハ ダ ニ	7	1	0	0	0	8	12.5	3.1	春 葉 の 寄 生 率 : 0.3
ミカンハモグリガ	4	3	1	0	0	8	50.0	15.6	寄 生 葉 率 : 3.6
ゴマダラカミキリ	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	10樹当たり寄生虫数(頭): 0.0

ナ シ

鳴門市、松茂町調査：7/14

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
黒 星 病	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	発 病 葉 率 (%) : 0.0
〃	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	発 病 果 率 (%) : 0.0
カ メ ム シ 類	6	2	0	0	0	8	25.0	6.3	被 害 果 率 (%) : 0.3
ナシヒメシンクイ	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	被 害 果 率 (%) : 0.0
ハ ダ ニ 類	6	2	0	0	0	8	25.0	6.3	寄 生 葉 率 (%) : 2.9
ハ マ キ ム シ 類	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	被 害 果 率 (%) : 0.0
う ど ん こ 病	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	葉 の 発 病 程 度 : 0.0

[野 菜]

夏秋ナス

阿波市、美馬市、三好市調査：7/13、14

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度 指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
う ど ん こ 病	8	1	0	0	0	9	11.1	2.8	発 病 度 : 0.6
ア ブ ラ ム シ 類	7	2	0	0	0	9	22.2	5.6	1葉当たりの寄生虫数(頭): 0.1
ハ ス モ ン ヨ ト ウ	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	被 害 度 : 0.0
〃	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	被 害 果 率 (%) : 0.0
ハ ダ ニ 類	5	3	1	0	0	9	44.4	13.9	寄 生 葉 率 (%) : 3.9
オ オ タ バ コ ガ	8	1	0	0	0	9	11.1	2.8	100葉当たりの卵数(個): 0.1
〃	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	被 害 果 率 (%) : 0.0
青 枯 病	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	発 病 株 率 (%) : 0.0
褐 色 腐 敗 病	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	発 病 果 率 (%) : 0.0
ニシユウヤホシテントウ	5	4	0	0	0	9	44.4	11.1	被 害 葉 率 (%) : 3.8

冬春イチゴ

徳島市、小松島市、阿南市、佐那河内村、阿波市調査：7/13、14

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度 指数*	調査項目および発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
ハ ダ ニ 類	7	4	0	0	0	11	36.4	9.1	寄 生 株 率 (%): 3.5
萎 黄 病	11	0	0	0	0	11	0.0	0.0	発 病 株 率 (%): 0.0

注1) 発生程度指数*は以下の式より求めている。

$$\text{発生程度指数} = \frac{(\text{少} \times 1 + \text{中} \times 2 + \text{多} \times 3 + \text{甚} \times 4)}{\text{調査圃場数} \times 4} \times 100$$

各種フェロモントラップ




図1 ナシヒメシンクイムシ フェロモントラップ誘殺数推移
※鳴門市、松茂町の7地点平均




図2 ナシヒメシンクイムシ フェロモントラップ誘殺数推移
※無防除圃場(農総技支センター上板)




図3 3種果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ)フェロモントラップ誘殺数(石井町)




図4 予察灯による果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ)の誘殺数(勝浦町)




図5 予察灯による果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ)の誘殺数(上板町)




図6 オオタバコガ フェロモントラップ誘殺数推移
*阿波市・三好市・東みよし町・石井町の6地点平均




図7 ハスモンヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(野菜圃場)
*徳島市・石井町・阿波市・吉野川市・東みよし町・三好市の9地点平均




図8 シロイチモジヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(野菜圃場)
*徳島市・石井町・阿波市・吉野川市の7地点平均




図9ハスモンヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(甘藷園場)
* 徳島市・鳴門市・松茂町の4地点平均




図10 シロイチモジヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(甘藷園場)
* 徳島市・鳴門市・松茂町の4地点平均