

令和8年度 播磨灘広域共同調査（7月21日調査） 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (℃)	塩分	DO (mg/L)	透明度 (m)	細胞/mL					
							シャットネラ アンティーカ	シャットネラ マリーナ	シャットネラ 区分不能	シャットネラ オーバータ	カレニア ミキモトイ	コクロディニウム ポリクリコイデス
T4	8:30	0-5				9.2	-	-	-	-	-	-
		0	25.72	31.41	7.09							
		1	25.80	31.39	7.09		0.02	0.02	-	-	-	-
		5	24.55	31.53	7.02		-	-	-	-	-	-
		10	24.12	31.69	6.68		-	-	-	-	-	-
		15	24.08	31.76	6.21							
		20	23.91	31.85	5.86		-	-	-	-	-	-
		25	23.75	31.84	5.71							
		30	22.75	31.85	4.87		-	-	-	-	0.02	-
		B-1	22.74	31.86	4.76		-	-	-	-	-	-
T1	9:04	0-5				8.2	-	-	-	-	-	0.08
		0	26.76	31.40	7.63							
		1	26.46	31.24	7.66		-	-	-	-	0.04	-
		5	24.44	31.41	7.26		0.04	-	-	-	0.02	0.04
		10	23.78	31.39	6.85		-	-	-	-	-	-
		15	23.11	31.42	5.72							
		20	23.00	31.52	5.46							
		25	23.22	31.80	5.54							
		30	22.67	31.88	5.11							
		B-1	22.61	31.89	4.77		-	-	-	-	-	0.16
St.4	9:18	0-5				5.5	0.01	-	-	-	0.01	0.06
		0	25.90	31.24	7.94		-	-	-	-	-	0.02
		1	25.96	31.22	7.94		-	-	-	-	-	-
		5	25.24	31.20	7.96		-	-	-	-	-	0.12
		10	24.06	31.25	7.05		-	-	-	-	-	-
		15	23.79	31.31	5.97							
		20	23.42	31.42	5.63		-	-	-	-	-	-
		25	23.02	31.54	5.38							
		30	23.11	31.85	5.23		-	-	-	-	-	0.08
		35	22.62	31.88	4.60							
		B-1	22.22	31.95	4.02		-	-	-	-	-	-

播磨灘

◎ T4

◎ T1

◎ St.4

大瀬田

折野

栗田

淡路島

備考

・有害種のシャットネラ属(アンティーカ、マリーナ)、カレニアミキモトイ、コクロディニウム ポリクリコイデスが検出されましたが低密度でした。

・珪藻はキートセロス属主体で前回調査時より大幅に増加しました。

珪藻細胞数
St.4(0-5m): 1,529cells/ml
T4(0-5m): 613cells/ml