

(1) 大気環境中のダイオキシン類濃度

ア 調査地点 調査結果表参照

イ 調査時期 各地点において、次の期間の各1週間連続採気

夏期（令和7年8月21日から28日まで）

冬期（令和8年2月5日から12日まで）

ウ 調査方法 「ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル」（令和4年3月環境省作成）
に準拠

エ 調査結果

単位：pg-TEQ/m³

No	調 査 地 点	ダイオキシン類	備 考
1	徳島市新蔵町（徳島保健所）	0.0089	
2	阿南市大湊町（大湊大気測定局舎）	0.016	
3	三好市池田町（三好保健所）	0.0041	
	平 均 値	0.0097	

オ 評価

評価した県下の全ての地点で、大気環境基準値（0.6pg-TEQ/m³：年平均値）を下回っていました。

(2) 公共用水域中（河川・海域の水質及び底質）のダイオキシン類濃度

ア 調査地点 調査結果表参照

イ 調査時期 令和7年7月

ウ 調査方法 日本産業規格 K0312（2020）に定める方法及び

「ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル」（令和4年3月環境省作成）に準拠

エ 調査結果

調査河川名	調査地点名	ダイオキシン類 水質 (pg-TEQ/L)	ダイオキシン類 底質 (pg-TEQ/g)
勝浦川	福原大橋	0.058	0.087
勝浦川	飯谷橋	0.12	0.32

調査海域名	調査地点名	ダイオキシン類 水質 (pg-TEQ/L)	ダイオキシン類 底質 (pg-TEQ/g)
紀伊水道海域	st-2	0.054	3.3
紀伊水道海域	st-9	0.055	0.58
河川・海域全体の平均値		0.072	1.1

オ 評価

水質については、全ての地点で環境基準値（1pg-TEQ/L）を下回っていました。

底質についても、全ての地点で環境基準値（150pg-TEQ/g）を下回っていました。

(3) 地下水環境中のダイオキシン類濃度

ア 調査地点 調査結果表参照

イ 調査時期 令和7年6月、7月

ウ 調査方法 日本産業規格 K0312 (2020) に定める方法に準拠

エ 調査結果

単位：pg-TEQ/L

No	調 査 地 点	ダイオキシン類	備 考
1	徳島市上八万町樋口	0.057	
2	鳴門市大麻町板東	0.060	
3	海部郡牟岐町大字牟岐浦	0.057	
	平 均 値	0.058	

オ 評価

地下水については、全ての地点で環境基準値（1 pg-TEQ/L）を下回っていました。

(4) 土壌環境中のダイオキシン類濃度

ア 調査地点 調査結果表参照

イ 調査時期 令和7年6月、7月

ウ 調査方法 「ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル」（令和4年3月環境省作成）に準拠

エ 調査結果

単位：pg-TEQ/g

No	調 査 地 点	ダイオキシン類	備 考
1	徳島市新浜本町一丁目	0.87	
2	鳴門市撫養町立岩	0.81	
3	小松島市立江町	0.073	
4	阿波市吉野町西条	0.078	
5	勝浦郡勝浦町大字久国	0.098	
6	海部郡美波町山河内	0.030	
7	板野郡北島町中村	0.073	
8	板野郡板野町下庄	0.029	
9	板野郡上板町七條	7.3	
10	美馬郡つるぎ町貞光	0.029	
	平 均 値	0.94	

オ 評価

土壌については、全ての地点で環境基準値(1,000pg-TEQ/g)を下回っていました。