

令和8年度発生予察月報(7月)

徳島県立農林水産総合技術支援センター
病虫害防除所

I. 気象概況 (徳島地方気象台観測値)

	平均気温(℃)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	本年	平年	差	本年	平年	差	本年	平年	差
上旬	25.6	25.5	+ 0.1	31.0	65.8	- 34.8	55.7	48.5	+ 7.2
中旬	30.0	26.9	+ 3.1	0.0	69.1	- 69.1	111.8	61.2	+ 50.6
下旬	31.9	28.0	+ 3.9	0.0	42.1	- 42.1	105.3	82.7	+ 22.6

※本年下旬の値は7/21-7/30のデータで計算しています(7/31のデータは入っていません)。

II. 病虫害の発生状況

[普通作物]

早期イネ

徳島市、小松島市、阿南市、美波町、海陽町調査: 7/14

病虫害名	発生程度別圃場数						発生圃場率(%)	発生程度指数*	調査項目及び発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
葉いもち	14	4	0	0	0	18	22.2	5.6	発病度:	0.9
(東部沿岸)	12	2	0	0	0	14	14.3	3.6		0.9
(南部)	2	2	0	0	0	4	50.0	12.5		1.0
紋枯病	13	5	0	0	0	18	27.8	6.9	発病度:	1.0
もみ枯細菌病	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発病穂率(%):	0.0
ばか苗病	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発病株率(%):	0.0
縞葉枯病	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発病株率(%):	0.0
〃	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発病度:	0.0
ヒメトビウンカ	8	10	0	0	0	18	55.6	13.9	虫数/株(頭):	0.1
(東部沿岸)	6	8	0	0	0	14	57.1	14.3		0.1
(南部)	2	2	0	0	0	4	50.0	12.5		0.2
ニカメイガ	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	被害株率(%):	0.0
セシロウンカ	14	4	0	0	0	18	22.2	5.6	虫数/株(頭):	0.0
(東部沿岸)	12	2	0	0	0	14	14.3	3.6		0.0
(南部)	2	2	0	0	0	4	50.0	12.5		0.1
トビイロウンカ	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	虫数/株(頭):	0.0
ツマグロヨコバイ	14	4	0	0	0	18	22.2	5.6	虫数/株(頭):	0.0
(東部沿岸)	10	4	0	0	0	14	28.6	7.1		0.0
(南部)	4	0	0	0	0	4	0.0	0.0		0.0
斑点米カメムシ類 (雑草地調査)	10	7	1	0	0	18	44.4	12.5	虫数/20フリ(頭):	1.1
(東部沿岸)	6	7	1	0	0	14	57.1	16.1		1.4
(南部)	4	0	0	0	0	4	0.0	0.0		0.0
フタオビコヤガ	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	虫数/株(頭):	0.0
(東部沿岸)	14	0	0	0	0	14	0.0	0.0		0.0
(南部)	4	0	0	0	0	4	0.0	0.0		0.0
コブノメイガ	16	1	1	0	0	18	11.1	4.2	被害株率(%):	1.8
(東部沿岸)	13	1	0	0	0	14	7.1	1.8		0.6
(南部)	3	0	1	0	0	4	25.0	12.5		6.0
黄化萎縮病	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発病度:	0.0
ごま葉枯病	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発病度:	0.0
白葉枯病	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発病度:	0.0
萎縮病	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発病株率(%):	0.0
イチモンシセセリ	17	1	0	0	0	18	5.6	1.4	苞数/25株(個):	0.1
イネクロカメムシ	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	虫数/25株(頭):	0.0

早期イネ

徳島市、小松島市、阿南市、美波町、海陽町調査: 7/24、29

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
穂 い も ち	17	1	0	0	0	18	5.6	1.4	発 病 穂 率 (%)	0.1
(東 部 沿 岸)	14	0	0	0	0	14	0.0	0.0		0.0
(南 部)	3	1	0	0	0	4	25.0	6.3		0.5
紋 枯 病	16	2	0	0	0	18	11.1	2.8	発 病 度 :	0.3
(東 部 沿 岸)	12	2	0	0	0	14	14.3	3.6		0.4
(南 部)	4	0	0	0	0	4	0.0	0.0		0.0
ば か 苗 病	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発 病 株 率 (%)	0.0
(東 部 沿 岸)	14	0	0	0	0	14	0.0	0.0		0.0
(南 部)	4	0	0	0	0	4	0.0	0.0		0.0
縞 葉 枯 病	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発 病 株 率 (%)	0.0
(東 部 沿 岸)	14	0	0	0	0	14	0.0	0.0		0.0
(南 部)	4	0	0	0	0	4	0.0	0.0		0.0
縞 葉 枯 病	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発 病 度 :	0.0
(東 部 沿 岸)	14	0	0	0	0	14	0.0	0.0		0.0
(南 部)	4	0	0	0	0	4	0.0	0.0		0.0
ヒメトビウンカ	5	13	0	0	0	18	72.2	18.1	虫 数 / 株 (頭)	0.2
(東 部 沿 岸)	5	9	0	0	0	14	64.3	16.1		0.2
(南 部)	0	4	0	0	0	4	100.0	25.0		0.3
ニ カ メ イ ガ	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	被 害 株 率 (%)	0.0
(東 部 沿 岸)	14	0	0	0	0	14	0.0	0.0		0.0
(南 部)	4	0	0	0	0	4	0.0	0.0		0.0
セシ`ロウンカ	13	5	0	0	0	18	27.8	6.9	虫 数 / 株 (頭)	0.1
(東 部 沿 岸)	12	2	0	0	0	14	14.3	3.6		0.0
(南 部)	1	3	0	0	0	4	75.0	18.8		0.2
トヒ`イロウンカ	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	虫 数 / 株 (頭)	0.0
(東 部 沿 岸)	14	0	0	0	0	14	0.0	0.0		0.0
(南 部)	4	0	0	0	0	4	0.0	0.0		0.0
ツマグロヨコバイ	14	4	0	0	0	18	22.2	5.6	虫 数 / 株 (頭)	0.0
(東 部 沿 岸)	11	3	0	0	0	14	21.4	5.4		0.0
(南 部)	3	1	0	0	0	4	25.0	6.3		0.0
斑点米カメムシ類										
(本 田 調 査)	7	7	3	1	0	18	61.1	22.2	虫 数 /20 フリ (頭)	2.3
(東 部 沿 岸)	6	6	1	1	0	14	57.1	19.6		1.9
(南 部)	1	1	2	0	0	4	75.0	31.3		3.8
フタオビコヤガ	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	虫 数 / 株 (頭)	0.0
(東 部 沿 岸)	14	0	0	0	0	14	0.0	0.0		0.0
(南 部)	4	0	0	0	0	4	0.0	0.0		0.0
コブノメイガ	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	上 位 2 葉 の 被 害 葉 率 (%)	0.0
(東 部 沿 岸)	14	0	0	0	0	14	0.0	0.0		0.0
(南 部)	4	0	0	0	0	4	0.0	0.0		0.0
黄 化 萎 縮 病	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発 病 度 :	0.0
ご ま 葉 枯 病	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発 病 度 :	0.0
白 葉 枯 病	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発 病 度 :	0.0
萎 縮 病	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発 病 株 率 (%)	0.0
イチモンシ`セセリ	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	苞 数 /25 株 (個)	0.0
イネクロカメムシ	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	虫 数 /25 株 (頭)	0.0

東部沿岸 : 徳島市(川内町、不動西町)、阿南市(那賀川町、山口町、新野町、長生町、中林町、福井町、見能林町)
小松島市(櫛渚町、立江町、田野町)

南 部 : 美波町(西河内)、牟岐町(辺川)、海陽町(四方原、多良)

普通期イネ

藍住町、板野町、上板町、阿波市、美馬市、吉野川市、石井町、東みよし町、三好市調査: 7/13、14

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
葉 い も ち	14	9	0	0	0	23	39.1	9.8	発 病 度 :	2.1
(北 中 部)	10	3	0	0	0	13	23.1	5.8		1.5
(西 部)	4	6	0	0	0	10	60.0	15.0		3.0
紋 枯 病	19	4	0	0	0	23	17.4	4.3	発 病 株 率 (%):	0.9
(北 中 部)	11	2	0	0	0	13	15.4	3.8		0.6
(西 部)	8	2	0	0	0	10	20.0	5.0		1.2
ば か 苗 病	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 株 率 (%):	0.0
(北 中 部)	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0		0.0
(西 部)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0		0.0
縞 葉 枯 病	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 株 率 (%):	0.0
(北 中 部)	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0		0.0
(西 部)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0		0.0
縞 葉 枯 病	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 度 :	0.0
(北 中 部)	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0		0.0
(西 部)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0		0.0
ヒメトビウンカ	15	8	0	0	0	23	34.8	8.7	虫 数 / 株 (頭):	0.0
(北 中 部)	6	7	0	0	0	13	53.8	13.5		0.1
(西 部)	9	1	0	0	0	10	10.0	2.5		0.0
ニ カ メ イ ガ	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	被 害 株 率 (%):	0.0
セ シ ` ロ ウ ン カ	20	3	0	0	0	23	13.0	3.3	虫 数 / 株 (頭):	0.0
(北 中 部)	10	3	0	0	0	13	23.1	5.8		0.0
(西 部)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0		0.0
ト ヒ ` イ ロ ウ ン カ	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	虫 数 / 株 (頭):	0.0
(北 中 部)	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0		0.0
(西 部)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0		0.0
ツ マ グ ロ ヨ コ バ イ	12	11	0	0	0	23	47.8	12.0	虫 数 / 株 (頭):	0.2
(北 中 部)	3	10	0	0	0	13	76.9	19.2		0.3
(西 部)	9	1	0	0	0	10	10.0	2.5		0.0
斑点米カメムシ類 (雑草地調査)	3	6	7	2	5	23	87.0	50.0	虫 数 /20 フリ (頭):	22.8
(北 中 部)	2	4	3	1	3	13	84.6	48.1		20.5
(西 部)	1	2	4	1	2	10	90.0	52.5		25.8
フタオビコヤガ	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	幼 虫 数 / 株 (頭):	0.0
(北 中 部)	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0		0.0
(西 部)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0		0.0
コ ブ ノ メ イ ガ	21	2	0	0	0	23	8.7	2.2	被 害 株 率 (%):	0.3
(北 中 部)	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0		0.0
(西 部)	8	2	0	0	0	10	20.0	5.0		0.8
黄 化 萎 縮 病	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 度 :	0.0
ご ま 葉 枯 病	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 度 :	0.0
白 葉 枯 病	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 度 :	0.0
萎 縮 病	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 株 率 (%):	0.0
イチモンシ`セセリ	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	苞 数 /25 株 (個):	0.0
イネクロカメムシ	22	1	0	0	0	23	4.3	1.1	虫 数 /25 株 (頭):	0.1
イネシンガ`レセンチュウ	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	被 害 株 率 (%):	0.0

普通期イネ

藍住町、板野町、上板町、阿波市、美馬市、吉野川市、石井町、東みよし町、三好市調査：7/28、29

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
葉 い も ち	13	9	1	0	0	23	43.5	12.0	発 病 度 :	3.0
(北 中 部)	10	3	0	0	0	13	23.1	5.8		0.5
(西 部)	3	6	1	0	0	10	70.0	20.0		6.3
紋 枯 病	17	6	0	0	0	23	26.1	6.5	発 病 株 率 (%) :	2.6
(北 中 部)	8	5	0	0	0	13	38.5	9.6		4.0
(西 部)	9	1	0	0	0	10	10.0	2.5		0.8
ば か 苗 病	21	1	1	0	0	23	8.7	3.3	発 病 株 率 (%) :	0.5
(北 中 部)	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0		0.0
(西 部)	8	1	1	0	0	10	20.0	7.5		1.2
縞 葉 枯 病	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 株 率 (%) :	0.0
(北 中 部)	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0		0.0
(西 部)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0		0.0
縞 葉 枯 病	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 度 :	0.0
(北 中 部)	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0		0.0
(西 部)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0		0.0
ヒメトビウンカ	6	17	0	0	0	23	73.9	18.5	虫 数 / 株 (頭) :	0.2
(北 中 部)	4	9	0	0	0	13	69.2	17.3		0.2
(西 部)	2	8	0	0	0	10	80.0	20.0		0.3
ニ カ メ イ ガ	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	被 害 株 率 (%) :	0.0
セ シ ` ロ ウ ン カ	20	3	0	0	0	23	13.0	3.3	虫 数 / 株 (頭) :	0.0
(北 中 部)	10	3	0	0	0	13	23.1	5.8		0.0
(西 部)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0		0.0
ト ヒ ` イ ロ ウ ン カ	22	1	0	0	0	23	4.3	1.1	虫 数 / 株 (頭) :	0.0
(北 中 部)	12	1	0	0	0	13	7.7	1.9		0.0
(西 部)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0		0.0
ツ マ グ ロ ヨ コ バ イ	13	10	0	0	0	23	43.5	10.9	虫 数 / 株 (頭) :	0.7
(北 中 部)	4	9	0	0	0	13	69.2	17.3		1.1
(西 部)	9	1	0	0	0	10	10.0	2.5		0.0
斑点米カメムシ類 (雑草地調査)	6	8	5	3	1	23	73.9	33.7	虫 数 / 20 フリ (頭) :	6.6
(北 中 部)	2	6	3	2	0	13	84.6	34.6		5.7
(西 部)	4	2	2	1	1	10	60.0	32.5		7.7
フタオビコヤガ	22	1	0	0	0	23	4.3	1.1	幼 虫 数 / 株 (頭) :	0.0
(北 中 部)	12	1	0	0	0	13	7.7	1.9		0.0
(西 部)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0		0.0
コ ブ ノ メ イ ガ	19	4	0	0	0	23	17.4	4.3	被 害 株 率 (%) :	0.7
(北 中 部)	12	1	0	0	0	13	7.7	1.9		0.3
(西 部)	7	3	0	0	0	10	30.0	7.5		1.2
黄 化 萎 縮 病	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 度 :	0.0
ご ま 葉 枯 病	21	2	0	0	0	23	8.7	2.2	発 病 度 :	0.1
白 葉 枯 病	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 度 :	0.0
萎 縮 病	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 株 率 (%) :	0.0
イチモンシ`セセリ	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	苞 数 / 25 株 (個) :	0.0
イネクロカメムシ	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	虫 数 / 25 株 (頭) :	0.0
イネシンガ`レセンチュウ	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	被 害 株 率 (%) :	0.0

北中部： 板野郡(藍住町、板野町、上板町)、阿波市(吉野町、土成町、市場町)、吉野川市(鴨島町、山川町)
 名西郡石井町
 西部： 東みよし町、三好市

サツマイモ

徳島市、鳴門市、松茂町調査：7/13

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
食 葉 性 害 虫	3	13	0	0	0	16	81.3	20.3	被 害 度	: 4.8
イ モ キ バ ガ	12	4	0	0	0	16	25.0	6.3	被 害 葉 率 (%)	: 0.3
ア ブ ラ ム シ 類	10	5	1	0	0	16	37.5	10.9	寄 生 株 率 (%)	: 6.5
ハ ダ ニ 類	7	6	2	1	0	16	56.3	20.3	寄 生 葉 率 (%)	: 12.7

サツマイモ

徳島市、鳴門市、松茂町調査：7/28

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
食 葉 性 害 虫	0	14	2	0	0	16	100.0	28.1	被 害 度	: 9.1
イ モ キ バ ガ	12	4	0	0	0	16	25.0	6.3	被 害 葉 率 (%)	: 0.3
ハ ダ ニ 類	8	5	2	1	0	16	50.0	18.8	寄 生 葉 率 (%)	: 13.2
立 枯 病	16	0	0	0	0	16	0.0	0.0	発 生 面 積 率 (%)	: 0.0
タハ'ココナシ'ラミ	13	3	0	0	0	16	18.8	4.7	寄 生 株 率 (%)	: 4.5

[果 樹]

温州ミカン

徳島市、勝浦町、佐那河内村調査: 7/15

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
アブラムシ類	6	2	0	0	0	8	25.0	6.3	寄 生 新 梢 率 :	0.6
ミカンハダニ	4	2	2	0	0	8	50.0	18.8	春 葉 の 寄 生 率 :	9.8

スダチ

徳島市、神山町、佐那河内村、勝浦町調査: 7/15

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
か い よ う 病	0	7	1	0	0	8	100.0	28.1	果 実 の 発 病 程 度 :	4.7
アブラムシ類	5	3	0	0	0	8	37.5	9.4	寄 生 新 梢 率 :	1.5
ミカンハダニ	7	1	0	0	0	8	12.5	3.1	春 葉 の 寄 生 率 :	0.3
ミカンハモグリガ	4	3	1	0	0	8	50.0	15.6	寄 生 葉 率 :	3.6
ゴマダラカミキリ	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	10樹当たり寄生虫数(頭):	0.0

ナシ

鳴門市、松茂町調査: 7/14

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
黒 星 病	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	発 病 葉 率 (%):	0.0
〃	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	発 病 果 率 (%):	0.0
カメムシ類	6	2	0	0	0	8	25.0	6.3	被 害 果 率 (%):	0.3
ナシヒメシシクイ	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	被 害 果 率 (%):	0.0
ハダニ類	6	2	0	0	0	8	25.0	6.3	寄 生 葉 率 (%):	2.9
ハマキムシ類	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	被 害 果 率 (%):	0.0
うどんこ病	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	葉 の 発 病 程 度 :	0.0

カキ

上板町、つるぎ町、東みよし町調査: 7/28

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
炭 疽 病	6	0	0	0	0	6	0.0	0.0	新 梢 発 病 率 (%):	0.0
カキノヘタムシガ	5	1	0	0	0	6	16.7	4.2	被 害 果 率 (%):	0.2
フシ'コナカイカ'ラムシ	5	1	0	0	0	6	16.7	4.2	寄 生 果 率 (%):	0.3
チャノキイロアサ'ミウマ	6	0	0	0	0	6	0.0	0.0	被 害 果 率 (%):	0.0
カキクダ'アサ'ミウマ	6	0	0	0	0	6	0.0	0.0	被 害 果 率 (%):	0.0
カメムシ類	6	0	0	0	0	6	0.0	0.0	被 害 果 率 (%):	0.0
ハマキムシ類	6	0	0	0	0	6	0.0	0.0	被 害 果 率 (%):	0.0
うどんこ病	4	1	0	0	1	6	33.3	20.8	発 病 葉 率 (%):	9.3
イ ラ ガ	6	0	0	0	0	6	0.0	0.0	寄 生 葉 率 (%):	0.0

[野 菜]

夏秋ナス

阿波市、美馬市、三好市調査：7/13、14

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度 指数*	調査項目及び発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
う ど ん こ 病	8	1	0	0	0	9	11.1	2.8	発 病 度	: 0.6
アブラムシ類	7	2	0	0	0	9	22.2	5.6	1葉当たりの寄生虫数(頭):	0.1
ハスモンヨトウ	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	被 害 度	: 0.0
〃	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	被 害 果 率 (%)	: 0.0
ハ ダ ニ 類	5	3	1	0	0	9	44.4	13.9	寄 生 葉 率 (%)	: 3.9
オオタバコガ	8	1	0	0	0	9	11.1	2.8	100葉当たりの卵数(個):	0.1
〃	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	被 害 果 率 (%)	: 0.0
青 枯 病	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	発 病 株 率 (%)	: 0.0
褐色腐敗病	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	発 病 果 率 (%)	: 0.0
ニシ・ユウヤホシテントウ	5	4	0	0	0	9	44.4	11.1	被 害 葉 率 (%)	: 3.8

夏秋ナス

阿波市、美馬市、三好市調査：7/28、29

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度 指数*	調査項目及び発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
う ど ん こ 病	8	1	0	0	0	9	11.1	2.8	発 病 度	: 0.1
アブラムシ類	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	1葉当たりの寄生虫数(頭):	0.0
ハスモンヨトウ	4	5	0	0	0	9	55.6	13.9	被 害 度	: 2.1
〃	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	被 害 果 率 (%)	: 0.0
ハ ダ ニ 類	7	1	1	0	0	9	22.2	8.3	寄 生 葉 率 (%)	: 3.3
アザミウマ類	8	1	0	0	0	9	11.1	2.8	寄 生 葉 率 (%)	: 0.1
〃	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	被 害 果 率 (%)	: 0.0
オオタバコガ	7	2	0	0	0	9	22.2	5.6	100葉当たりの卵数(個):	0.2
〃	6	3	0	0	0	9	33.3	8.3	被 害 果 率 (%)	: 0.6
青 枯 病	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	発 病 株 率 (%)	: 0.0
褐色腐敗病	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	発 病 果 率 (%)	: 0.0
ニシ・ユウヤホシテントウ	6	3	0	0	0	9	33.3	8.3	被 害 葉 率 (%)	: 0.4

秋冬ネギ

徳島市調査: 7/28

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率 (%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
黒 斑 病	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	発 病 度	: 0.0
ネギアザミウマ	2	5	0	2	0	9	77.8	30.6	被 害 度	: 8.4
ハスモンヨトウ	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	寄 生 株 率 (%)	: 0.0
シロイチモジヨトウ	4	4	1	0	0	9	55.6	16.7	寄 生 株 率 (%)	: 4.0
〃	4	4	1	0	0	9	55.6	16.7	寄 生 虫 数 (頭)	: 1.3
ネギハモグリバエ	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	被 害 度	: 0.0

冬春イチゴ

徳島市、小松島市、阿南市、佐那河内村、阿波市調査: 7/13、14

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目および発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
炭 疽 病	11	0	0	0	0	11	0.0	0.0	発 病 株 率 (%)	: 0.0
ハ ダ ニ 類	7	4	0	0	0	11	36.4	9.1	寄 生 株 率 (%)	: 3.5
萎 黄 病	11	0	0	0	0	11	0.0	0.0	発 病 株 率 (%)	: 0.0

ハ ス

徳島市、鳴門市、板野町調査: 7/29

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*		
	無	少	中	多	甚	合計				
ハスモンヨトウ	4	2	1	0	0	7	42.9	14.3	被 害 葉 率 (%)	: 2.3
褐 斑 病	5	2	0	0	0	7	28.6	7.1	発 病 度	: 0.1

注1)発生程度指数*は以下の式より求めている。

$$\text{発生程度指数} = \frac{(\text{少} \times 1 + \text{中} \times 2 + \text{多} \times 3 + \text{甚} \times 4)}{\text{調査圃場数} \times 4} \times 100$$

各種フェロモントラップ




図1 ナシヒメシンクイムシ フェロモントラップ誘殺数推移
※鳴門市、松茂町の7地点平均




図2 ナシヒメシンクイムシ フェロモントラップ誘殺数推移
※無防除圃場(農総技支センター上板)




図3 3種果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ)フェロモントラップ誘殺数(石井町)




図4 予察灯による果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ)の誘殺数(勝浦町)




図5 予察灯による果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ)の誘殺数(上板町)




図6 オオタバコガ フェロモントラップ誘殺数推移
*阿波市・三好市・東みよし町・石井町の6地点平均




図7ハスモンヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(野菜圃場)
*徳島市・石井町・阿波市・吉野川市・東みよし町・三好市の9
地点平均




図8 シロイチモジトウ フェロモントラップ誘殺数推移(野菜圃場)
*徳島市・石井町・阿波市・吉野川市の7地点平均




図9ハスモンヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(甘藷圃場)
* 徳島市・鳴門市・松茂町の4地点平均




図10 シロイチモジヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(甘藷圃場)
* 徳島市・鳴門市・松茂町の4地点平均