

令和8年度発生予察月報(8月)

徳島県立農林水産総合技術支援センター
病虫害防除所

I. 気象概況 (徳島地方気象台観測値)

	平均気温(℃)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	本年	平年	差	本年	平年	差	本年	平年	差
上旬	30.8	28.5	+ 2.3	0.0	90.7	- 90.7	92.9	80.3	+ 12.6
中旬	27.6	28.4	- 0.8	6.0	51.4	- 45.4	35.4	73.5	- 38.1
下旬	-	27.6	-	-	50.8	-	-	76.8	-

※本年中旬の値は8/11-8/16のデータで計算しています(8/17-8/20のデータは入っていません)。

II. 病虫害の発生状況

[普通作物]

早期イネ

徳島市、小松島市、阿南市、美波町、牟岐町、海陽町調査: 8/12、13

病虫害名				発生程度別圃場数						発生圃場率(%)	発生程度指数*	調査項目及び発生の特徴	
				無	少	中	多	甚	合計				
穂いもち				12	2	0	0	0	14	14.3	3.6	発病穂率(%):	0.1
紋枯病				13	1	0	0	0	14	7.1	1.8	発病度:	0.7
稲こうじ病				14	0	0	0	0	14	0.0	0.0	発病株率(%):	0.0
縞葉枯病				14	0	0	0	0	14	0.0	0.0	発病株率(%):	0.0
〃				14	0	0	0	0	14	0.0	0.0	発病度:	0.0
ニカメイガ				14	0	0	0	0	14	0.0	0.0	被害株率(%):	0.0
セシロウンカ				7	7	0	0	0	14	50.0	12.5	虫数/株(頭):	0.1
トビイロウンカ				14	0	0	0	0	14	0.0	0.0	虫数/株(頭):	0.0
ツマグロヨコバイ				12	2	0	0	0	14	14.3	3.6	虫数/株(頭):	0.3
斑点米カメムシ類 (本田調査)				3	5	5	1	0	14	78.6	32.1	虫数/20フリ(頭):	4.6
フタオビコヤガ				13	1	0	0	0	14	7.1	1.8	虫数/株(頭):	0.0
コブノメイガ				14	0	0	0	0	14	0.0	0.0	上位2葉の被害葉率(%):	0.0
ごま葉枯病				13	1	0	0	0	14	7.1	1.8	発病度:	0.4
白葉枯病				14	0	0	0	0	14	0.0	0.0	発病度:	0.0
イチモンシセセリ				14	0	0	0	0	14	0.0	0.0	苞数/25株(個):	0.0
イネクロカメムシ				13	1	0	0	0	14	7.1	1.8	虫数/25株(頭):	0.1

東部沿岸 : 徳島市、小松島市、阿南市

南部 : 美波町、牟岐町、海陽町

普通期イネ

藍住町、板野町、上板町、阿波市、美馬市、吉野川市、石井町、東みよし町、三好市調査: 8/12、13

病 害 虫 名				発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴	
				無	少	中	多	甚	合計				
穂	い	も	ち	22	1	0	0	0	23	4.3	1.1	発 病 穂 率 (%)	0.0
(	北	中	)	12	1	0	0	0	13	7.7	1.9		0.0
(	西	部	)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0		0.0
紋	枯	病		11	10	1	1	0	23	52.2	16.3	発 病 株 率 (%)	8.5
(	北	中	)	5	6	1	1	0	13	61.5	21.2		11.1
(	西	部	)	6	4	0	0	0	10	40.0	10.0		5.2
も	み	枯	細菌病	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 穂 率 (%)	0.0
ば	か	苗	病	22	1	0	0	0	23	4.3	1.1	発 病 株 率 (%)	0.2
(	北	中	)	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0		0.0
(	西	部	)	9	1	0	0	0	10	10.0	2.5		0.4
稲	こ	う	じ病	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 株 率 (%)	0.0
縞	葉	枯	病	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 株 率 (%)	0.0
(	北	中	)	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0		0.0
(	西	部	)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0		0.0
縞	葉	枯	病	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 度	0.0
(	北	中	)	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0		0.0
(	西	部	)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0		0.0
ヒ	メ	ト	ビウンカ	9	14	0	0	0	23	60.9	15.2	虫 数 / 株 (頭)	0.1
(	北	中	)	6	7	0	0	0	13	53.8	13.5		0.1
(	西	部	)	3	7	0	0	0	10	70.0	17.5		0.1
ニ	カ	メ	イガ	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	被 害 株 率 (%)	0.0
セ	シ	ロ	ウンカ	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	虫 数 / 株 (頭)	0.0
(	北	中	)	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0		0.0
(	西	部	)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0		0.0
ト	ヒ	イ	ロウンカ	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	虫 数 / 株 (頭)	0.0
ツ	マ	グ	ロヨコバイ	10	13	0	0	0	23	56.5	14.1	虫 数 / 株 (頭)	0.6
(	北	中	)	5	8	0	0	0	13	61.5	15.4		0.8
(	西	部	)	5	5	0	0	0	10	50.0	12.5		0.4
斑	点	米	カメムシ類	15	6	0	1	1	23	34.8	14.1	虫 数 /20 フリ (頭)	2.7
(	本	田	調 査										
(	北	中	)	7	5	0	1	0	13	46.2	15.4		2.2
(	西	部	)	8	1	0	0	1	10	20.0	12.5		3.4
フ	タ	オ	ビコヤガ	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	幼 虫 数 / 株 (頭)	0.0
(	北	中	)	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0		0.0
(	西	部	)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0		0.0
コ	ブ	ノ	メイガ	16	6	1	0	0	23	30.4	8.7	被 害 株 率 (%)	1.9
(	北	中	)	11	2	0	0	0	13	15.4	3.8		0.6
(	西	部	)	5	4	1	0	0	10	50.0	15.0		3.6
ご	ま	葉	枯病	21	2	0	0	0	23	8.7	2.2	発 病 度	0.5
白	葉	枯	病	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 度	0.0
萎		縮	病	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 株 率 (%)	0.0
イ	チ	モン	シ、セセリ	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	苞 数 /25 株 (個)	0.0
イ	ネ	クロ	カメムシ	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	虫 数 /25 株 (頭)	0.0

北中部: 藍住町、板野町、上板町、阿波市、吉野川市、石井町

西部: 東みよし町、三好市、美馬市

サツマイモ

徳島市、鳴門市、松茂町調査: 8/12

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
食 葉 性 害 虫	4	10	1	0	0	15	73.3	20.0	被 害 度 : 6.6
イ モ キ バ ガ	15	0	0	0	0	15	0.0	0.0	被 害 葉 率 (%): 0.0
ハ ダ ニ 類	7	5	0	2	1	15	53.3	25.0	寄 生 葉 率 (%): 20.1
立 枯 病	15	0	0	0	0	15	0.0	0.0	発 生 面 積 率 (%): 0.0
タハ'ココナシ'ラミ	2	8	5	0	0	15	86.7	30.0	寄 生 株 率 (%): 27.7

[果 樹]

温州ミカン

徳島市、勝浦町、佐那河内村調査: 8/12、13

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
そ う か 病	6	2	0	0	0	8	25.0	6.3	果 実 の 発 病 程 度 : 0.8
ア ブ ラ ム シ 類	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	寄 生 新 梢 率 : 0.0
ミ カ ン ハ ダ ニ	3	5	0	0	0	8	62.5	15.6	春 葉 の 寄 生 率 : 5.1
ミ カ ン ハ モ グ リ ガ	2	6	0	0	0	8	75.0	18.8	寄 生 葉 率 : 3.4
ゴ マ ダ ラ カ ミ キ リ	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	10樹当たり寄生虫数(頭): 0.0

スダチ

徳島市、神山町、佐那河内村、勝浦町調査: 8/12、13

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
か い よ う 病	2	6	0	0	0	8	75.0	18.8	果 実 の 発 病 程 度 : 1.4
そ う か 病	5	3	0	0	0	8	37.5	9.4	春 葉 の 発 病 程 度 : 1.1
〃	5	2	1	0	0	8	37.5	12.5	果 実 の 発 病 程 度 : 5.5
ア ブ ラ ム シ 類	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	寄 生 新 梢 率 : 0.0
ミ カ ン ハ ダ ニ	5	2	0	0	1	8	37.5	18.8	春 葉 の 寄 生 率 : 13.0
ミ カ ン サ ビ ダ ニ	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	1 樹 当 た り 被 害 果 数 : 0.0
ミ カ ン ハ モ グ リ ガ	4	4	0	0	0	8	50.0	12.5	寄 生 葉 率 : 2.3
ゴ マ ダ ラ カ ミ キ リ	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	10 樹 当 た り 寄 生 虫 数 (頭): 0.0

病 害 虫 名			発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃場率(%)	発生程度指数*	調査項目及び発生の特徴	
			無	少	中	多	甚	合計				
黒	星	病	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	発 病 果 率 (%)	0.0
カ	メ	ムシ類	7	0	1	0	0	8	12.5	6.3	被 害 果 率 (%)	0.5
ナシ	ヒメシ	ンクイ	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	被 害 果 率 (%)	0.0
ハ	ダ	ニ類	0	3	0	0	4	7	100.0	67.9	寄 生 葉 率 (%)	49.0
ハ	マ	キムシ類	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	被 害 果 率 (%)	0.0
う	ど	んこ病	6	1	0	0	0	7	14.3	3.6	葉 の 発 病 程 度	0.2
輪		紋 病	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	発 病 果 率 (%)	0.0

注1)発生程度指数*は以下の式より求めている。

(少×1 + 中×2 + 多×3 + 甚×4)

発生程度指数=

調査圃場数×4

×100

各種フェロモントラップ




図1 ナシヒメシンクイムシ フェロモントラップ誘殺数推移
※鳴門市、松茂町の7地点平均




図2 ナシヒメシンクイムシ フェロモントラップ誘殺数推移
※無防除圃場(農総技支センター上板)




図3 3種果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ)フェロモントラップ誘殺数(石井町)




図4 予察灯による果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ)の誘殺数(勝浦町)




図5 予察灯による果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ)の誘殺数(上板町)




図6 オオタバコガ フェロモントラップ誘殺数推移
*阿波市・三好市・東みよし町・石井町の6地点平均




図7 ハスモンヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(野菜圃場)
*徳島市・石井町・阿波市・吉野川市・東みよし町・三好市の9地点平均




図8 シロイチモジヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(野菜圃場)
* 徳島市・石井町・阿波市・吉野川市の7地点平均




図9 ハスモンヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(甘藷圃場)
* 徳島市・鳴門市・松茂町の4地点平均




図10 シロイチモジヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(甘藷圃場)
* 徳島市・鳴門市・松茂町の4地点平均