

令和8年度発生予察月報(8 月)

徳島県立農林水産総合技術支援センター
病虫害防除所

I. 気象概況 (徳島地方気象台観測値)

	平 均 気 温(℃)			降 水 量(mm)			日 照 時 間(h)		
	本年	平年	差	本年	平年	差	本年	平年	差
上 旬	30.8	28.5	+ 2.3	0.0	90.7	- 90.7	92.9	80.3	+ 12.6
中 旬	27.9	28.4	- 0.5	12.5	51.4	- 38.9	69.8	73.5	- 3.7
下 旬		27.6	- 27.6		50.8	- 50.8		76.8	- 76.8

※本年下旬の値は8/21-8/27のデータで計算しています(8/28-8/31のデータは入っていません)。

II. 病虫害の発生状況

[普通作物]

早期イネ

徳島市、小松島市、阿南市、美波町、牟岐町、海陽町調査: 8/12、13

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
穂 い も ち	12	2	0	0	0	14	14.3	3.6	発 病 穂 率 (%): 0.1
紋 枯 病	13	1	0	0	0	14	7.1	1.8	発 病 度 : 0.7
稲 こ う じ 病	14	0	0	0	0	14	0.0	0.0	発 病 株 率 (%): 0.0
縞 葉 枯 病	14	0	0	0	0	14	0.0	0.0	発 病 株 率 (%): 0.0
〃	14	0	0	0	0	14	0.0	0.0	発 病 度 : 0.0
ニ カ メ イ ガ	14	0	0	0	0	14	0.0	0.0	被 害 株 率 (%): 0.0
セシゝロウンカ	7	7	0	0	0	14	50.0	12.5	虫 数 / 株 (頭): 0.1
トヒゝイロウンカ	14	0	0	0	0	14	0.0	0.0	虫 数 / 株 (頭): 0.0
ツマグロヨコバイ	12	2	0	0	0	14	14.3	3.6	虫 数 / 株 (頭): 0.3
斑点米カメムシ類 (本 田 調 査)	3	5	5	1	0	14	78.6	32.1	虫 数 /20フリ(頭): 4.6
フタオビコヤガ	13	1	0	0	0	14	7.1	1.8	虫 数 / 株 (頭): 0.0
コブノメイガ	14	0	0	0	0	14	0.0	0.0	上位2葉の被害葉率(%): 0.0
ご ま 葉 枯 病	13	1	0	0	0	14	7.1	1.8	発 病 度 : 0.4
白 葉 枯 病	14	0	0	0	0	14	0.0	0.0	発 病 度 : 0.0
イチモンシゝセセリ	14	0	0	0	0	14	0.0	0.0	苞 数 /25 株 (個): 0.0
イネクロカメムシ	13	1	0	0	0	14	7.1	1.8	虫 数 /25 株 (頭): 0.1

普通期イネ

藍住町、板野町、上板町、阿波市、美馬市、吉野川市、石井町、東みよし町、三好市調査： 8/12、13

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
穂 い も ち	22	1	0	0	0	23	4.3	1.1	発 病 穂 率 (%)： 0.0
(北 中 部)	12	1	0	0	0	13	7.7	1.9	0.0
(西 部)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0	0.0
紋 枯 病	11	10	1	1	0	23	52.2	16.3	発 病 株 率 (%)： 8.5
(北 中 部)	5	6	1	1	0	13	61.5	21.2	11.1
(西 部)	6	4	0	0	0	10	40.0	10.0	5.2
も み 枯 細 菌 病	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 穂 率 (%)： 0.0
ば か 苗 病	22	1	0	0	0	23	4.3	1.1	発 病 株 率 (%)： 0.2
(北 中 部)	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0	0.0
(西 部)	9	1	0	0	0	10	10.0	2.5	0.4
稲 こ う じ 病	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 株 率 (%)： 0.0
縞 葉 枯 病	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 株 率 (%)： 0.0
(北 中 部)	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0	0.0
(西 部)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0	0.0
縞 葉 枯 病	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 度 ： 0.0
(北 中 部)	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0	0.0
(西 部)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0	0.0
ヒメトビウンカ	9	14	0	0	0	23	60.9	15.2	虫 数 / 株 (頭)： 0.1
(北 中 部)	6	7	0	0	0	13	53.8	13.5	0.1
(西 部)	3	7	0	0	0	10	70.0	17.5	0.1
ニ カ メ イ ガ	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	被 害 株 率 (%)： 0.0
セ シ ° ロ ウ ン カ	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	虫 数 / 株 (頭)： 0.0
(北 中 部)	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0	0.0
(西 部)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0	0.0
ト ヒ ° イ ロ ウ ン カ	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	虫 数 / 株 (頭)： 0.0
ツ マ グ ロ ヨ コ バ イ	10	13	0	0	0	23	56.5	14.1	虫 数 / 株 (頭)： 0.6
(北 中 部)	5	8	0	0	0	13	61.5	15.4	0.8
(西 部)	5	5	0	0	0	10	50.0	12.5	0.4
斑点米カメムシ類	15	6	0	1	1	23	34.8	14.1	虫 数 /20 フリ (頭)： 2.7
(本 田 調 査)									
(北 中 部)	7	5	0	1	0	13	46.2	15.4	2.2
(西 部)	8	1	0	0	1	10	20.0	12.5	3.4
フタオビコヤガ	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	幼 虫 数 / 株 (頭)： 0.0
(北 中 部)	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0	0.0
(西 部)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0	0.0
コブノメイガ	16	6	1	0	0	23	30.4	8.7	被 害 株 率 (%)： 1.9
(北 中 部)	11	2	0	0	0	13	15.4	3.8	0.6
(西 部)	5	4	1	0	0	10	50.0	15.0	3.6
ご ま 葉 枯 病	21	2	0	0	0	23	8.7	2.2	発 病 度 ： 0.5
白 葉 枯 病	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 度 ： 0.0
萎 縮 病	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	発 病 株 率 (%)： 0.0
イチモンシ°セセリ	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	苞 数 /25 株 (個)： 0.0
イネクロカメムシ	23	0	0	0	0	23	0.0	0.0	虫 数 /25 株 (頭)： 0.0

北中部： 藍住町、板野町、上板町、阿波市、吉野川市、石井町

西部： 東みよし町、三好市、美馬市

普通期イネ

藍住町、板野町、上板町、阿波市、美馬市、吉野川市、三好市調査： 8/25、27

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
穂 い も ち	19	2	0	0	0	21	9.5	2.4	発 病 穂 率 (%)： 0.0
(北 中 部)	11	0	0	0	0	11	0.0	0.0	0.0
(西 部)	8	2	0	0	0	10	20.0	5.0	0.0
紋 枯 病	15	6	0	0	0	21	28.6	7.1	発 病 度 ： 1.4
(北 中 部)	8	3	0	0	0	11	27.3	6.8	1.5
(西 部)	7	3	0	0	0	10	30.0	7.5	1.3
もみ枯細菌病	21	0	0	0	0	21	0.0	0.0	発 病 穂 率 (%)： 0.0
ば か 苗 病	21	0	0	0	0	21	0.0	0.0	発 病 株 率 (%)： 0.0
稲 こう じ 病	21	0	0	0	0	21	0.0	0.0	発 病 株 率 (%)： 0.0
縞 葉 枯 病	21	0	0	0	0	21	0.0	0.0	発 病 株 率 (%)： 0.0
(北 中 部)	11	0	0	0	0	11	0.0	0.0	0.0
(西 部)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0	0.0
縞 葉 枯 病	21	0	0	0	0	21	0.0	0.0	発 病 度 ： 0.0
(北 中 部)	11	0	0	0	0	11	0.0	0.0	0.0
(西 部)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0	0.0
ヒメトビウンカ	5	16	0	0	0	21	76.2	19.0	虫 数 / 株 (頭)： 0.2
(北 中 部)	3	8	0	0	0	11	72.7	18.2	0.1
(西 部)	2	8	0	0	0	10	80.0	20.0	0.2
ニ カ メ イ ガ	20	1	0	0	0	21	4.8	1.2	被 害 株 率 (%)： 0.4
セシ [〃] ロウンカ	20	1	0	0	0	21	4.8	1.2	虫 数 / 株 (頭)： 0.0
(北 中 部)	10	1	0	0	0	11	9.1	2.3	0.0
(西 部)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0	0.0
トビ [〃] イロウンカ	21	0	0	0	0	21	0.0	0.0	虫 数 / 株 (頭)： 0.0
(北 中 部)	11	0	0	0	0	11	0.0	0.0	0.0
(西 部)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0	0.0
ツマグロヨコバイ	10	10	1	0	0	21	52.4	14.3	虫 数 / 株 (頭)： 1.0
(北 中 部)	6	4	1	0	0	11	45.5	13.6	1.5
(西 部)	4	6	0	0	0	10	60.0	15.0	0.2
斑点米カメムシ類 (本 田 調 査)	7	11	3	0	0	21	66.7	20.2	虫 数 /20 フリ (頭)： 1.5
(北 中 部)	4	7	0	0	0	11	63.6	15.9	0.8
(西 部)	3	4	3	0	0	10	70.0	25.0	2.3
フタオビコヤガ	21	0	0	0	0	21	0.0	0.0	幼 虫 数 / 株 (頭)： 0.0
(北 中 部)	11	0	0	0	0	11	0.0	0.0	0.0
(西 部)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0	0.0
コブノメイガ	21	0	0	0	0	21	0.0	0.0	上 位 2 葉 の 被 害 葉 率 (%)： 0.0
(北 中 部)	11	0	0	0	0	11	0.0	0.0	0.0
(西 部)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0	0.0
ご ま 葉 枯 病	21	0	0	0	0	21	0.0	0.0	発 病 度 ： 0.0
白 葉 枯 病	21	0	0	0	0	21	0.0	0.0	発 病 度 ： 0.0
萎 縮 病	21	0	0	0	0	21	0.0	0.0	発 病 株 率 (%)： 0.0
イチモンジ [〃] セセリ	21	0	0	0	0	21	0.0	0.0	苞 数 /25 株 (個)： 0.0
イネクロカメムシ	21	0	0	0	0	21	0.0	0.0	虫 数 /25 株 (頭)： 0.0

北中部： 藍住町、板野町、上板町、阿波市、吉野川市、石井町

西部： 東みよし町、三好市、美馬市

サツマイモ

徳島市、鳴門市、松茂町調査： 8/12

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
食 葉 性 害 虫	4	10	1	0	0	15	73.3	20.0	被 害 度 ： 6.6
イ モ キ バ ガ	15	0	0	0	0	15	0.0	0.0	被 害 葉 率 (%) : 0.0
ハ ダ ニ 類	7	5	0	2	1	15	53.3	25.0	寄 生 葉 率 (%) : 20.1
立 枯 病	15	0	0	0	0	15	0.0	0.0	発 生 面 積 率 (%) : 0.0
タバココナシラミ	2	8	5	0	0	15	86.7	30.0	寄 生 株 率 (%) : 27.7

[果 樹]

温州ミカン

徳島市、勝浦町、佐那河内村調査： 8/12、13

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
そ う か 病	6	2	0	0	0	8	25.0	6.3	果実の発病程度: 0.8
アブラムシ類	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	寄 生 新 梢 率 : 0.0
ミカンハダニ	3	5	0	0	0	8	62.5	15.6	春 葉 の 寄 生 率 : 5.1
ミカンハモグリガ	2	6	0	0	0	8	75.0	18.8	寄 生 葉 率 : 3.4
ゴマダラカミキリ	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	10樹当たり 寄生虫数(頭): 0.0

スダチ

徳島市、神山町、佐那河内村、勝浦町調査： 8/13

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
か い よ う 病	2	6	0	0	0	8	75.0	18.8	果 実 の 発 病 程 度 : 1.4
そ う か 病	5	3	0	0	0	8	37.5	9.4	春 葉 の 発 病 程 度 : 1.1
そ う か 病	5	2	1	0	0	8	37.5	12.5	果 実 の 発 病 程 度 : 5.5
アブラムシ類	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	寄 生 新 梢 率 : 0.0
ミカンハダニ	5	2	0	0	1	8	37.5	18.8	春 葉 の 寄 生 率 : 13.0
ミカンサビダニ	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	1 樹 当 た り 被 害 果 数 : 0.0
ミカンハモグリガ	4	4	0	0	0	8	50.0	12.5	寄 生 葉 率 : 2.3
ゴマダラカミキリ	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	10樹当たり 寄生虫数(頭): 0.0

ナ シ

鳴門市、松茂町調査: 8/13

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
黒 星 病	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	発 病 果 率 (%) : 0.0
カ メ ム シ 類	7	0	1	0	0	8	12.5	6.3	被 害 果 率 (%) : 0.5
ナシヒメシンクイ	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	被 害 果 率 (%) : 0.0
ハ ダ ニ 類	0	3	0	0	4	7	100.0	67.9	寄 生 葉 率 (%) : 49.0
ハマキムシ類	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	被 害 果 率 (%) : 0.0
う ど ん こ 病	6	1	0	0	0	7	14.3	3.6	葉 の 発 病 程 度 : 0.2
輪 紋 病	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	発 病 果 率 (%) : 0.0

カ キ

上板町、つるぎ町、東みよし町調査: 8/25、27

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
炭 疽 病	6	0	0	0	0	6	0.0	0.0	発 病 果 率 (%) : 0.0
カキノヘタムシガ	6	0	0	0	0	6	0.0	0.0	被 害 果 率 (%) : 0.0
フジコナカイガラムシ	6	0	0	0	0	6	0.0	0.0	寄 生 果 率 (%) : 0.0
チャノキイロアザミウマ	6	0	0	0	0	6	0.0	0.0	被 害 果 率 (%) : 0.0
カキクタアザミウマ	6	0	0	0	0	6	0.0	0.0	被 害 果 率 (%) : 0.0
カ メ ム シ 類	6	0	0	0	0	6	0.0	0.0	被 害 果 率 (%) : 0.0
ハマキムシ類	6	0	0	0	0	6	0.0	0.0	被 害 果 率 (%) : 0.0
角 斑 落 葉 病	6	0	0	0	0	6	0.0	0.0	発 病 葉 率 (%) : 0.0
イ ラ ガ	6	0	0	0	0	6	0.0	0.0	寄 生 葉 率 (%) : 0.0

[野 菜]

夏秋ナス

阿波市、美馬市、三好市、東みよし町調査: 8/27、28

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
う ど ん こ 病	7	2	0	0	0	9	22.2	5.6	発 病 度 : 0.4
アブラムシ類	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	1葉当たりの寄生虫数(頭): 0.0
ハスモンヨトウ	8	1	0	0	0	9	11.1	2.8	被 害 度 : 0.2
〃	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	被 害 果 率 (%) : 0.0
ハ ダ ニ 類	6	3	0	0	0	9	33.3	8.3	寄 生 葉 率 (%) : 2.9
アザミウマ類	6	3	0	0	0	9	33.3	8.3	寄 生 葉 率 (%) : 1.2
〃	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	被 害 果 率 (%) : 0.0
オオタバコガ	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	100葉当たりの卵数(個): 0.0
〃	7	2	0	0	0	9	22.2	5.6	被 害 果 率 (%) : 0.2
青 枯 病	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	発 病 株 率 (%) : 0.0
褐色腐敗病	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	発 病 果 率 (%) : 0.0
ニジユウヤホシデントウ	8	1	0	0	0	9	11.1	2.8	被 害 葉 率 (%) : 0.4

秋冬ネギ

徳島市調査： 8/25

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率 (%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
黒 斑 病	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	発 病 度 ： 0.0
ネギアザミウマ	5	4	0	0	0	9	44.4	11.1	被 害 度 ： 1.7
ハスモンヨトウ	8	1	0	0	0	9	11.1	2.8	寄 生 株 率 (%)： 0.2
シロイチモジヨトウ	4	2	1	2	0	9	55.6	27.8	寄 生 株 率 (%)： 9.6
〃	4	2	2	1	0	9	55.6	25.0	寄 生 虫 数 (頭)： 4.1
ネギハモグリバエ	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	被 害 度 ： 0.0

冬春イチゴ

徳島市、小松島市、阿南市、佐那河内村、阿波市調査： 8/25、28

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目および発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
炭 疽 病	9	2	0	0	0	11	18.2	4.5	発 病 株 率 (%)： 0.3
ハ ダ ニ 類	8	3	0	0	0	11	27.3	6.8	寄 生 株 率 (%)： 4.0
萎 黄 病	11	0	0	0	0	11	0.0	0.0	発 病 株 率 (%)： 0.0

ハ ス

徳島市、鳴門市、板野町調査： 8/25

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
ハスモンヨトウ	2	2	3	0	0	7	71.4	28.6	被 害 葉 率 (%)： 4.3
褐 斑 病	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	発 病 度 ： 0.0

注1) 発生程度指数*は以下の式より 求めている。
発生程度指数＝
$$\frac{少 \times 1 + 中 \times 2 + 多 \times 3 + 甚 \times 4}{調査圃場数 \times 4} \times 100$$

各種フェロモントラップ




図1 ナシヒメシンクイムシ フェロモントラップ誘殺数推移
※鳴門市、松茂町の7地点平均




図2 ナシヒメシンクイムシ フェロモントラップ誘殺数推移
※無防除圃場(農総技支センター上板)




図3 3種果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ)フェロモントラップ誘殺数(石井町)




図4 予察灯による果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ)の誘殺数(勝浦町)




図5 予察灯による果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ)の誘殺数(上板町)




図6 オオタバコガ フェロモントラップ誘殺数推移
*阿波市・三好市・東みよし町・石井町の6地点平均




図7 ハスモンヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(野菜圃場)
* 徳島市・石井町・阿波市・吉野川市・東みよし町・三好市の9地点平均




図8 シロイチモジヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(野菜圃場)
* 徳島市・石井町・阿波市・吉野川市の7地点平均




図9 ハスモンヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(甘藷圃場)
* 徳島市・鳴門市・松茂町の4地点平均




図10 シロイチモジヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(甘藷園場)
 * 徳島市・鳴門市・松茂町の4地点平均