

令和8年度発生予察月報（9月）

徳島県立農林水産総合技術支援センター
病虫害防除所

I. 気象概況（徳島地方気象台観測値）

	平均気温(℃)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	本年	平年	差	本年	平年	差	本年	平年	差
上旬	26.0	26.4	- 0.4	185.5	79.7	+ 105.8	16.9	60.4	- 43.5
中旬	25.6	25.0	+ 0.6	70.0	103.2	- 33.2	31.5	55.2	- 23.7
下旬	23.8	22.9	+ 0.9	53.5	88.3	- 34.8	43.5	46.5	- 3.0

II. 病虫害の発生状況

[普通作物]

普通期イネ

藍住町、板野町、阿波市、美馬市、吉野川市、東みよし町、三好市調査： 9/11

病虫害名	発生程度別圃場数						発生圃場率(%)	発生程度指数*	調査項目及び発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
穂いもち	9	4	0	0	0	13	30.8	7.7	発病穂率(%):	0.1
(北中部)	3	0	0	0	0	3	0.0	0.0		0.0
(西部)	6	4	0	0	0	10	40.0	10.0		0.1
紋枯病	6	7	0	0	0	13	53.8	13.5	発病度:	3.6
(北中部)	1	2	0	0	0	3	66.7	16.7		3.0
(西部)	5	5	0	0	0	10	50.0	12.5		3.8
もみ枯細菌病	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0	発病穂率(%):	0.0
(北中部)	3	0	0	0	0	3	0.0	0.0		0.0
(西部)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0		0.0
稲こうじ病	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0	発病株率(%):	0.0
(北中部)	3	0	0	0	0	3	0.0	0.0		0.0
(西部)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0		0.0
縞葉枯病	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0	発病株率(%):	0.0
(北中部)	3	0	0	0	0	3	0.0	0.0		0.0
(西部)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0		0.0
縞葉枯病	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0	発病度:	0.0
(北中部)	3	0	0	0	0	3	0.0	0.0		0.0
(西部)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0		0.0
トヒ・イロウンカ	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0	虫数/株(頭):	0.0
(北中部)	3	0	0	0	0	3	0.0	0.0		0.0
(西部)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0		0.0
ツマグロヨコバイ	6	7	0	0	0	13	53.8	13.5	虫数/株(頭):	0.2
(北中部)	1	2	0	0	0	3	66.7	16.7		1.1
(西部)	5	5	0	0	0	10	50.0	12.5		0.2
斑点米カメムシ類	5	4	3	0	1	13	61.5	26.9	虫数/20フリ(頭):	4.9
(本田調査)										
(北中部)	2	0	1	0	0	3	33.3	16.7		1.3
(西部)	3	4	2	0	1	10	70.0	30.0		6.0
フタオビコヤガ	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0	幼虫数/株(頭):	0.0
(北中部)	3	0	0	0	0	3	0.0	0.0		0.0
(西部)	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0		0.0
コブノメイガ	9	4	0	0	0	13	30.8	7.7	上位2葉の被害葉率(%):	0.0
(北中部)	3	0	0	0	0	3	0.0	0.0		0.0
(西部)	6	4	0	0	0	10	40.0	10.0		0.0
ごま葉枯病	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0	発病度:	0.0
白葉枯病	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0	発病度:	0.0
萎縮病	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0	発病株率(%):	0.0
イネクロカメムシ	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0	虫数/25株(頭):	0.0

北中部：藍住町、吉野川市、阿波市、板野町
西部：美馬市、三好市、東みよし町

[果 樹]

温州ミカン

徳島市、勝浦町、佐那河内村調査： 9/25

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
アブラムシ類	0	0	3	3	2	8	100.0	71.9	寄 生 新 梢 率 ： 17.1
ミカンハダニ	6	2	0	0	0	8	25.0	6.3	春 葉 の 寄 生 率 ： 3.0
ヤノネカイカ [*] ラムシ	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	果 実 の 幼 虫 寄 生 率 ： 0.0

ナシ

鳴門市、松茂町調査: 9/11

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
黒 星 病	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	発 病 葉 率 (％): 0.0
ハダニ類	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	寄 生 葉 率 (％): 0.0
うどんこ病	5	3	0	0	0	8	37.5	9.4	葉 の 発 病 程 度 ： 1.1

カキ

上板町、つるぎ町、東みよし町調査： 9/25、28

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
炭 疽 病	6	0	0	0	0	6	0.0	0.0	発 病 果 率 (％): 0.0
カキノヘタムシガ	6	0	0	0	0	6	0.0	0.0	被 害 果 率 (％): 0.0
フジコナカイカ [*] ラムシ	5	0	1	0	0	6	16.7	8.3	寄 生 果 率 (％): 0.7
カメムシ類	4	2	0	0	0	6	33.3	8.3	被 害 果 率 (％): 0.3
ハマキムシ類	6	0	0	0	0	6	0.0	0.0	被 害 果 率 (％): 0.0
円 星 落 葉 病	4	2	0	0	0	6	33.3	8.3	発 病 葉 率 (％): 0.8
角 斑 落 葉 病	1	3	2	0	0	6	83.3	29.2	発 病 葉 率 (％): 6.0
イ ラ ガ	6	0	0	0	0	6	0.0	0.0	寄 生 葉 率 (％): 0.0

[野 菜]

ブロッコリー・カブフラワー

徳島市、阿波市調査： 9/25、29

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
コ ナ ガ	16	1	0	0	0	17	5.9	1.5	10株当たり 幼虫・ 蛹数(頭): 0.0
ハス モンヨトウ	11	3	3	0	0	17	35.3	13.2	寄 生 株 率 (%): 2.5
シロイチモジヨトウ	12	1	4	0	0	17	29.4	13.2	寄 生 株 率 (%): 2.8
根 こ ぶ 病	17	0	0	0	0	17	0.0	0.0	萎 ち ょ う 株 率 (%): 0.0
ア ブ ラ ム シ 類	10	7	0	0	0	17	41.2	10.3	寄 生 株 率 (%): 4.5
モンシロチョウ	16	1	0	0	0	17	5.9	1.5	10株当たり 幼虫数(頭): 0.1

秋冬ネギ

徳島市調査： 9/11

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率 (%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
黒 斑 病	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	発 病 度 : 0.0
ネギアザミウマ	8	0	1	0	0	9	11.1	5.6	被 害 度 : 1.6
ハス モンヨトウ	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	寄 生 株 率 (%) : 0.0
シロイチモジヨトウ	2	6	1	0	0	9	77.8	22.2	寄 生 株 率 (%) : 3.8
〃	2	6	1	0	0	9	77.8	22.2	寄 生 虫 数 (頭) : 1.7
ネギハモグリバエ	8	1	0	0	0	9	11.1	2.8	被 害 度 : 0.1

秋冬ネギ

徳島市調査： 9/29

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率 (%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
さ び 病	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	発 病 株 率 (%) : 0.0
黒 斑 病	8	1	0	0	0	9	11.1	2.8	発 病 度 : 0.1
ベ と 病	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	発 病 株 率 (%) : 0.0
ア ブ ラ ム シ 類	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	寄 生 株 率 (%) : 0.0
ネギアザミウマ	7	2	0	0	0	9	22.2	5.6	被 害 度 : 0.8
ハス モンヨトウ	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	寄 生 株 率 (%) : 0.0
シロイチモジヨトウ	6	2	1	0	0	9	33.3	11.1	寄 生 株 率 (%) : 3.1
〃	6	2	1	0	0	9	33.3	11.1	寄 生 虫 数 (頭) : 1.1
ネギハモグリバエ	8	1	0	0	0	9	11.1	2.8	被 害 度 : 0.1

冬春イチゴ

徳島市、小松島市、阿南市、佐那河内村、阿波市調査： 9/25

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目および発生の特徴			
	無	少	中	多	甚	合計						
うどんこ病	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0	発	病	葉	率 (%)： 0.0
炭 疽 病	10	1	2	0	0	13	23.1	9.6	発	病	株	率 (%)： 1.2
アブラムシ類	11	1	0	0	1	13	15.4	9.6	寄	生	株	率 (%)： 7.7
ハダニ類	12	1	0	0	0	13	7.7	1.9	寄	生	株	率 (%)： 0.2
〃	12	1	0	0	0	13	7.7	1.9	寄	生	葉	率 (%)： 0.1
ハスモンヨトウ	7	6	0	0	0	13	46.2	11.5	被	害	株	率 (%)： 3.7
〃	10	2	1	0	0	13	23.1	7.7	幼	虫	寄	生 株 率 (%)： 1.1
萎 黄 病	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0	発	病	株	率 (%)： 0.0

注1) 発生程度指数*は以下の式より求めている。

発生程度指数＝
$$\frac{(\text{少}\times 1 + \text{中}\times 2 + \text{多}\times 3 + \text{甚}\times 4)}{\text{調査圃場数}\times 4} \times 100$$

各種フェロモントラップ




図1 ナシヒメシンクイムシ フェロモントラップ誘殺数推移
※鳴門市、松茂町の7地点平均




図2 ナシヒメシンクイムシ フェロモントラップ誘殺数推移
※無防除圃場(農総技支センター上板)




図3 3種果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ)フェロモントラップ誘殺数(石井町)




図4 予察灯による果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ)の誘殺数(勝浦町)




図5 予察灯による果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ)の誘殺数(上板町)




図6 オオタバコガ フェロモントラップ誘殺数推移
*阿波市・三好市・東みよし町・石井町の6地点平均




図7 ハスモンヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(野菜圃場)
* 徳島市・石井町・阿波市・吉野川市・東みよし町・三好市の9地点平均




図8 シロイチモジヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(野菜圃場)
* 徳島市・石井町・阿波市・吉野川市の7地点平均




図9 ハスモンヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(甘藷圃場)
* 徳島市・鳴門市・松茂町の4地点平均




図10 シロイチモジヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(甘藷圃場)
* 徳島市・鳴門市・松茂町の4地点平均