次回は、R8年10月27日火曜日の発行です。

週間漁海況情報　2026年第40号

令和8年10月20日発行


徳島県立農林水産総合技術支援センター
水産研究課海洋生産技術担当

海況

1. 周辺海域の水温等

紀伊水道沖の黒潮は、室戸岬沖40マイル付近、潮岬沖20マイル付近を流れ、室戸岬で「やや離岸」、潮岬で「接岸」している。

黒潮の表面水温は25～27℃台。徳島周辺海域の表面水温は、播磨灘で24、紀伊水道で23～25、海部沿岸で24～25℃台となっている。




※黒潮の離接岸の表現　（いずれも正南方向）
　室戸岬沖　接岸：～25NM　やや離岸：25～45NM　離岸：45～65NM　著しく離岸：65NM～
　潮岬沖　　接岸：～26NM　やや離岸：26～56NM　離岸：56～86NM　著しく離岸：86NM～
※図中の破線は黒潮の北縁を示しています。

直近4日分の海況図を水産研究課HPに掲載しています。


2. 地先水温（10月14日～10月20日）

鳴門地区の水温は、25.2～24.5℃で「やや高め」で推移。浅川地区は、26.2～24.9℃で「やや高め」で推移。鳴門と浅川地区の水温差は、0.4～1.2℃だった。

鳴門地区



浅川地区



※水温の高低　平年並み：平年値±0.5℃未満，やや高め/やや低め：平年値±0.5℃以上1.5℃未満
　高め/低め：平年値±1.5℃以上2.5℃未満，かなり高め/かなり低め：±2.5℃ 以上
※ 平　年　値　1984年～2022年（鳴門）、2018年～2022年（浅川）の平滑平均値（いずれも日平均水温を使用）

3. 週間予報（10月21日～10月27日）

黒潮は、室戸岬沖で「やや離岸」、潮岬沖で「接岸」して推移する見込み。

地先水温は、鳴門、浅川地区とも「やや高め」で推移する見込み。

漁況（10月12日～10月18日）

１．紀伊水道（標本漁協：４）
船びき網では、シラスが増えて101ﾄﾝ水揚げされた。
延縄では、サワラが大きく増えて大主体に4.4ﾄﾝ水揚げされた。
底びき網では、クマエビが増えて2.5ﾄﾝ、ハモが増えて中主体に1ﾄﾝ、タチウオが0.6ﾄﾝ、
コウイカが増えて小主体に0.6ﾄﾝ、ヨシエビが増えて0.2ﾄﾝ水揚げされた。
建網では、カワハギが大きく増えて大主体に0.6ﾄﾝ、メジナが大きく増えて0.4ﾄﾝ水揚げされた。
小型定置網では、カンパチが増えて0.6ﾄﾝ水揚げされた。

２．海部沿岸（標本漁協：４）
釣りでは、キハダが大きく増えて0.7ﾄﾝ水揚げされた。

漁獲量集計表（漁獲量が0.2トン以上のものを抜粋）

海区	漁業種類	出漁隻数（のべ）	魚種	漁獲量 (kg)	1日1隻あたり平均漁獲量	銘柄	前週比※
紀伊水道	船びき網	87	シラス	100,980	1,161		↗
	延縄	61	サワラ	4,427	73	大主体	↗↗
	底びき網	38	クマエビ	2,544	67		↗
		38	ハモ	962	25	中主体	↗
		34	タチウオ	635	19		→
		38	コウイカ	635	17	小主体	↗
		38	ヨシエビ	203	5		↗
	建網	109	カワハギ	572	5	大主体	↗↗
		71	メジナ	439	6		↗↗
	小型定置網	21	カンパチ	636	30		↗
沿海岸部	釣り	9	キハダ	695	77		↗↗

※ 前週比　200%以上:↗↗ 120-200%:↗ 80-120%:→ 50-80%:↘ 50%未満:↘↘