令和８年度発生予察月報(10月)

徳島県立農林水産総合技術支援センター
病害虫防除所

I. 気象概況

（徳島地方気象台観測値）

	平均気温（℃）			降水量（mm）			日照時間（h）		
	本年	平年	差	本年	平年	差	本年	平年	差
上旬	21.3	21.3	0	48.5	70.3	- 21.8	74.6	51.1	+ 23.5
中旬	22.2	19.5	+ 2.7	5.0	75.2	- 70.2	71.7	54.3	+ 17.4
下旬	20.6	17.4	+ 3.2	73.5	54.0	+ 19.5	55.3	58.2	- 2.9

II. 病害虫の発生状況

[果　樹]

温州ミカン

徳島市、勝浦町、佐那河内村調査： 10/29

病害虫名	発生程度別圃場数						発生圃場率(%)	発生程度指数*	調査項目及び発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
ミカンハダニ	4	4	0	0	0	8	50.0	12.5	春葉の寄生率：	5.5
カメムシ類	5	3	0	0	0	8	37.5	9.4	被害果率：	0.5

ナ　シ

鳴門市、松茂町調査: 10/14

病害虫名	発生程度別圃場数						発生圃場率(%)	発生程度指数*	調査項目及び発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
黒星病	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	発病葉率(%):	0.0
ハダニ類	7	1	0	0	0	8	12.5	3.1	寄生葉率(%):	0.3
うどんこ病	0	7	1	0	0	8	100.0	28.1	葉の発病程度：	5.8

カ　キ

上板町、つるぎ町、東みよし町調査： 10/14、15

病害虫名	発生程度別圃場数						発生圃場率(%)	発生程度指数*	調査項目及び発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
炭疽病	5	1	0	0	0	6	16.7	4.2	発病果率(%):	0.2
ｶﾒﾑｼﾉﾊｸﾑﾝｶﾞ	6	0	0	0	0	6	0.0	0.0	被害果率(%):	0.0
ﾌｼﾞｺﾅｶｲｶﾞﾗﾑｼ	5	0	1	0	0	6	16.7	8.3	寄生果率(%):	0.5
カメムシ類	4	0	1	0	1	6	33.3	25.0	被害果率(%):	3.3
ハマキムシ類	6	0	0	0	0	6	0.0	0.0	被害果率(%):	0.0
うどんこ病	5	1	0	0	0	6	16.7	4.2	発病葉率(%):	0.3
円星落葉病	4	2	0	0	0	6	33.3	8.3	発病葉率(%):	1.5
角斑落葉病	1	4	1	0	0	6	83.3	25.0	発病葉率(%):	7.0

[野　菜]

冬春トマト

阿波市調査: 10/27、29

病害虫名	無	少	中	多	甚	合計	発生圃場率(%)	発生程度指数*	調査項目及び発生の特徴	
疫病	5	0	0	0	0	5	0.0	0.0	発病度 :	0.0
アブラムシ類	5	0	0	0	0	5	0.0	0.0	寄生株率(%) :	0.0
ﾀﾊﾞｺｺﾅｼﾞﾗﾐ	0	5	0	0	0	5	100.0	25.0	1葉当たり寄生虫数(頭) :	0.6
〃	0	4	0	1	0	5	100.0	35.0	寄生葉率(%) :	25.6
ｵﾝｼﾂｺﾅｼﾞﾗﾐ	5	0	0	0	0	5	0.0	0.0	1葉当たり寄生虫数(頭) :	0.0
〃	5	0	0	0	0	5	0.0	0.0	寄生葉率(%) :	0.0
青枯病	5	0	0	0	0	5	0.0	0.0	発病株率(%) :	0.0
菌核病	5	0	0	0	0	5	0.0	0.0	発病株率(%) :	0.0
萎凋病	5	0	0	0	0	5	0.0	0.0	発病株率(%) :	0.0

冬春ナス

吉野川市、阿波市調査: 10/27、29

病害虫名	無	少	中	多	甚	合計	発生圃場率(%)	発生程度指数*	調査項目及び発生の特徴	
うどんこ病	6	1	0	0	0	7	14.3	3.6	発病葉率(%) :	3.1
〃	6	1	0	0	0	7	14.3	3.6	発病度 :	0.9
すすかび病	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	発病葉率(%) :	0.0
〃	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	発病度 :	0.0
アブラムシ類	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	寄生葉率(%) :	0.0
〃	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	1葉当たり寄生虫数(頭) :	0.0
アザミウマ類	5	2	0	0	0	7	28.6	7.1	寄生葉率(%) :	0.3
〃	6	1	0	0	0	7	14.3	3.6	被害果率(%) :	0.6
ｵﾝｼﾂｺﾅﾝﾌﾐ	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	成虫寄生葉率(%) :	0.0
ﾀﾊｺｼﾅﾝﾌﾐ	0	3	0	2	2	7	100.0	60.7	成虫寄生葉率(%) :	46.9
ハスモンヨトウ	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	被害度 :	0.0
〃	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	被害果率(%) :	0.0
ハダニ類	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	寄生葉率(%) :	0.0
青枯病	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	発病株率(%) :	0.0
菌核病	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	発病株率(%) :	0.0
黒枯病	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	発病度 :	0.0

秋冬ダイコン

鳴門市、松茂町調査： 10/14

	発生程度別圃場数						発生圃場率(%)	発生程度指数*	調査項目及び発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
アブラムシ類	5	0	0	0	0	5	0.0	0.0	発生程度指数：	0.0
コナガ	5	0	0	0	0	5	0.0	0.0	10株当たり幼虫・蛹数:	0.0
〃	5	0	0	0	0	5	0.0	0.0	寄生株率：	0.0
ハスモンヨトウ	5	0	0	0	0	5	0.0	0.0	寄生株率：	0.0
シロイナモンヨトウ	3	2	0	0	0	5	40.0	10.0	寄生株率：	0.8
軟腐病	5	0	0	0	0	5	0.0	0.0	発病株率：	0.0
黒斑細菌病	5	0	0	0	0	5	0.0	0.0	発病株率：	0.0
黒腐病	5	0	0	0	0	5	0.0	0.0	発病株率：	0.0
べと病	5	0	0	0	0	5	0.0	0.0	発病度：	0.0
ハイマダラノメイガ	5	0	0	0	0	5	0.0	0.0	寄生株率：	0.0

秋冬ダイコン

鳴門市、松茂町調査： 10/29

	発生程度別圃場数						発生圃場率(%)	発生程度指数*	調査項目及び発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
アブラムシ類	5	2	0	0	0	7	28.6	7.1	発生程度指数：	0.4
コナガ	6	1	0	0	0	7	14.3	3.6	10株当たり幼虫・蛹数:	0.1
〃	6	1	0	0	0	7	14.3	3.6	寄生株率：	0.6
ハスモンヨトウ	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	寄生株率：	0.0
シロイナモンヨトウ	2	5	0	0	0	7	71.4	17.9	寄生株率：	1.7
軟腐病	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	発病株率：	0.0
黒斑細菌病	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	発病株率：	0.0
黒腐病	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	発病株率：	0.0
べと病	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	発病度：	0.0
ハイマダラノメイガ	5	2	0	0	0	7	28.6	7.1	寄生株率：	0.6

ブロッコリー・カリフラワー

徳島市、阿波市調査： 10/27、29

病害虫名	発生程度別圃場数						発生圃場率(%)	発生程度指数*	調査項目及び発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
コナガ	8	5	0	0	0	13	38.5	9.6	10株当たり幼虫・蛹数(頭):	0.3
ハスモンヨトウ	3	6	3	1	0	13	76.9	28.8	寄生株率(%):	4.3
シロイナセンヨトウ	8	1	3	0	1	13	38.5	21.2	寄生株率(%):	5.5
黒腐病	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0	発病度：	0.0
根こぶ病	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0	萎ちょう株率(%):	0.0
アブラムシ類	4	9	0	0	0	13	69.2	17.3	寄生株率(%):	3.7
モンシロチョウ	11	2	0	0	0	13	15.4	3.8	10株当たり幼虫数(頭):	0.2
黒すす病	6	6	0	0	1	13	53.8	19.2	発病度：	7.7

秋冬ネギ

徳島市調査： 10/28

病害虫名	発生程度別圃場数						発生圃場率（%）	発生程度指数*	調査項目及び発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
さび病	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	発病株率(%)：	0.0
黒斑病	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	発病度：	0.0
べと病	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	発病株率(%)：	0.0
アブラムシ類	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	寄生株率(%)：	0.0
ネギアザミウマ	2	1	2	1	3	9	77.8	55.6	被害度：	20.6
ハスモンヨトウ	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	寄生株率(%)：	0.0
シロイナセンヨトウ	6	2	1	0	0	9	33.3	11.1	寄生株率(%)：	2.7
〃	6	2	1	0	0	9	33.3	11.1	寄生虫数(頭)：	0.9
ネギハモグリバエ	8	0	0	0	1	9	11.1	11.1	被害度：	4.2

冬レタス

阿波市調査： 10/15

病害虫名	発生程度別圃場数						発生圃場率（%）	発生程度指数*	調査項目及び発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
アブラムシ類	3	0	0	0	0	3	0.0	0.0	寄生株率(%)：	0.0
ハスモンヨトウ	3	0	0	0	0	3	0.0	0.0	寄生株率(%)：	0.0
シロイナセンヨトウ	3	0	0	0	0	3	0.0	0.0	寄生株率(%)：	0.0
オオタバコガ	3	0	0	0	0	3	0.0	0.0	寄生株率(%)：	0.0
軟腐病	3	0	0	0	0	3	0.0	0.0	発病株率(%)：	0.0
腐敗病	3	0	0	0	0	3	0.0	0.0	発病株率(%)：	0.0

冬レタス

阿波市調査： 10/27、29

病害虫名	発生程度別圃場数						発生圃場率（%）	発生程度指数*	調査項目及び発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
アブラムシ類	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	寄生株率(%)：	0.0
ハスモンヨトウ	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	寄生株率(%)：	0.0
シロイナセンヨトウ	7	1	0	0	0	8	12.5	3.1	寄生株率(%)：	0.3
オオタバコガ	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	寄生株率(%)：	0.0
軟腐病	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	発病株率(%)：	0.0
腐敗病	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	発病株率(%)：	0.0

冬春ホウレンソウ

徳島市、石井町調査： 10/27、29

病害虫名	発生程度別圃場数						発生圃場率(%)	発生程度指数*	調査項目及び発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
アブラムシ類	6	1	0	0	0	7	14.3	3.6	１株当たり寄生虫数(頭)：	0.0
べと病	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	発病度：	0.0
ンロヨヒノメイガ	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	寄生株率(%)：	0.0

冬春イチゴ

徳島市、小松島市、阿南市、佐那河内村、阿波市調査： 10/27、29

病害虫名	発生程度別圃場数						発生圃場率(%)	発生程度指数*	調査項目および発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
うどんこ病	12	0	0	0	0	12	0.0	0.0	発病葉率(%):	0.0
炭疽病	12	0	0	0	0	12	0.0	0.0	発病株率(%):	0.0
アブラムシ類	10	2	0	0	0	12	16.7	4.2	寄生株率(%):	2.7
ハダニ類	10	2	0	0	0	12	16.7	4.2	寄生株率(%):	0.7
〃	10	2	0	0	0	12	16.7	4.2	寄生葉率(%):	0.4
ハスモンヨトウ	3	9	0	0	0	12	75.0	18.8	被害株率(%):	5.3
〃	6	5	1	0	0	12	50.0	14.6	幼虫寄生株率(%):	1.3
萎黄病	12	0	0	0	0	12	0.0	0.0	発病株率(%):	0.0

注１）発生程度指数*は以下の式より求めている。

$$\text{発生程度指数} = \frac{(\text{少}\times 1 + \text{中}\times 2 + \text{多}\times 3 + \text{甚}\times 4)}{\text{調査圃場数}\times 4} \times 100$$

各種フェロモントラップ




図1　3種果樹カメムシ類（チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ）フェロモントラップ誘殺数（石井町）




図2　予察灯による果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ)の誘殺数（勝浦町）




図3　予察灯による果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ)の誘殺数（上板町）




図6　オオタバコガ　フェロモントラップ誘殺数推移
***阿波市・三好市・東みよし町・石井町の6地点平均**




図5 ハスモンヨトウフェロモントラップ誘殺数推移(野菜圃場)
＊徳島市、石井町、阿波市、吉野川市、東みよし町、三好市の9地点平均




図6 シロイチモジヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(野菜圃場)
＊徳島市、石井町、阿波市、吉野川市の7地点平均




図7ハスモンヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(甘藷圃場)
＊徳島市、鳴門市、松茂町の4地点平均




図8 シロイチモジヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(甘藷圃場)
＊徳島市、鳴門市、松茂町の4地点平均