注　　意　　報

農技セ第 5061 号
令和８年 11 月 10 日

各関係機関長　殿

徳島県立農林水産総合技術支援センター
病害虫防除所長

令和８年度農作物病害虫発生予察情報について

令和８年度農作物病害虫発生予察注意報第６号を発表したので送付します。

令和８年度病害虫発生予察注意報第６号

令和８年 11 月 10 日
徳　　島　　県

10 月 21 日から 31 日に行ったフェロモントラップ定点調査において、ハスモンヨトウの雄成虫の誘殺数が平年に比べてやや多く推移しています。特に 10 月 26 日から 31 日にかけて急激に増加したことから、今後、野菜類で本幼虫による被害の拡大が予想されますので、注意報を発令します。

現地圃場においては、本虫の発生状況を注視するとともに、適切な防除指導をお願いいたします。

作 物 名：野菜類
病害虫名：ハスモンヨトウ

１.発生地域　　県央部

２.発生時期　　11 月上・中旬～

３.発生程度　　中（前年よりやや多く、平年よりやや多い）

４.注意報発令の根拠

（１）県内の野菜圃場９地点に設置したフェロモントラップ調査において、10 月１日から 20 日までの平均誘殺数は平年に比べてやや少なく推移していたが、10 月 21 日から 31 日までの誘殺数は 1,261 頭で、平年(841 頭)の 1.5 倍と、急激に増加した（図１）。特に、吉野川市鴨島町では、1,193 頭と、平年（289 頭）の 4.1 倍、阿波市吉野町では、1,491 頭と、平年（621 頭）の 2.4 倍となった。

（２）10 月 26 日～30 日におけるブロッコリー・カリフラワーの巡回調査では、発生圃場率が 76.9%と、平年(43.1%)に比べてやや高いが、寄生株率が 4.3%と、平年(3.5%)並の発生である。

（３）高松地方気象台が 11 月 5 日に発表した１か月予報では、気温は平年より高く、降水量は平年並か多く、日照時間は平年並か少ないと予想されており、今後、栽培圃場への飛来及び加害の増加が予想される。




図１　ハスモンヨトウ　フェロモントラップ誘殺数の推移
（徳島市、石井町、吉野川市、阿波市、三好市、東みよし町の野菜圃場９地点の平均）



図２　ハスモンヨトウ（左 卵塊　中 若齢幼虫　右 老齢幼虫）

５.防除法等

(1) 中・老齢幼虫には薬剤の効果が低くなるので、若齢幼虫期に防除する(表１)。

(2) 卵塊や分散する前の若齢幼虫を発見したら、速やかに捕殺する。なお、施設の鉄パイプなどにも卵塊を産み付けるので、注意して観察する（図２)。

(3)セル成型苗を植え付ける場合には、セル成型トレイへの薬剤灌注処理が有効である。

(4)同一系統の薬剤の連用は薬剤抵抗性獲得の恐れがあるので避ける。

(5) 防除については、徳島県植物防疫指針を参照するとともに、薬剤の使用に当たっては、必ず農薬ラベル記載事項を遵守する。
(https://www.nouyaku-sys.com/noyaku/user/top/tokushima)

(6) 今後の発生動向については、徳島県立農林水産総合技術支援センターウェブページ内、病害虫防除所の各種データ・フェロモンのページを参考にする。
(https://www.pref.tokushima.lg.jp/tafftsc/t-boujosho/various-data)

表１　ハスモンヨトウに登録のある農薬（登録内容：2026 年 11 月 10 日現在）

作物名	農薬名称 （商品名）	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	RAC コード
いちご	アファーム乳剤	2000倍	収穫前日まで	2回以内	6
	コテツフロアブル	2000倍	収穫前日まで	2回以内	13
	ノーモルト乳剤	2000倍	収穫前日まで	2回以内	15
	プレオフロアブル	1000倍	収穫前日まで	4回以内	UN
	フェニックス顆粒水和剤	2000～4000倍	収穫前日まで	2回以内	28
	マトリックフロアブル	2000倍	収穫前日まで	3回以内	18
なす	アクセルフロアブル	1000～2000倍	収穫前日まで	3回以内	22B
	アファーム乳剤	2000倍	収穫前日まで	2回以内	6
	コテツフロアブル	2000倍	収穫前日まで	4回以内	13
	トルネードエースＤＦ	2000倍	収穫前日まで	2回以内	22A
	ノーモルト乳剤	2000倍	収穫前日まで	2回以内	15
	フェニックス顆粒水和剤	2000～4000倍	収穫前日まで	3回以内	28
	プレオフロアブル	1000倍	収穫前日まで	4回以内	UN
	プレバソンフロアブル５	2000倍	収穫前日まで	2回以内	28
	マトリックフロアブル	2000倍	収穫前日まで	3回以内	18
ブロッコリー	ベリマークSC	400倍（灌注）	育苗期後半～定植当日	1回	28
	プレバソンフロアブル5	100倍（灌注）	育苗期後半～定植当日	1回	28
	プレバソンフロアブル5	2000倍	収穫前日まで	3回以内	28
	ヨーバルフロアブル※はなやさい類で登録	2500～5000倍	収穫前日まで	3回以内	28
	ディアナSC	2500～5000倍	収穫前日まで	2回以内	5
	ファルコンエースフロアブル	2000倍	収穫3日前まで	2回以内	5,18
	アファーム乳剤	2000倍	収穫3日前まで	3回以内	6
	コテツフロアブル	2000倍	収穫3日前まで	2回以内	13
	トルネードエースDF	2000倍	収穫14日前まで	2回以内	22A
	アクセルフロアブル	1000～2000倍	収穫前日まで	2回以内	22B
	ベネビアOD	2000～4000倍	収穫前日まで	3回以内	28
	プロフレアSC※はなやさい類で登録	2000～4000倍	収穫前日まで	3回以内	30
	グレーシア乳剤※はなやさい類で登録	2000～3000倍	収穫7日前まで	2回以内	30
カリフラワー	アニキ乳剤	1000～2000倍	収穫前日まで	3回以内	6
	プレオフロアブル	1000倍	収穫3日前まで	2回以内	UN
	ベリマークSC	400倍（灌注）	育苗期後半～定植当日	1回	28
	プレバソンフロアブル５	2000倍	収穫前日まで	3回以内	28
	プロフレアSC※はなやさい類で登録	2000～4000倍	収穫前日まで	3回以内	30
	ヨーバルフロアブル※はなやさい類で登録	2500～5000倍	収穫前日まで	3回以内	28
	グレーシア乳剤※はなやさい類で登録	2000～3000倍	収穫7日前まで	2回以内	30
レタス	ベリマークSC	400倍(灌注)	育苗期後半～定植当日	1回	28
	アファーム乳剤	1000～2000倍	収穫3日前まで	3回以内	6
	カスケード乳剤	4000倍	収穫3日前まで	3回以内	15
	グレーシア乳剤	2000～3000倍	収穫3日前まで	2回以内	30
	コテツフロアブル	2000倍	収穫前日まで	2回以内	13
	ジュリボフロアブル	4000倍	収穫7日前まで	2回以内	28,4A
	ノーモルト乳剤	2000倍	収穫3日前まで	2回以内	15
	フェニックス顆粒水和剤	2000～4000倍	収穫前日まで	2回以内	28
	プレオフロアブル	1000倍	収穫7日前まで	2回以内	UN
	プレバソンフロアブル５	2000倍	収穫前日まで	3回以内	28
	プロフレアSC※レタス類で登録	2000～4000倍	収穫前日まで	3回以内	30
	マトリックフロアブル	2000倍	収穫7日前まで	3回以内	18
ほうれんそう	アニキ乳剤	1000～2000倍	収穫前日まで	3回以内	6
	ディアナSC	2500～5000倍	収穫前日まで	2回以内	5
	プレオフロアブル	1000倍	収穫前日まで	2回以内	UN
	アクセルフロアブル	1000～2000倍	収穫前日まで	3回以内	22B
	カスケード乳剤	4000倍	収穫3日前まで	3回以内	15
	アファーム乳剤	2000倍	収穫3日前まで	2回以内	6
	プレバソンフロアブル5	2000倍	収穫前日まで	3回以内	28
	グレーシア乳剤	2000～3000倍□	収穫7日前まで	2回以内	30
花き類	プレオフロアブル	1000倍	発生初期	4回以内	UN
	ヨーバルフロアブル	2500～5000倍	発生初期	3回以内	28
花き類（きくを除く）	ロムダンフロアブル	1000倍	発生初期	5回以内	18