

各関係機関長 殿
病害虫防除員 殿

徳島県立農林水産総合技術支援センター
病害虫防除所長
(公印省略)

平成26年度農作物病害虫発生予察情報について

平成26年度農作物病害虫発生予報第4号を発表したので送付します。

平成26年度農作物病害虫発生予報第4号

平成26年6月30日
徳島県

I. 普通作物

早期水稻

穂いもち

1) 予報内容

発生量 平年よりやや少なく(前年より少ない), 発生程度は「少」

2) 予報の根拠

- (1) 6月後半の巡回調査では, 葉いもちの発生圃場率は5.0%, 発病度は0.1であり, 平年(13.4%, 0.5)と比べてやや低めの発生である。
- (2) 6月26日発表の1か月予報では, 前半は平年に比べ曇りや雨の日が多いが, 後半は平年と同様に晴れの日が多いと見込まれている。気温はほぼ平年並, 降水量は平年並か多く, 日照時間は平年並か少ないと予想されており, 発生には中間的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

- (1) 葉いもちの発生の多い圃場では, 薬剤の登録内容を確認の上, 粒剤の場合は出穂10日前までに, 液剤の場合は出穂直前までに防除を行なう。また, 出穂後曇雨天が続いた場合は, 穂揃期にも防除を行なう。

紋枯病

1) 予報内容

発生量 平年並(前年並)で, 発生程度は「少」

2) 予報の根拠

- (1) 6月後半の巡回調査では, 発生を認めていない(平年同時期は発生圃場率が4.2%, 発病株率が1.5%)。
- (2) 6月26日発表の1か月予報では, 前半は平年に比べ曇りや雨の日が多いが, 後半は平年と同様に晴れの日が多いと見込まれている。気温はほぼ平年並, 降水量は平年並か多く, 日照時間は平年並か少ないと予想されており, 発生には中間的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

- (1) 今後の発生に十分注意し, 基幹防除を励行する。

セジロウンカ

1) 予報内容

発生量 平年よりやや少なく(前年より少ない), 発生程度は「少」

2) 予報の根拠

- (1) 6月後半の巡回調査では、発生圃場率は5.0%、株あたり虫数は0.002頭であり、平年(33.5%、0.07頭)と比べてやや低めの発生である。
- (2) 6月26日発表の1か月予報では、前半は平年に比べ曇りや雨の日が多いが、後半は平年と同様に晴れの日が多いと見込まれている。気温はほぼ平年並、降水量は平年並か多く、日照時間は平年並か少ないと予想されており、発生には中間的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

- (1) 箱施薬殺虫剤は、残効性に優れるものでも施用後約2ヶ月でその効力はほぼ消失する。
- (2) 今後の発生に十分注意し、基幹防除を励行する。

斑点米カメムシ類

1) 予報内容

発生量 平年よりやや多く(前年並)、発生程度は「中～多」

2) 予報の根拠

- (1) 6月後半の水田周辺雑草地における生息調査(1地点当たり捕虫網20回振り)では、20地点のうち14地点で生息を確認した。捕獲地点率は70.0%、1地点当たりの捕獲虫数は9.2頭であり、平年(58.6%、6.3頭)と比べてやや高めの発生である。
- (2) 6月26日発表の1か月予報では、前半は平年に比べ曇りや雨の日が多いが、後半は平年と同様に晴れの日が多いと見込まれている。気温はほぼ平年並、降水量は平年並か多く、日照時間は平年並か少ないと予想されており、発生には中間的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

- (1) 斑点米カメムシ類の生息場所となる周辺雑草を、水稻出穂の10～15日前までに除去・処分する(但し、**出穂直前の除草は本田内に斑点米カメムシ類を追い込むことになるので行なわない**)。
- (2) 出穂が早い圃場に集中して飛来する傾向があるので、周辺雑草地や本田での発生に注意し、発生を認めたら早急に防除を行なう。
- (3) 薬剤散布については各薬剤の登録内容を確認のうえ、液剤等で出穂期と乳熟期(出穂後約2週間頃)の2回防除を行なう。

普通期水稻

葉いもち

1) 予報内容

発生量 平年並(前年並)で、発生程度は「少」

2) 予報の根拠

- (1) 6月後半の巡回調査では、発生圃場率は3.2%、発病度は0.03であり、ほぼ平年(4.6%、0.2)並の発生である。
- (2) 6月26日発表の1か月予報では、前半は平年に比べ曇りや雨の日が多いが、後半は平年と同様に晴れの日が多いと見込まれている。気温はほぼ平年並、降水量は平年並か多く、日照時間は平年並か少ないと予想されており、発生には中間的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

- (1) 今後の発生状況に十分注意し、曇雨天が続き上中位葉へ病斑の進展が見られる場合は、薬剤散布を行なう。

セジロウンカ

1) 予報内容

発生量 平年よりやや少なく(前年よりやや少ない)、発生程度は「少」

2) 予報の根拠

- (1) 6月後半の巡回調査では、発生を認めていない(平年同時期は、発生圃場率は16.1%、株あたり虫数は0.02頭)。
- (2) 6月26日発表の1か月予報では、前半は平年に比べ曇りや雨の日が多いが、後半は平年と同様に晴れの日が多いと見込まれている。気温はほぼ平年並、降水量は平年並か多く、日照時間は平年並か少ないと予想されており、発生には中間的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

- (1) 今後の発生に十分注意し、基幹防除を励行する。

サツマイモ

食葉性害虫 (ハスモンヨトウ, シロイチモジヨトウ, ナカジロシタバ等)

1) 予報内容

発生量 平年よりやや少なく(前年よりやや少ない), 発生程度は「少」

2) 予報の根拠

- (1) 6月後半の巡回調査では, 発生圃場率は68.8%, 被害度は2.6であり, 平年(88.4%, 6.6)と比べてやや低めの発生である。
- (2) 6月のフェロモントラップへのハスモンヨトウおよびシロイチモジヨトウの誘殺虫数は, 平年並に推移している。
- (3) 6月26日発表の1か月予報では, 前半は平年に比べ曇りや雨の日が多いが, 後半は平年と同様に晴れの日が多いと見込まれている。気温はほぼ平年並, 降水量は平年並か多く, 日照時間は平年並か少ないと予想されており, 発生には中間的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

- (1) 多発すると防除が困難になるので, 若齢幼虫期に徹底防除を図る。

ハダニ類

1) 予報内容

発生量 平年よりやや多く(前年並), 発生程度は「中」

2) 予報の根拠

- (1) 6月後半の巡回調査では, 発生圃場率は75.0%, 寄生葉率は19.1%であり, 平年(64.0%, 12.5%)と比べてやや高めの発生である。
- (2) 6月26日発表の1か月予報では, 前半は平年に比べ曇りや雨の日が多いが, 後半は平年と同様に晴れの日が多いと見込まれている。気温はほぼ平年並, 降水量は平年並か多く, 日照時間は平年並か少ないと予想されており, 発生には中間的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

- (1) 多発すると防除が困難になるので初期防除に努める。防除の際には, 薬液が葉裏に十分かかるよう丁寧に散布する。

II. 果樹

カンキツ

かいよう病

1) 予報内容

発生量 平年並(前年より多い)で, 発生程度は「少～中」

2) 予報の根拠

- (1) 6月前半の巡回調査では, 発生圃場率は73.3%であり, 平年(22.9%)と比べて高めの発生であるが, 春葉発病度は0.11であり, 平年(0.11)並の発生である。
- (2) 6月26日発表の1か月予報では, 前半は平年に比べ曇りや雨の日が多いが, 後半は平年と同様に晴れの日が多いと見込まれている。気温はほぼ平年並, 降水量は平年並か多く, 日照時間は平年並か少ないと予想されており, 発生には中間的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

- (1) 罹病枝のせん除を行ない, 常発園や罹病性品種園では防除を励行する。
- (2) 風当たりの強い園では防風対策を講じる。

そうか病

1) 予報内容

発生量 平年並(前年より少ない)で, 発生程度は「少」

2) 予報の根拠

- (1) 6月前半の巡回調査では, 発生を認めていない(平年同時期は, 春葉の発生圃場率が4.7%, 発病度が0.2, 果実の発病度が0.3)。
- (2) 6月26日発表の1か月予報では, 前半は平年に比べ曇りや雨の日が多いが, 後半は平年と同様に晴れの日が多いと見込まれている。気温はほぼ平年並, 降水量は平年並か多く, 日照時間は平年並か少ないと予想されており, 発生には中間的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

(1)発生が多い園では、黒点病の防除を兼ねて薬剤防除を行なう。

ミカンハダニ

1) 予報内容

発生量 平年より少なく(前年並),発生程度は「少」

2) 予報の根拠

- (1) 6月前半の巡回調査では、発生圃場率は37.5%であり、平年(32.3%)並の発生であるが、寄生葉率は1.4%であり、平年(6.1%)と比べて低めの発生である。
- (2) 6月26日発表の1か月予報では、前半は平年に比べ曇りや雨の日が多いが、後半は平年と同様に晴れの日が多いと見込まれている。気温はほぼ平年並、降水量は平年並か多く、日照時間は平年並か少ないと予想されており、発生には中間的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

- (1) 多発すると防除が困難になるので初期防除に努める。防除の際には、葉裏まで薬液が充分かかるよう、丁寧に薬剤を散布する。
- (2) ミカンハダニは薬剤抵抗性が発達しやすいので、同一系統薬剤の連用を避ける。

ナシ

ハダニ類

1) 予報内容

発生量 平年よりやや多く(前年よりやや多い),発生程度は「中」

2) 予報の根拠

- (1) 6月後半の巡回調査では、発生圃場率は62.5%、寄生葉率は5.1%であり、平年(5.0%, 0.5%)と比べてやや高めの発生である。
- (2) 6月26日発表の1か月予報では、前半は平年に比べ曇りや雨の日が多いが、後半は平年と同様に晴れの日が多いと見込まれている。気温はほぼ平年並、降水量は平年並か多く、日照時間は平年並か少ないと予想されており、発生には中間的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

- (1) 多発すると防除が困難になるので初期防除に努める。防除の際には、葉裏や徒長枝にも充分な量の薬液がかかるよう散布する。
- (2) 薬剤抵抗性獲得の恐れがあるので、同一系統薬剤の連用は避ける。

果樹共通

カメムシ類(ツヤアオカメムシ, チャバネアオカメムシ等)

1) 予報内容

発生量 平年よりやや多く(前年より多い),発生程度は「多」

2) 予報の根拠

- (1) 勝浦町および上板町の予察灯へのツヤアオカメムシ, チャバネアオカメムシの誘殺数は、ともに平年よりやや多く推移している。

[ツヤアオカメムシの誘殺数]

月半旬	勝浦					上板				
	2014年	2013年	2012年	2011年	平年	2014年	2013年	2012年	2011年	平年
6.1	154	7	75	28	39	116	2	15	5	9
6.2	355	17	205	15	80	130	5	37	5	14
6.3	123	136	185	14	97	20	34	20	2	23
6.4	252	61	719	24	171	12	4	54	1	21
6.5	236	16	95	28	118	24	0	2	10	17
6.6		0	76	21	110		7	10	4	16
7.1		32	46	20	64		2	8	1	9

[チャバネアオカメムシの誘殺数]

月半旬	勝 浦 田丁					上 板 田丁				
	2014年	2013年	2012年	2011年	平 年	2014年	2013年	2012年	2011年	平 年
6.1	42	3	4	10	16	30	0	5	2	4
6.2	116	1	14	6	16	55	1	54	4	10
6.3	52	12	27	0	28	16	3	10	1	6
6.4	19	7	53	11	26	14	8	27	0	19
6.5	20	5	16	21	40	24	0	1	25	70
6.6		0	16	17	48		3	11	18	75
7.1		11	44	19	39		1	34	1	63

(2) 6月26日発表の1か月予報では、前半は平年に比べ曇りや雨の日が多いが、後半は平年と同様に晴れの日が多いと見込まれている。気温はほぼ平年並、降水量は平年並か多く、日照時間は平年並か少ないと予想されており、発生には中間的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

- (1) 果樹園周辺の雑木林から成虫が飛来するので、園内を巡回し飛来に注意するとともに、飛来を認めたら早急に防除を行なう。
- (2) 夜行性なので、薬剤の散布は夕方か早朝に実施する。
- (3) 移動性が大きいので、広域一斉防除により防除効果の向上に努める。

Ⅲ. 野菜

夏秋ナス

うどんこ病

1) 予報内容

発生量 平年よりやや少なく(前年並)、発生程度は「少」

2) 予報の根拠

- (1) 6月後半の巡回調査では、発生を認めていない(平年同時期は、発生圃場率が17.4%、発病葉率が1.2%)。
- (2) 6月26日発表の1か月予報では、前半は平年に比べ曇りや雨の日が多いが、後半は平年と同様に晴れの日が多いと見込まれている。気温はほぼ平年並、降水量は平年並か多く、日照時間は平年並か少ないと予想されており、発生には中間的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

- (1) 窒素質肥料の過用を避ける。
- (2) 多発すると防除が困難になるので初期防除に努める。

アザミウマ類

1) 予報内容

発生量 平年よりやや少なく(前年よりやや少ない)、発生程度は「少」

2) 予報の根拠

- (1) 6月後半の巡回調査では、発生圃場率は33.3%、寄生葉率は0.3%、被害果率は0%であり、平年(53.4%、4.2%、0.8%)と比べてやや低め発生である。
- (2) 6月26日発表の1か月予報では、前半は平年に比べ曇りや雨の日が多いが、後半は平年と同様に晴れの日が多いと見込まれている。気温はほぼ平年並、降水量は平年並か多く、日照時間は平年並か少ないと予想されており、発生には中間的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

- (1) 多発すると防除が困難になるので初期防除に努める。寄生場所は主に葉であるが、果実の萼の裏側にも好んで寄生するので、防除の際には、葉裏や果実の萼部に十分な量の薬液がかかるよう丁寧に散布する。

アブラムシ類

1) 予報内容

発生量 平年よりやや少なく(前年よりやや少ない)、発生程度は「少」

2) 予報の根拠

- (1) 6月後半の巡回調査では、発生を認めていない(平年同時期は、発生圃場率は19.3%、寄生新梢率は1.3%)。
- (2) 6月26日発表の1か月予報では、前半は平年に比べ曇りや雨の日が多いが、後半は平年と同様に晴れの日が多いと見込まれている。気温はほぼ平年並、降水量は平年並か多く、日照時間は平年並か少ないと予想されており、発生には中間的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

- (1) 多発すると防除が困難になるので初期防除に努める。アブラムシ類は葉裏や芯芽に寄生しているので、防除の際には、葉裏に十分な量の薬液がかかるよう丁寧に散布する。
- (2) 薬剤抵抗性獲得の恐れがあるので、同一系統薬剤の連用は避ける。

ハダニ類

1) 予報内容

発生量 平年よりやや少なく(前年より少ない)、発生程度は「少」

2) 予報の根拠

- (1) 6月後半の巡回調査では、発生圃場率は22.2%、寄生葉率は0.2%であり、平年(43.9%、3.7%)と比べてやや低め発生である。
- (2) 6月26日発表の1か月予報では、前半は平年に比べ曇りや雨の日が多いが、後半は平年と同様に晴れの日が多いと見込まれている。気温はほぼ平年並、降水量は平年並か多く、日照時間は平年並か少ないと予想されており、発生には中間的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

- (1) 多発すると防除が困難になるので初期防除に努める。ハダニ類はほとんど葉裏に寄生しているので、防除の際には、葉裏に十分な量の薬液がかかるよう丁寧に散布する。
- (2) 薬剤抵抗性獲得の恐れがあるので、同一系統薬剤の連用は避ける。

IV. その他

- 1) 薬剤の使用にあたっては必ず使用基準を遵守し、周辺作物等へ飛散しないようにして下さい。
- 2) 水田に薬剤を使用したときは、7日間以上止水して下さい。

発生量の表示

発生程度：甚>多>中>少>無

発生量：多い>やや多い>並>やや少ない>少ない

徳島県立農林水産総合技術支援センター病害虫防除所
U R L : <http://www.pref.tokushima.jp/tafftsc/t-boujoshou/>

○病害虫の発生予察情報、発生状況、防除法等をお知らせしています。