


1. 海況の経過



海況

上に千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、三重県および和歌山県が共同で作成した海況図(H21.3.9)を示した。

黒潮は、室戸岬沖で接岸、潮岬沖でやや離岸している。室戸岬以西の黒潮は、足摺岬沖でかなり離岸、都井岬沖でやや離岸している。黒潮本流の表面水温は19～21℃台である。

表面水温は播磨灘が10℃台、紀伊水道が10～16℃台、外域が15～17℃台である。

紀伊水道外域では、室戸岬と潮岬の中央から、和歌山県側に向けて暖水が差し込んでいる。暖水の差し込みは、紀伊水道内まで波及しており、紀伊水道北部域で潮境が形成されている。



漁業調査船「とくしま」が3月2日に行った播磨灘海区の海洋観測では、水温は全層で「やや高め」の9.7～9.8℃であった。

播磨灘海区観測結果 (観測日 2009/03/02)

| 水温   | 水深  |     |     |     | 塩分   | 水深   |      |      |      |
|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
|      | 表層  | 10m | 20m | 30m |      | 表層   | 10m  | 20m  | 30m  |
| 今年値  | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 今年値  | 33.1 | 33.1 | 33.2 | 33.2 |
| 平年偏差 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 平年偏差 | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  |
| 前年偏差 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 前年偏差 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.2 |

地先水温

最近1週間の地先水温は、鳴門地区は「平年並み」～「やや高め」の9.5～10.2℃、日和佐地区は「平年並み」～「やや高め」の14.8～15.4℃、牟岐地区は「やや高め」～「高め」の15.5～16.1℃で推移した。



## 2. 漁況の経過

**建網:**海部沿岸で、中主体にヒラメが0.2トン(1日1隻当たり8kg)水揚げされた。

**小型定置網:**海部沿岸で、カタクチイワシが0.3トン(同85kg)水揚げされた。

**大型定置網:**海部沿岸で、ブリが21.8トン(同4.4トン)、メジロが9.3トン(同1.5トン)水揚げされた。

**釣り:**海部沿岸で、大主体にアオリイカが0.5トン(同8kg)、中主体にゴマサバが2.7トン(同62kg)、特大・大主体にタチウオが0.4トン(同42kg)、特大主体にマサバが1.3トン(同32kg)、メジロが0.3トン(同6kg)、紀伊水道で特大主体にタチウオが0.9トン(同78kg)水揚げされた。

漁業種類別漁獲量集計表(抜粋) 3月2日～3月8日 県下5漁協からの聞き取り

| 漁業種類  | 漁獲海域 | 魚種      | 延べ出漁隻数 | 漁獲量(kg) | 1日1隻当たり漁獲量(kg) | 銘柄・その他 |
|-------|------|---------|--------|---------|----------------|--------|
| 建網    | 海部沿岸 | ヒラメ     | 27     | 208     | 8              | 中主体    |
| 小型定置網 |      | カタクチイワシ | 4      | 339     | 85             |        |
| 大型定置網 |      | ブリ      | 5      | 21,772  | 4,354          |        |
|       |      | メジロ     | 6      | 9,228   | 1,538          |        |
| 釣り    |      | アオリイカ   | 60     | 453     | 8              | 大主体    |
|       |      | ゴマサバ    | 43     | 2,664   | 62             | 中主体    |
|       |      | タチウオ    | 10     | 418     | 42             | 特大・大主体 |
|       |      | マサバ     | 41     | 1,319   | 32             | 特大主体   |
|       |      | メジロ     | 47     | 281     | 6              |        |
|       |      | 紀伊水道    | タチウオ   | 12      | 931            | 78     |

### 特異事項:

漁業調査船「とくしま」によるクラゲ調査では、紀伊水道北部で傘計10～20cmのアカクラゲが多くみられる海域があった。また、紀伊水道北部には、夜光虫が多く発生している海域があった。

### 週間予報:

黒潮は、室戸岬でやや離岸、潮岬で接岸で推移する見込み。

地先水温は、鳴門地先で「やや高め」の10℃台、日和佐地先で「やや高め」の15℃台後半で推移する見込み。

### 他県情報:

和歌山県のひき縄釣りで、カツオが24.5トン(1日1隻あたり22kg)、キハダが0.7トン(同0.6kg)、ビンナガが2.0トン(同1.8kg)、定置網で、ブリが8.4トン(同0.8トン)、ワラサが4.2トン(同0.4トン)、マアジが1.1トン(同113kg)、釣りでサバが1.0トン(同15kg)、イサキは1.0トン(同14kg)、パッチ網でシラスが1.5トン(同85kg)水揚げされた。

### \*水温偏差の目安

平年並み:±0.49以下, やや高め(やや低め):±0.50～1.49, 高め(低め):±1.50～2.49, かなり高め(かなり低め):±2.50以上