

意識障害のプロトコール

呼吸様式, 気道閉塞の有無, 外傷の有無の確認

脈拍の強さ
左右差もしくは上下差あり

YES

処置, 留意点

- ・気道確保
- ・酸素投与
- ・保温
- ・心電図, SpO2
- ・頻回のバイタルサイン, 意識レベルの観察
- ・外的刺激をなるべく避ける

NO

収縮期血圧90以下

収縮期血圧160以上
または拡張期血圧100以上

YES

速やかに高次医療機関へ搬送
[大動脈解離, 大動脈炎の疑い]
(心血管外科併設施設)

対応可能な医療機関へ

NO

神経学的異常
(麻痺, 失語症, 構音障害
瞳孔不同, 痙攣発作, 頭痛)

YES

処置, 留意点

- ・気道確保
- ・酸素投与
- ・嘔吐, 嘔気がある場合は側臥位, ない場合は頭部挙上
- ・保温
- ・心電図, SpO2
- ・頻回のバイタルサイン, 意識レベルの観察
- ・外的刺激をなるべく避ける

NO

SpO2 90%以下

YES

速やかに頭蓋内疾患に対処が可能な医療機関へ搬送 [頭蓋内疾患疑い]

不整脈

NO

心電図

対応可能な医療機関へ

正常

体温測定

体温異常

対応可能な医療機関へ

正常

処置, 留意点

- ・気道確保
- ・酸素投与
- ・心電図, SpO2 継続観察
- ・頻回のバイタルサイン, 意識レベルの観察
- ・回復体位

処置, 留意点

- ・気道確保
- ・高濃度酸素投与
- ・心電図
- ・頻回のバイタルサイン, 意識レベルの観察
- ・回復体位

速やかに呼吸管理が可能な医療機関へ搬送
[低酸素血症疑い]

速やかに適切な医療機関へ搬送
[糖尿病, 肝疾患, 薬物服用, アルコール代謝, 中毒疾患疑い]

<注> 不明な点があればon-lineへ