

354 【株式会社徳島銀行】 協定森林の整備状況等

NO	タイプ別	市町村 (1)	森づくり 内 容	樹種	林齢	面積 (ha)	C O 2 吸収量 (t-co2/年)
1	環境林	那賀町	間伐	杉	40	22.50	171.26

位置図



樹種	林齢	面積 (ha)	平均 樹高 (m)	森林 計画区	地位	地上バイオマス吸収量						地下部バイオマス吸収量		森林CO2 吸収量 (t-CO2/年)
						幹材積 成長量 (m3/ha/年)	拡大係数	容積密 度 (t/m3)	炭素 比率	換算 係数	地上バイ オマス吸 収量	加算補正係数	地下バイオマ ス吸収量	
スギ	40	22.50	19.0	那賀	中	8.6	1.23	0.314	0.5	44/12	137.012	0.25	34.253	171.26
計		22.50									137.012		34.253	171.26

整備前



整備後



森林CO₂
吸収量
171.26
t-CO₂/年

×
5年間

355 【徳島空港ビル株式会社】 協定森林の整備状況等

NO	タイプ別	市町村 (1)	森づくり 内 容	樹種	林齢	面積 (ha)	C O 2 吸収量 (t-co2/年)
1	環境林	牟岐町	間伐	スギ	40	7.50	54.43

位置図



樹種	林齢	面積 (ha)	平均 樹高 (m)	森林 計画区	地位	地上バイオマス吸収量						地下部バイオマス吸収量		森林CO2 吸収量 (t-CO2/年)
						幹材積 成長量 (m3/ha/年)	拡大係数	容積密 度 (t/m3)	炭素 比率	換算 係数	地上バイ オマス吸 収量	加算補正係数	地下バイオマ ス吸収量	
スギ	40	7.50	17.9	海部	中	8.2	1.23	0.314	0.5	44/12	43.546	0.25	10.887	54.43
計		7.50									43.546		10.887	54.43

整備前



整備後



森林CO₂
吸収量
54.43
t-CO₂/年

×

5年間

356 【公益社団法人徳島県建築士会】 協定森林の整備状況等

NO	タイプ別	市町村 (1)	森づくり 内 容	樹種	林齢	面積 (ha)	C O 2 吸収量 (t-co2/年)
1	環境林	海陽町	植栽	スギ・ヒノキ	1	1.00	8.85

位置図



樹種	林齢	面積 (ha)	平均 樹高 (m)	森林 計画区	地位	地上バイオマス吸収量						地下部バイオマス吸収量		森林CO2 吸収量 (t-CO2/年)
						幹材積 成長量 (m3/ha/年)	拡大係数	容積密度 (t/m3)	炭素 比率	換算 係数	地上バイ オマス吸 収量	加算補正係数	地下バイオマ ス吸収量	
スギ	1	0.87	－	海部	中	8.1	1.57	0.314	0.5	44/12	6.369	0.25	1.592	7.96
ヒノキ	1	0.13	－	海部	中	4.7	1.55	0.407	0.5	44/12	0.707	0.26	0.184	0.89
計		1.00									7.076		1.776	8.85

整備前



整備後



森林CO₂
吸収量
8.85
t-CO₂/年

×
5年間

357 【一般社団法人徳島県森林協会】 協定森林の整備状況等

NO	タイプ別	市町村 (1)	森づくり 内 容	樹種	林齢	面積 (ha)	C O 2 吸収量 (t-co2/年)
1	環境林	那賀町	植栽	スギ	1	1.00	10.17

位置図



樹種	林齢	面積 (ha)	平均 樹高 (m)	森林 計画区	地位	地上バイオマス吸収量						地下部バイオマス吸収量		森林CO2 吸収量 (t-CO2/年)
						幹材積 成長量 (m3/ha/年)	拡大係数	容積密度 (t/m3)	炭素 比率	換算 係数	地上バイ オマス吸 収量	加算補正係数	地下バイオマ ス吸収量	
スギ	1	1.00	－	那賀	中	9.0	1.57	0.314	0.5	44/12	8.134	0.25	2.034	10.17
計		1.00									27.818		6.954	10.17

整備前



整備後



森林CO₂
吸収量
10.17
t-CO₂/年

×
5年間

358 【一般社団法人徳島県トラック協会】 協定森林の整備状況等

NO	タイプ別	市町村 (1)	森づくり 内 容	樹種	林齢	面積 (ha)	C O 2 吸収量 (t-co2/年)
1	環境林	神山町	間伐	スギ・ヒノキ	40	7.50	49.97

位置図



樹種	林齢	面積 (ha)	平均 樹高 (m)	森林 計画区	地位	地上バイオマス吸収量						地下部バイオマス吸収量		森林CO2 吸収量 (t-CO2/年)
						幹材積 成長量 (m3/ha/年)	拡大係数	容積密 度 (t/m3)	炭素 比率	換算 係数	地上バイ オマス吸 収量	加算補正係数	地下バイオマ ス吸収量	
スギ	40	4.38	17.8	徳島	中	8.2	1.23	0.314	0.5	44/12	25.431	0.25	6.358	31.79
ヒノキ	40	3.12	14.3	徳島	中	5.0	1.24	0.407	0.5	44/12	14.434	0.26	3.753	18.18
計		7.50									39.86		10.11	49.97

整備前



整備後



森林CO₂
吸収量
49.97
t-CO₂/年

×
5年間

359 【徳島県農業協同組合中央会】 協定森林の整備状況等

NO	タイプ別	市町村 (1)	森づくり 内 容	樹種	林齢	面積 (ha)	C O 2 吸収量 (t-co2/年)
1	環境林	那賀町	植栽	スギ	1	1.00	13.48

位置図



樹種	林齡	面積 (ha)	平均 樹高 (m)	森林 計画区	地位	地上バイオマス吸収量						地下部バイオマス吸収量		森林CO2 吸収量 (t-CO2/年)
						幹材積 成長量 (m3/ha/年)	拡大係数	容積密度 (t/m3)	炭素 比率	換算 係数	地上バイ オマス吸 収量	加算補正係数	地下バイオマ ス吸収量	
スギ	1	0.02	－	那賀	中	9.0	1.57	0.314	0.5	44/12	0.163	0.25	0.041	0.20
計		0.02									0.163		0.041	0.20

スギ	1	0.98	—	那賀	上	12.0	1.57	0.314	0.5	44/12	10.629	0.25	2.657	13.28
計		0.98									10.629		2.657	13.28

整備前



整備後



森林CO₂
 吸収量
 13.48
 t-CO₂/年

×
 5年間

360 【一般社団法人徳島県猟友会】 協定森林の整備状況等

NO	タイプ別	市町村 (1)	森づくり 内 容	樹種	林齢	面積 (ha)	C O 2 吸収量 (t-co2/年)
1	団地	美波町	間伐	スギ・ヒノキ	32	1.86	14.91
2	環境林	美馬市	間伐	スギ	45-50	5.64	31.45
計						7.50	46.36

位置図



樹種	林齢	面積 (ha)	平均 樹高 (m)	森林 計画区	地位	地上バイオマス吸収量						地下部バイオマス吸収量		森林CO2 吸収量 (t-CO2/年)
						幹材積 成長量 (m3/ha/年)	拡大係数	容積密 度 (t/m3)	炭素 比率	換算 係数	地上バイ オマス吸 収量	加算補正係数	地下バイオマ ス吸収量	
スギ	32	0.66	16.0	海部	中	10.2	1.23	0.314	0.5	44/12	4.767	0.25	1.192	5.96
ヒノキ	32	1.20	11.8	海部	中	6.4	1.24	0.407	0.5	44/12	7.106	0.26	1.848	8.95
計		1.86									11.87		3.04	14.91

整備前

整備後

森林CO₂
吸收量
46.36
t-CO₂/年

361 【株式会社徳島中央木材市場】 協定森林の整備状況等

NO	タイプ別	市町村 (1)	森づくり 内 容	樹種	林齢	面積 (ha)	C O 2 吸収量 (t-co2/年)
1	環境林	那賀町	間伐	スギ	40	7.50	57.09

位置図



樹種	林齢	面積 (ha)	平均 樹高 (m)	森林 計画区	地位	地上バイオマス吸収量						地下部バイオマス吸収量		森林CO2 吸収量 (t-CO2/年)
						幹材積 成長量 (m3/ha/年)	拡大係数	容積密 度 (t/m3)	炭素 比率	換算 係数	地上バイ オマス吸 収量	加算補正係数	地下バイオマ ス吸収量	
スギ	40	7.50	19.0	那賀	中	8.6	1.23	0.314	0.5	44/12	45.671	0.25	11.418	57.09
計		7.50									45.671		11.418	57.09

整備前



整備後



森林CO₂
吸収量
57.09
t-CO₂/年

×

5年間

362【徳島トヨペット株式会社】 協定森林の整備状況等

NO	タイプ別	市町村 (1)	森づくり 内 容	樹種	林齢	面積 (ha)	CO ₂ 吸収量 (t-co ₂ /年)
1	団地	那賀町	間伐	スギ・ヒノキ	43-45	7.50	42.43

位置図



樹種	林齢	面積 (ha)	平均 樹高 (m)	森林 計画区	地位	地上バイオマス吸収量						地下部バイオマス吸収量		森林CO2 吸収量 (t-CO2/年)
						幹材積 成長量 (m3/ha/年)	拡大係数	容積密 度 (t/m3)	炭素 比率	換算 係数	地上バイ オマス吸 収量	加算補正係数	地下バイオマ ス吸収量	
スギ	45	4.69	16.0	那賀	下	5.8	1.23	0.314	0.5	44/12	19.261	0.25	4.815	24.08
ヒノキ	43	2.81	16.5	那賀	中	5.6	1.24	0.407	0.5	44/12	14.560	0.26	3.786	18.35
計		7.50									33.82		8.60	42.43

整備前



整備後



森林CO₂
吸収量
42.43
t-CO₂/年

×
5年間

363【徳島ロータリークラブ】 協定森林の整備状況等

NO	タイプ別	市町村 (1)	市町村 (2)	森づくり 内 容	樹種	林齢	面積 (ha)	C O 2 吸収量 (t-co2/年)
1	環境林	那賀町	牟岐町	間伐	杉	40	7.50	55.40

位置図



樹種	林齢	面積 (ha)	平均 樹高 (m)	森林 計画区	地位	地上バイオマス吸収量						地下部バイオマス吸収量		森林CO2 吸収量 (t-CO2/年)
						幹材積 成長量 (m3/ha/年)	拡大係数	容積密 度 (t/m3)	炭素 比率	換算 係数	地上バイ オマス吸 収量	加算補正係数	地下バイオマ ス吸収量	
スギ	40	2.73	19.0	那賀	中	8.6	1.23	0.314	0.5	44/12	16.624	0.25	4.156	20.78
計		2.73									16.624		4.156	20.78

スギ	40	4.77	17.9	海部	中	8.2	1.23	0.314	0.5	44/12	27.695	0.25	6.924	34.62
計		4.77									27.695		6.924	34.62

整備前



整備後



森林CO₂
吸収量
55.40
t-CO₂/年

×
5年間

364 【徳農種苗株式会社】 協定森林の整備状況等

NO	タイプ別	市町村 (1)	森づくり 内 容	樹種	林齢	面積 (ha)	C O 2 吸収量 (t-co2/年)
1	団地	那賀町	植栽	スギ	1	0.76	10.3
2	環境林	那賀町	植栽	スギ	1	0.24	3.25
計						1.00	13.55

位置図



樹種	林齢	面積 (ha)	平均 樹高 (m)	森林 計画区	地位	地上バイオマス吸収量						地下部バイオマス吸収量		森林CO2 吸収量 (t-CO2/年)
						幹材積 成長量 (m3/ha/年)	拡大係数	容積密度 (t/m3)	炭素 比率	換算 係数	地上バイ オマス吸 収量	加算補正係数	地下バイオマ ス吸収量	
スギ	1	0.76	－	那賀	上	12.0	1.57	0.314	0.5	44/12	8.243	0.25	2.061	10.30
計		0.76									8.243		2.061	10.30

スギ	1	0.24	－	那賀	上	12.0	1.57	0.314	0.5	44/12	2.603	0.25	0.651	3.25
計		0.24									2.603		0.651	3.25

整備前



整備後



森林CO₂
 吸収量
 13.55
 t-CO₂/年

×
 5年間