

第1期
徳島県ニホンザル適正管理計画書（案）

平成 年 月

徳 島 県

目 次

1	計画策定の背景及び目的	1
(1)	背景	1
(2)	目的	1
2	管理すべき鳥獣の種類	1
3	計画の期間	1
4	第二種特定鳥獣の管理が行われるべき区域	1
5	生息環境、生息動向及び被害状況	1
(1)	生息環境	1
(2)	生息動向	3
(3)	農作物等被害状況	7
(4)	被害防除対策の状況	7
(5)	捕獲状況	9
6	管理の目標	10
7	第二種特定鳥獣の数の調整に関する事項	10
(1)	加害群・個体数管理の考え方	10
(2)	加害群・個体数管理の方法	10
(3)	その他	11
8	第二種特定鳥獣の被害防止対策に関する事項	12
(1)	普及啓発	12
(2)	モデル事業の実施と技術支援	12
(3)	サルの監視体制の整備	12
(4)	安易な餌付けの禁止	12
(5)	集落環境整備による侵入防止対策の推進	12
(6)	追い払い、追い上げの支援	12
9	特定鳥獣の生息地の保護及び整備に関する事項	12
10	実施計画に基づく管理の推進	13
11	その他保護管理のために必要な事項	13
(1)	計画の実施体制	13
(2)	被害防止計画との整合性	14
(3)	モニタリングの実施	14
(4)	計画の見直しについて	14
(5)	人材の育成・確保	15
(6)	関係自治体との連携	15
(7)	外来種の対応について	15

1 計画策定の背景及び目的

(1) 背景

徳島県のニホンザルによる農作物被害は、高い水準が続いている。被害防止に向け、進入防止柵の設置や地域ぐるみで放任果樹の除去やモンキードック等による追い払い活動、有害鳥獣捕獲等の総合的な被害対策が実施されている。近年ニホンザルの生息範囲は拡大傾向にあり、人里近くへ侵出した群れは農耕地への依存度を高めている。そこで、県内に広く分布するニホンザルの管理方針を明確にし、人との軋轢の解消及び地域個体群の保全に向けた管理施策を強化することが求められている。

(2) 目的

徳島県のニホンザルの被害状況及び生息状況に鑑み、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展の観点から、人身被害、生活被害及び農作物被害を防止を図るとともに、生物の多様性の確保（生態系の保護を含む。）の観点からは、地域個体群を維持にも配慮し、その生息数の適正な水準への減少と、生息地の適正な範囲への縮小を図る。そのため、ニホンザルを第二種特定鳥獣と定め、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく第二種特定鳥獣管理計画を策定する。

2 管理すべき鳥獣の種類

ニホンザル (*Macaca fuscata*)

3 計画の期間

平成27年5月29日から平成29年3月31日まで

4 第二種特定鳥獣の管理が行われるべき区域

徳島県全域

5 生息環境、生息動向及び被害状況

(1) 生息環境

① 地形

本県は、四国の東部に位置し、東は紀伊水道に面し、北は香川県、南は高知県、西は愛媛県に接している。山地が多く、全面積約 4,146.67km²の約75%を占めており、北から香川県との県境を形成している讃岐山脈、標高 1,954.7m の剣山の属する四国山地、及び県南の海部山地の3つがある（図1）。四国第2の高山である剣山を中心とした剣山地は県を南北にわける分水嶺で、その北方を流れる吉野川は水源を遠く高知県に発し、本県に入り三好市池田町から直角に流れを東に転じ、東流するにしたがって広くなり、くさび形の徳島平野を作っている。吉野川の北に位置する讃岐山脈は一般に低く、山麓には扇状地が発達し、吉野川下流の低地は勝浦川及び那賀川下流の低地とともに広く水田地帯となっている。分水嶺の南斜面の山地は豊富な森林地帯となっているが、その山地帯に源流を持つ那賀川、海部川は溪谷の景観を呈し、広い平地は少なく、阿南市以南では山地が直接海にせまった岩石海

岸となっている。

本県は、このように多様な地理的特徴を有していることから、本来多種多様な動植物が生息できる自然環境条件に恵まれている。しかしながら特に戦後、高度経済成長期を通じた開発や森林の変化、中山間地域を取りまく環境の変化により、野生鳥獣の生息環境は大きく変化した。これによりツキノワグマなど急激に生息数が減少し、絶滅が危惧される種が現れる一方、生息数が急激に増加したにもかかわらず生息状況の変化に即さない保護管理施策が継続された結果、人間活動との軋轢が大きな社会問題となってしまった種も現れており、本計画で取りあげるニホンザルは後者の代表的な種のひとつである。



図1 徳島県の地形概要

② 気候

本県は、大きく3つの気候区に大別され、北部は瀬戸内気候に、南部は太平洋側気候に、西部の山地は山岳気候に属している。

年平均気温は、県東部の海岸地方で約16℃であり、県西部の山沿い地方に向かって、次第に低くなる傾向にある。県内で最も寒冷地にあたるのは、剣山周辺の山麓部であり、年平均気温は約12℃である。

年平均降水量は、南部地方では3,000～3,200mmと多く、剣山の北側は1,300～1,400mmであり、剣山山系を境に県北部の降水量は、県南部の約1/2となっている。

③ 森林の現況

徳島県の面積414,667haのうち、森林面積は約312,258haであり、林野率は約75%を占める。そのうち、自然林は17,310haで県土の約4%と極めて低く、二次林は121,709haで県土の約29%である。人工林率は約62%で、昭和60年以降ほ

とんど増加していない。

森林の所有形態は国有林が6%，民有林が94%であり，民有林の割合が高いのも本県の特徴である。

(2) 生息動向

① 生息状況

本県のニホンザルは四国に広く分布する四国地域個体群に属し，安定的な地域個体群に位置する。

環境省は，自然環境保全基礎調査として哺乳類分布調査を定期的に行っている。これは，国土院発行の5万分の1の地形図を縦横それぞれ4等分してできる約5km×5kmの区画（全国で17,376区画。以下「5kmメッシュ」という。）ごとに，種ごとの生息の有無を明らかにしたもので，昭和53年及び平成15年にその結果が公表されている。

これによると，ニホンザルの群れの生息状況については，全国の平成15年の生息区画は，区画数3,471，区画率20.0%であり，昭和53年と比較し区画数で1,183，区画率で6.8ポイント（以下「p」とする。）の増加が認められた（表1）。また，四国の生息区画率の増加は10.9pであり，全国平均よりも4.1p高く，中部（13.4p），関東（12.2p），近畿（12.1p）に次ぐ高さを示していた。

本県における平成15年の生息区画は，区画数121，区画率59.3%であり，区画率は滋賀県（73.7%），山梨県（68.2%），三重県（67.4%）に次ぐ高さである。また，昭和53年と比較すると，67区画の増加が認められ，この四半世紀の間に2.2倍に分布が拡大している。（表1，図2）。

平成15年に新たに生息が確認された区画をみると，大部分は耕作地や集落地域となっており，人里への進出が起きているのは明らかである。人里近くへ進出した群れは，農耕地への依存度を高め，農作物という栄養価の高い食物摂取による妊娠率の向上や死亡率の低下が進み，さらなる農作物等を加害する群れや個体の増加につながっていると考えられる。

また，平成24年に市町村の鳥獣担当者に対して実施したアンケート調査・ヒアリング調査（以下「アンケート等調査」という。）によると，県内に生息する加害ザルについて，群れの推定数は約120～160群れ，推定生息数は約4000～6000頭となった（表2）。ただし，市町村担当者による群れと個体数の推定には，テレメトリー調査など科学的調査手法によって得られた情報と地域住民や農業関係団体などの関係者から得られた情報などが混在しており，曖昧さを含んでいる。

このため，加害群と個体数の管理を進めつつ，変化する群れ・個体数，分布域，行動等の把握に努め，被害の減少に向けた対策を進めていく必要がある。

表1 ニホンザル（群れ）の生息区画数，生息区画率の増加

	昭和53年 (1978年)		平成15年 (2003年)		生息区画数の比較	全区画数
	①	②	①	②		
全 国	2,288	13.2%	3,471	20.0%	1.5倍	17,376
徳島県	54	26.5%	121	59.3%	2.2倍	204

(注) 1 表中①は「生息区画数」，②は「生息区画率」を示す。

2 平成15年(2003年)四国4県の生息区画率は84%




図2 自然環境保全基礎調査（環境省）による県内のニホンザルの分布図

表2 徳島県内の加害ザル生息状況（平成24年のアンケート等調査による）

圏域	市町村	群れ		個体数		備考
		最小	最大	最小	最大	
東部	徳島市	1	1	30	50	
	小松島市	0	0	0	0	
	勝浦町	1	3	20	90	
	上勝町	4	5	80	150	
	佐那河内村	3	3	90	150	
	神山町	21	21	700	700	
	石井町	0	0	0	0	
	鳴門市	7	8	500	600	
	松茂町	0	0	0	0	
	北島町	0	0	0	0	
	藍住町	0	0	0	0	
	板野町	1	2	100	150	
	上板町	2	3	100	200	
	吉野川市	5	6	100	180	
阿波市	4	5	80	150		
小計	49	57	1800	2420		
南部	阿南市	7	7	140	210	
	那賀町	10	20	200	600	
	美波町	4	5	80	150	
	牟岐町	2	5	40	150	
	海陽町	5	7	120	220	
	小計	28	44	580	1330	
西部	美馬市	7	7	270	270	
	つるぎ町	10	15	400	500	
	三好市	20	30	1000	1200	
	東みよし町	4	10	150	300	
	小計	41	62	1820	2270	
合計		118	163	4200	6020	

② 生態及び食性

ニホンザルは本州、四国、九州とその周辺のいくつかの島に生息する日本固有の霊長類である。オスの方が大きく、頭胴長53～60cm、尾は短く尾長8～12cm、体重10～18kgで、メスは頭胴長47～55cm、尾長7～10cm、体重8～16kg程度である。毛の色は茶褐色ないし灰褐色で、顔と尻は裸出している。

サルは昼行性の動物であり、夜が明けるころから活動を始め、行動範囲を群れで移動しながら、食べ物を探して食べたり、休息したりを繰り返す。特定のねぐらは持たず、夜、日が暮れて暗くなるころ、その日の寝る場所が決まると移動をやめ、樹上や木の根元、岩場などで、しゃがんで手足を抱えた姿勢で眠りにつく。行動域内を良く知っていて、夏の暑い時期には涼しいところ、冬には暖かいところにいることが多い。針葉樹の植林地のうち、特に手入れされていない森林は、採食できる植物が無いので素早く移動するか休息するだけのことが多い。また、農業被害が出ている地域では、耕作地の周辺を離れずに歩き回っているサルの群れが多数知られている。

食性は植物食の強い雑食性であり、果実、種子、若葉、冬芽、タケノコなどの植物質の他、サワガニ、昆虫類なども採食する。季節毎にそれぞれ5～6種程度の主要な採食樹種があって、それだけで大部分を占めている。そして採食樹種には地域的な違いがあって、何を食べるかには文化的な違いも影響している。

被害作物が地域により異なるのは、ニホンザルが新奇なものに手を出さない場合が多いからであり、初めは見向きもしなかった作物でも何年かたつと被害が出始めるが、これは学習効果によるものである。基本的には、唐辛子など多少の例外を除けば、人間の食べるものは何でも食べると考えられる。

③ 群れの行動とハナレザル

ニホンザルは通常数10頭から100頭程度の個体が集まった群れ（集団）を作って生活している。それが他の中大型哺乳類との際だった違いである。

群れはメスの家系で構成され、一群あたりの行動域は、群れサイズ（個体数）の大きさやその地域の植生などにより異なるが、数平方キロから数10平方キロ、特に広い場合は100平方キロにもなる場合がある。

基本的に群れ同士は敵対的であり、行動域が多少オーバーラップしても、各群れが高い頻度で利用する中心地域では排他的である。行動域が広い場合はその中に針葉樹の植林地が含まれている場合が多く、また群れが耕作地の周縁を巡り歩いている場合には、計算上の行動域面積が広がる。

群れは、複数の成獣オス（7－8歳以上）と通常その同数から5倍程度の数の成獣メス（5－7歳以上）、そしてそのコドモ（4歳以下）たちからなる（年齢には個体差あり）。出産は年一回、秋10月から1月頃までが交尾期、春3月から7月頃までが出産期で、妊娠期間は175日前後である。おおむね隔年出産であるが、栄養条件次第では連年出産も稀ではない。

ニホンザルのオスは成熟するといったん群れを出て、ハナレザルになる。このことが、結果として近親交配を避けるメカニズムになっている。その移動距離は個体毎にさまざまだが、1年足らずの間に60kmも移動した例が知られており、状況次第ではかなり遠方まで移動していくものと考えられる。その一方で、ある特定の農耕地周辺に居着いてしまい、住民から顔を覚えられてしまうまでになる成獣オスもいる。こうしたハナレオスは時としてかなり大胆になり、人を脅したり、人家に侵入したりすることがある。このようなオスが群れに入ると、時として人を怖がらず、人家近くに頻繁に出没するような悪い習慣を、群れ全体に伝えることになるといわれている。

群れは、サイズが大きくなる（おおむね60頭）などいくつかの生態的・社会的要因が引き金となって分裂が起こる。また、群れはめったなことではその行動域を変えないものと考えられていたが、人里との間に他の群れが存在しない場合、少しずつ人里の方へ近寄ってくる群れがあることが各地で報告されており、これがニホンザルの分布域拡大の大きな要因となっている。

(3) 農作物等被害状況

平成17年度以降のニホンザルによる農作物被害金額は、平成14年度まで1,500万円を下回る水準で推移していたが、平成15年度を境に2,000万円を越え、平成21年度以降は約4,000万円前後の高水準の被害が続いており、ニホンジカ、イノシシとともに農業における3大加害獣となっている（表3）。加えて、被害金額に算入されない自家消費用の農作物被害も多く、地域住民の心理的負担が増大している。

また、ニホンザルの住宅集合地域への進出が進み、家屋への侵入をはじめとする生活被害や、人への咬みつき、ひっかきなどの人身被害も発生している。

2012年に市町村の鳥獣担当者に対して実施したアンケート等調査から、県内の市町村における人身被害（直接的・間接的要因による人の負傷）、生活被害（家屋の破損等）、農作物被害の発生状況をまとめた（表4）。人身被害の情報があるのは3市町村のみだが、生活被害、農作物被害はほとんどの市町村で発生している。被害を受けている主な農作物は、水稻、野菜類、果樹、イモ類、椎茸であった。

(4) 被害防除対策の状況

各市町村の被害防除対策の状況について、アンケート等調査などによると、大部分の市町村では花火やスリングショット、モンキードック等の活用による追い払いや、侵入防止柵の設置、有害鳥獣捕獲活動といった対症療法の被害防除を進めている。こうした中、一部の集落では、放任果樹の剪定・除去や緩衝帯の整備などにより、集落を餌場とさせない、侵入させない地域ぐるみの取組みも進めている。

表3 徳島県におけるニホンザルによる農作物被害金額の推移




表4 サル被害の内容 (平成26年11月現在)

圏域	市町村	被害の内容		
		人身被害	生活被害	農林業被害(主な品目)
東部	徳島市	×	○	果樹, 野菜類
	小松島市	-	-	-
	勝浦町	×	×	果樹, 野菜類
	上勝町	×	×	野菜類, 果樹
	佐那河内村	△	○	水稻, 果樹, イモ類, 野菜類
	神山町	○	○	水稻, 果樹, イモ類, 野菜類
	石井町	-	-	-
	鳴門市	○	○	果樹
	松茂町	-	-	-
	北島町	-	-	-
	藍住町	-	-	-
	板野町	○	○	果樹, 野菜類
	上板町	×	△	水稻, 野菜類, 果樹
	吉野川市	×	×	果樹, 野菜類
阿波市	×	△	野菜類, 果樹	
南部	阿南市	○	○	果樹, 野菜類
	那賀町	×	△	水稻, 野菜類, 果樹, 椎茸
	美波町	×	○	水稻, 野菜類, 果樹
	牟岐町	○	○	水稻, 野菜類, 果樹
	海陽町	×	○	水稻, 野菜類, 果樹
西部	美馬市	×	○	野菜類
	つるぎ町	×	○	野菜類, 果樹
	三好市	×	○	水稻, 野菜類, 椎茸
	東みよし町	×	○	野菜類, 果樹, ソバ

(備考) ○: 近年に被害あり

△: 過去に被害あり

×: 被害はない

表5 各市町村の被害対策実施状況 (平成26年11月現在)

圏域	市町村	被害対策								有害捕獲
		集落環境 点検	講習会 研修会	誘引物 除去	緩衝帯 設置	発信器 運用	追い払い	モンキー ドッグ	防護柵	
東部	徳島市		○			△	○		○	○
	小松島市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	勝浦町	○	○				△		△	○
	上勝町	○								○
	佐那河内村	△	○	○	○	○	△	○	○	○
	神山町	○	○	○	○		○	○	○	○
	石井町	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鳴門市					○			○	○
	松茂町	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	北島町	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	藍住町	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	板野町						○		○	○
	上板町	○	○		△		○		○	○
	吉野川市									○
阿波市						○		△	○	
南部	阿南市		○	○			○		○	○
	那賀町	○	○	△	○		○	○	○	○
	美波町	○	△			○	○		○	○
	牟岐町	○	△		○		○		○	○
	海陽町		△			△	○			○
西部	美馬市								○	○
	つるぎ町	○	○				○		○	○
	三好市	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	東みよし町	○	○	○	△	○	○	○	○	○

(備考) ○: 実施している。


△: 実施しているが十分ではない。

(5) 捕獲状況

ニホンザルは、狩猟鳥獣ではないため、その捕獲は鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の許可捕獲に基づく有害鳥獣捕獲を実施している。

捕獲数は平成13年度までは200頭未満であったが、生息区域が拡大し農作物被害の増加や人里への出没が発生したため、有害鳥獣捕獲活動が強化され、平成24年度、25年度は約1,400頭が捕獲されている。(表6)。

表6 徳島県におけるニホンザルの捕獲数の推移



6 管理の目標

県下の加害ザルの群の動向と被害状況を踏まえ、群れごとの特性に応じた順応的管理を行い、人とサルとの軋轢の低減を図るものとする。

短期・中期目標においては、加害群の状況に応じて全頭捕獲や加害群れの個体数削減などの捕獲を進め、追い上げや侵入防止等の対策を並行して実施し、10年後までに加害群の数を半減させることを目指す。

一方、日本の固有種であるニホンザルは、本県の豊かな自然環境や生物多様性を構成する野生動物でもあるため、長期的には、生物多様性を保全し、次世代に継承していく観点から、人とサルの生活圏を分離するとともに人里への出没を抑制しながら、地域個体群の安定的な維持を目指す。

(管理目標)

区分	個体群管理	生息環境管理	被害防除
短期 ・中期	<ul style="list-style-type: none"> ・加害群の半減 ・群れの分裂防止 	<ul style="list-style-type: none"> ・被害地域の縮小 (農地や集落等を生息域にさせない) 	<ul style="list-style-type: none"> ・人身被害の防止 ・農業・生活被害の防止
長期	<ul style="list-style-type: none"> ・地域個体群としての安定的な維持 	<ul style="list-style-type: none"> ・人とサルの生活圏の分離を維持 ・保全のための生息環境整備 	<ul style="list-style-type: none"> ・人身被害の防止 ・農業・生活被害の解消

(備考)

この表において、「短期」とは本計画の期間、「中期」とは概ね10年、「長期」とは概ね20年以上を想定している。

7 第二種特定鳥獣の数の調整に関する事項

(1) 加害群・個体数管理の考え方

ニホンザルは母系集団で群れを形成し、社会性や学習能力が高く、環境を立体的に使うとともに、比較的安定的な行動圏をもつという生物学的特徴を有しており、シカやイノシシ等のような個体数の密度を調整する捕獲を実施した場合、群れを分裂・拡散させるなど、群れの動態を不安定にさせ、被害対策を煩雑化させる恐れがある。

このため、「個体数管理」にあたっては、群れを単位として、その生息環境や個体群の規模、被害状況等に応じて、群れの悪質個体の除去や個体数の縮小、極めて悪質な群れの場合は除去するとともに、農地や集落等にサルを出没させない生息域の管理の方法を次より定める。

(2) 加害群・個体数管理の方法

本県の加害ザルの個体数は最大で約6,000頭と推定されている。

人里を生活圏としているサルの出産率は毎年25%で、生後1年以内の生存率は6割

とされていることから、サルが毎年15%ずつ増加すると仮定すると、毎年900頭ずつ増加すると推測される。本計画では、10年後までに加害群の数を半減させることを目指すことから、この出産数を上回る捕獲を行うこととする。

ただし、個体数の管理は次の表に基づいた加害レベルに応じた加害群とその個体数の調整を行うことを原則とし、捕獲によってかえって被害の拡大が発生しないよう努めるものとする。

加害レベル	群れの状況	加害群・個体数管理の方法
レベルⅠ	<ul style="list-style-type: none"> ・恒常的に人間が経済活動を行っていない森林を利用している ・人間の前にほとんど姿を見せない 	<ul style="list-style-type: none"> ・原則として捕獲は行わない ・被害防止のためやむを得ない場合に限り、問題のある個体を識別して捕獲する
レベルⅡ	<ul style="list-style-type: none"> ・季節的に群れの一部が集落にある作物等を利用する ・人間の姿が見えると逃げる、または近づくと逃げる 	<ul style="list-style-type: none"> ・山林への追い払い、追い上げ ・必要に応じて有害捕獲を行う。その際、群れの分裂に注意を払い、できる限り問題のある個体を識別して捕獲する
レベルⅢ	<ul style="list-style-type: none"> ・恒常的に集落を利用している ・人慣れが進み、追い払いをしても動じない 	<ul style="list-style-type: none"> ・個体数調整捕獲の徹底による群れの縮小、除去 ・群れの全頭を捕獲を行う場合、別の群れが進出してくる可能性を考慮

- ・ニホンザルは母系の群れを形成し、季節の食物環境に合わせた行動域を移動して生活することから、被害は加害群の行動域内で発生するので、対策は基本的に群れを単位として実施する。
- ・農作物への依存度等の被害の発生状況を考慮して、群れごとに加害状況を把握し、これに対応した加害群・個体数管理を実施する。
- ・捕獲の徹底による群れの縮小、除去を行う場合は、大型捕獲檻を利用した捕獲など群れの分散を防止するための措置を十分に図り、被害地域の拡大を抑制する方法に努めるものとする。
- ・繁殖抑制など、新たな個体数低減の手法の研究、開発に努めるものとする。
- ・群れから離れて活動するハナレザルについては、出没地区の住民や市町村に対して、餌付け行為の禁止、放任果樹など誘引物の管理・撤去、追い払いなどの指導を行い、被害が深刻な場合は、適切に捕獲する。
- ・群れに属する加害性の高い個体（有害個体）をできる限り特定し、選択的な捕獲に努めるものとする。

(3) その他

- ・個体数調整捕獲にあたっては、捕獲個体の身体的苦痛の軽減、及び捕獲従事者の

- 心理的負担の軽減のため、安楽死の方法を研究し、その普及に努めるものとする。
- ・死体は山野に放置することなく焼却・埋設し適正に処分する。
 - ・捕獲個体は指定の記録表に従い捕獲状況・捕獲個体情報等を記録し県に報告するよう捕獲実施者に協力を求める。

8 第二種特定鳥獣の被害防止対策に関する事項

(1) 普及啓発

県、市町村、関係団体は連携して、地域住民が集落ぐるみで適切な被害防止対策に取り組めるよう、研修会の開催等をとおして指導、支援を行う。また、獣害対策に立ち向かうモデル集落づくりを推進し、地域住民と行政が一体となった防除体制を確立する。

(2) モデル事業の実施と技術支援

加害群の効果的な捕獲や繁殖抑制などのモデル事業を実施し、その手法を随時提示して、地域のサル被害対策を支援するものとする。

(3) サル監視体制の整備

集落点検やテレメトリー調査などにより、被害集落や出没するサルの特性把握に努め、適切な捕獲や防除を行うための基礎資料とする。

(4) 安易な餌付けの禁止

サルに対する餌付けは、人なれを助長しかつ本来の生態を歪める影響があるため行わない。また、捕獲の際の不適切な誘引餌は集落への誘引や個体数増加、他の鳥獣の錯誤捕獲といった影響があるため、捕獲のための餌付けについては専門家等による指導・助言を受け適切に実施することとする。

(5) 集落環境整備による侵入防止対策

効果的な電気柵や防護ネットの設置、放任果樹の除去や出荷しない作物の野外投棄の排除、隠れ処となる耕作放棄地や見通しの悪い林縁等の除去による緩衝帯の設置等により、サルを侵入させない強い集落づくりを進める。

(6) 追い払い、追い上げの支援

地域が自ら実施する、集落に出てきたサルの追い払いや、群れの行動域の山林への追い上げを、テレメトリー等によって把握した位置情報の提供や、モンキードッグの導入推進により支援する。

9 特定鳥獣の生息地の保護及び整備に関する事項

自然に対する人間の働きかけが縮小したことによる生物多様性の危機、中でも中山間地域を中心に人口減少や高齢化を背景に増加した耕作放棄地や里山放置林に、ニホンジカやイノシシ、サルなどが進出し、地域の生物多様性の劣化をもたらしている。

このため、平成25年10月に策定した「生物多様性とくしま戦略」では、「生物多様性という地域資源を活かした、コンパクトな循環型社会の実現」を長期目標に定め、この長期目標の実現を目指す上で、「生物の生息・生育環境の継承」をはじめとする4つの方向性のもと、鳥獣被害防止プロジェクト等12の重点施策を推進する(図3)。

特に、広葉樹林の保全・復元や、スギ、ヒノキ等の人工林の広葉樹林化、針広混交林への誘導など、野生鳥獣の生息環境に必要な多様な森林整備や、中山間地域等直接支払制度等を活用して、農地の多面的機能の維持・保全や耕作放棄地の解消に向けた地域ぐるみの取り組みを推進する。

<p>1 本県固有の自然特性と生物の生息・生育環境の継承</p> <p>① とくしま生態系レッドリスト策定プロジェクト 「徳島県レッドデータブック」では、「絶滅のおそれのある生物種の保護」のため、1,000種を超える動植物を調査し、保護に努めています。今後、種の生息・生育場としての地域生態系を面的に保全していくための仕組みとして、「生態系レッドリスト」を策定します。</p> <p>② 外来生物駆除対策プロジェクト 本県の生物多様性に大きな影響を与えている外来生物の生息・生育調査を行います。そして、特定外来生物の防除計画を策定し、県民とも協働で駆除対策を行えるような取り組みを構築します。</p>	<p>2 生態系サービスを活用した防災・エネルギー・森林保全等の課題への対応</p> <p>③ 水資源の維持・確保プロジェクト 地域内でのコンクリートで自立的なライフラインづくりを目指し、水源地の所在を調査し、地図化して情報の共有を図ります。</p> <p>④ エネルギーの地産地消プロジェクト “Energy In My Yard” すなわち、エネルギーの地産地消の視点から、自然エネルギーの普及促進を図り、エネルギーを持続的にまかなっている地域づくりを目指します。</p> <p>⑤ カーボンオフセットによる森林整備プロジェクト カーボンオフセットの取り組みを推進し、その仕組み・資金を使って、広葉樹の植樹、人工林の間伐等を推進し、生物多様性の高い森林を創造していきます。</p>
<p>戦略では長期目標の実現を目指す上での「4つの方向性」と、55の行動計画の中で特に優先すべき「12の重点施策」を掲げています。</p>	
<p>3 人口減少社会の中での自然との共存</p> <p>⑥ 官民協働による伝統的な文化・技術伝承プロジェクト 伝統文化、知恵、技術等を自然とのつながりの観点から調査・収集し、情報を提供し、そして、次世代に円滑に伝承されていくよう支援します。</p> <p>⑦ 中山間地域における活動団体の支援プロジェクト 中山間地域での耕作放棄地解消の取り組みの支援や、農山漁村（ふるさと）協働パートナー協定の支援・促進等とおとして、里地里山の管理・利活用の推進を支援していきます。</p> <p>⑧ 鳥獣被害防止プロジェクト 特定鳥獣適正管理計画の策定、新たな許業者の確保の取り組みの推進、効率的な捕獲技術の活用、業種ぐるみの総合的な被害対策等を図っていきます。</p>	<p>⑨ 生物多様性リーダー育成プロジェクト 「生物多様性リーダー」の育成・認定の仕組みを構築して、人材育成を促進し、この戦略の実行の担い手の増加を図ります。</p> <p>⑩ 郷土野菜・作物等の再発見プロジェクト 土地固有の自然環境、風土と深く結びついて作られてきた地域の伝統作物の品種や分布を調査し、遺伝子資源として保全につなげます。</p> <p>⑪ 事業者向け生物多様性取り組みガイドライン作成プロジェクト 事業者を対象とした「生物多様性取り組みガイドライン」を作成し、事業者による生物多様性への配慮の促進を図ります。</p> <p>⑫ 生物多様性に配慮した農林水産業育成プロジェクト 生物多様性に配慮して生産された農林水産物に高い価値を付与する仕組みを整え、生物多様性に配慮した農林水産業の推進を支援します。</p> <p>4 地域資源としての生物多様性と生態系を守って活かすための社会の仕組みづくり</p>

図3 生物多様性ととくしま戦略概要版（抜粋）

10 実施計画に基づく管理の推進

市町村等捕獲の実施主体は、管理計画の効果的な目標達成に資するため、加害群れ・個体数管理の実施計画を策定し、地域ごとの管理目標を具体化・明確化し、地域が共通認識をもって対策の実施を図れるよう体制を整備するものとする。

この管理計画では、特にレベルⅢに評価された加害群れの縮小、除去を目標にしていることから、実施計画には、必要な被害防除や地域の合意形成など、捕獲圧を高める場合の要件を盛り込むものとする。

11 その他第二種特定鳥獣の管理のために必要な事項

(1) 計画の実施体制

計画の実施に当たっては、県関係機関、試験研究機関、市町、農林業者（団体）、地域住民、森林管理署、狩猟者団体等が連携するとともに、関連NPO、ボランティアからも協力を得るよう努める。




図4 徳島県ニホンザル管理計画実施体制図

(2) 被害防止計画との整合性

特定計画及び実施計画の適正な運用に向け、鳥獣被害防止特措法に基づき地域協議会等が作成した被害防止計画との整合性を確認し、必要に応じて市町村と協議して被害防止計画の修正を促すなど、管理対策が適切に実施されるよう必要な指導や助言を行うものとする。

(3) モニタリングの実施

本計画の推進や被害防除対策の実施による生息状況や被害発生状況の変化に応じて、適切に計画を見直す（フィードバック）順応的管理に向け、モニタリングを実施する。

① 生息状況

県下の群れの数，群れの分布，群れの個体数，加害レベル等

② 被害状況

③ 捕獲状況

(4) 計画の見直しについて

本計画を実効性の高いものとするため、関係市町村や団体、大学等連携・協力の上、図5の体制図に基づき、被害防除や捕獲の成果や生息状況変化を継続してモニタリング、評価・検証し、随時、本計画の見直しを行い、非定常的な野生動物の動態変化に柔軟に対応していくものとする。




図5 徳島県ニホンザル管理計画モニタリング体制図

(5) 人材の育成・確保

県・市町村は、関係機関・大学・団体と連携・協力し、ニホンザルの被害対策や管理について知見をもった人材の育成と確保に努める。また、研修会等の普及啓発によって市町村および地域において指導者となる人材の育成に努める。

(6) 関係地方自治体との連携

隣接する地方自治体（他県及び市町村）と生息状況、被害対策の実施状況等の情報を共有し、適切な管理施策を実施するため連携の強化を図る。

(7) 外来種の対応について

ニホンザルと近縁のアカゲザル、タイワンザル等外来種が確認された場合には、速やかに除去する。