


令和3年度 播磨灘広域共同調査（6月14日調査） 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (°C)	塩分	透明度 (m)	細胞/mL							
						シャットネラ アンティーカ	シャットネラ マリーナ	シャットネラ オバータ	シュードシャットネラ ベルキュローサ	ヘテロシグマ アカシオ	コクロディニウム ポリクリコイデス	アレキサンドリウム sp.	カレニア ミキモイ
T4	09:32	0-5			9.0	0.3	0.7	0.70	1	1	-	-	-
		0	20.54	31.55		-	-	-	2	8	-	-	-
		1	20.55	31.53		-	0.01	0.01	-	7	0.04	0.01	-
		5	20.24	31.79		-	-	-	6	-	-	-	-
		10	19.46	31.92		-	0.03	-	-	1	-	-	-
		15	19.20	32.05		-	-	-	-	-	-	-	-
		20	19.05	32.14		-	0.01	-	-	-	-	0.01	-
		25	18.98	32.17		-	-	-	-	-	-	-	-
		30	18.92	32.20		-	-	-	-	-	-	-	-
		B-1	18.81	32.24		-	-	-	-	-	-	-	-
T1	10:15	0-5			7.2	0.04	0.21	0.03	-	3	-	-	-
		0	20.16	31.82		-	-	-	-	-	-	-	-
		1	20.01	31.75		0.14	0.16	0.02	3	2	-	0.10	-
		5	19.23	31.86		0.3	0.3	0.3	5	-	-	0.06	-
		10	18.84	32.08		-	-	-	4	0.01	-	-	-
		15	18.66	32.17		-	-	-	-	-	-	-	-
		20	18.26	32.14		-	-	-	-	-	-	-	-
		25	17.63	32.16		-	-	-	-	-	-	-	-
		30	17.32	32.19		-	-	-	-	-	-	-	-
		B-1	17.30	32.19		-	-	-	-	-	-	-	-
St.4	10:32	0-5			6.9	-	-	-	-	-	0.02	0.01	-
		0	20.16	31.77		-	-	-	-	-	-	-	-
		1	19.96	31.71		-	-	-	-	-	-	-	-
		5	19.24	31.81		-	-	-	-	-	-	-	-
		10	18.50	31.93		-	-	-	-	-	-	0.04	0.01
		15	18.48	31.94		-	-	-	-	-	-	-	-
		20	18.03	32.05		-	0.02	-	-	-	-	-	-
		25	17.79	32.09		-	-	-	-	-	-	-	-
		30	17.59	32.11		-	-	-	-	-	-	-	-
		35	17.20	32.17		-	-	-	-	-	-	-	-
B-1	16.74	32.24	-	-	-	-	-	-	-	-			



**備考**

- ・麻痺性貝毒原因種を含むアレキサンドリウム属が検出されましたが、ごく僅かでした。
- ・有害種のシャットネラ属（マリーナ、オバータ）、シュードシャットネラ ベルキュローサ、ヘテロシグマ アカシオ、カレニア ミキモイが検出されました。
- ・珪藻は低密度でした。

珪藻細胞数 St.4(0-5m): 104cells/ml  
T4(0-5m): 2cells/ml