


令和3年度 播磨灘広域共同調査 (7月26日調査) 徳島県水産研究課

| St. | 採水時刻 | 採水層 (m) | 水温 (°C) | 塩分 | 透明度 (m) | DIN (μmol/L) | 細胞/mL | | | | | | |
|------|-------|---------|---------|-------|---------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------|---|
| | | | | | | | シャットネラ アンティーカ | シャットネラ マリーナ | シャットネラ オバータ | シャットネラ 区分不能 | コクロディニウム ポリクリコイデス | カレニア ミキモトイ | |
| T4 | 09:34 | 0-5 | | | 8.0 | | - | - | - | - | - | - | |
| | | 0 | 25.35 | 31.08 | | | | | | | | | |
| | | 1 | 24.88 | 31.06 | | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 5 | 23.65 | 31.51 | | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 10 | 23.29 | 31.69 | | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 15 | 23.28 | 31.71 | | | | | | | | | |
| | | 20 | 23.28 | 31.73 | | 2.30 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 25 | 22.75 | 31.81 | | | | | | | | | |
| | | 30 | 22.37 | 31.86 | | 3.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| T1 | 10:37 | B-1 | 22.36 | 31.86 | 4.01 | - | - | - | 0.02 | - | - | | |
| | | 0-5 | | | | - | - | - | 0.01 | - | 0.01 | | |
| | | 0 | 25.31 | 31.05 | | | | | | | | | |
| | | 1 | 24.97 | 31.02 | 0.22 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 0.02 | | |
| | | 5 | 24.40 | 31.13 | 0.19 | - | - | - | 0.02 | - | - | | |
| | | 10 | 23.85 | 31.22 | 0.19 | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 15 | 23.26 | 31.59 | | | | | | | | | |
| | | 20 | 23.20 | 31.68 | | | | | | | | | |
| | | 25 | 22.65 | 31.82 | | | | | | | | | |
| St.4 | 11:16 | 30 | 22.38 | 31.84 | | | | | | | | | |
| | | B-1 | 22.28 | 31.85 | 3.17 | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 0-5 | | | | - | - | - | - | 0.03 | 0.01 | | |
| | | 0 | 25.25 | 31.11 | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 1 | 25.00 | 31.02 | 0.13 | - | - | - | 0.01 | - | - | | |
| | | 5 | 24.36 | 31.08 | 0.09 | - | - | 0.02 | 0.02 | 0.08 | - | | |
| | | 10 | 23.85 | 31.14 | 0.16 | - | - | - | 0.02 | - | - | | |
| | | 15 | 23.17 | 31.38 | | | | | | | | | |
| | | 20 | 22.63 | 31.77 | 1.57 | - | - | - | - | - | - | | |
| 25 | 22.49 | 31.80 | | | | | | | | | | | |
| 30 | 22.34 | 31.85 | 2.39 | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 35 | 22.03 | 31.88 | | | | | | | | | | | |
| B-1 | 21.83 | 31.92 | 5.06 | - | - | - | - | - | - | | | | |



備考

- ・有害種のシャットネラ属(アンティーカ, マリーナ, オバータ), コクロディニウム ポリクリコイデス, カレニア ミキモトイが低密度ながら検出されました。
- ・珪藻はSt.4, T4ともにキートセロス属主体で前回調査時よりも増加しました。

珪藻細胞数 St.4(0-5m): 587cells/ml
T4(0-5m): 339cells/ml