

各関係機関長 殿

徳島県立農林水産総合技術支援センター
病虫害防除所長
(公印省略)

令和3年度農作物病虫害発生予察情報について

令和3年度農作物病虫害発生予報第10号を発表したので送付します。

令和3年度農作物病虫害発生予報第10号

令和3年11月2日
徳島県

I. 果樹
果樹共通

果樹カメムシ類 (10月8日付けで注意報発令中)

1) 予報内容

発生量 平年よりやや多く(前年より多い)、発生程度は「中」

2) 予報の根拠

(1) 10月の予察灯調査において、勝浦町での誘殺数は、ツヤアオカメムシでは平年に比べて低く推移しているが、チャバネアオカメムシでは第1～3半旬まで平年に比べて高く推移していたが、第4半旬以降はほぼ平年並となった。一方、上板町では両種ともに、平年に比べて高く推移していたが、第4半旬以降はほぼ平年並となった(表1)。

(2) 10月第6半旬におけるカンキツの巡回調査では、発生圃場率が50.0%、被害果率が0.9%と、平年(36.9%、1.2%)並の発生である。

(3) 高松地方気象台が10月28日に発表した1か月予報では、気温、降水量及び日照時間はほぼ平年並の見込みで、平年と同様に晴れの日が多いと予想されており、やや発生助長的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

(1) 温州ミカン、カキやキウイフルーツ園等では、飛来を認めたら早急に防除を行う。

表1 予察灯における果樹カメムシ類の誘殺数

月	半旬	[ツヤアオカメムシの誘殺数]			[チャバネアオカメムシの誘殺数]		
		勝浦町	上板町	平年	勝浦町	上板町	平年
10	1	73	27	269	298	1	50
	2	130	8	268	741	12	30
	3	49	42	114	294	0	10
	4	13	6	68	8	0	15
	5	1	8	64	6	11	21
	6		1	38		0	5
11	1		2	28		1	7
	2		14	18		0	2
10	1	485	31	210	236	4	15
	2	461	1	170	264	0	4
	3	74	13	23	96	0	1
	4	7	0	8	5	0	0
	5	2	0	7	0	1	0
	6		0	2		0	0
11	1		0	1		0	0
	2		0	0		0	0

II. 野菜
冬春トマト

疫病

1) 予報内容

発生量 平年並(前年並)で、発生程度は「少」

2) 予報の根拠

- (1) 10月第6半旬の巡回調査では、発生を認めていない(平年同時期も未発生)。
- (2) 本病の初発時期は平年、11月第6半旬である(発生圃場率が8.0%、発病度が0.7)。
- (3) 高松地方気象台が10月28日に発表した1か月予報では、気温、降水量及び日照時間はほぼ平年並の見込みで、平年と同様に晴れの日が多いと予想されており、やや発生抑制的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

- (1) 窒素質肥料を過用すると茎葉が軟弱となり発生しやすくなるので、肥培管理に注意する。
- (2) 罹病葉は伝染源になるので、できるだけ早く摘み取って、ハウス外で処分する。
- (3) 病原菌は気孔から侵入するので、薬剤散布は気孔の多い葉裏を重点的に行う。特に、下葉には丁寧に散布する。
- (4) 病原菌が侵入してからごく短期間で発病するので、発生を認めたら散布間隔を短縮して、集中的に薬剤散布を行う。

コナジラミ類(10月29日付けで注意報発令中)

1) 予報内容

発生量 平年より多く(前年より多い)、発生程度は「多」

2) 予報の根拠

- (1) 10月第6半旬の巡回調査では、発生圃場率が100%、寄生葉率が19.9%と、平年(66.3%、4.2%)に比べて高い。なお、コナジラミ類の種別では、オンシツコナジラミは発生圃場率が12.5%、寄生葉率が0.3%と、平年(27.3%、0.6%)に比べてやや低い。タバココナジラミは発生圃場率が100%、寄生葉率が19.9%と、平年(55.7%、3.9%)に比べて高い。
- (2) 高松地方気象台が10月28日に発表した1か月予報では、気温、降水量及び日照時間はほぼ平年並の見込みで、平年と同様に晴れの日が多いと予想されており、やや発生助長的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

- (1) 多発すると防除が困難になるので初期防除に努める。薬液は葉裏にも十分に付着するよう丁寧に散布する。
- (2) 薬剤感受性の低下を回避するため、同一系統の薬剤の連用は避ける。

冬春ナス

うどんこ病

1) 予報内容

発生量 平年よりやや多く(前年並)、発生程度は「中」

2) 予報の根拠

- (1) 10月第6半旬の巡回調査では、発生圃場率が28.6%と、平年(44.8%)に比べてやや低い、発病葉率は3.4%と、平年(3.3%)に比べてやや高い。
- (2) 高松地方気象台が10月28日に発表した1か月予報では、気温、降水量及び日照時間はほぼ平年並の見込みで、平年と同様に晴れの日が多いと予想されており、発生助長的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

- (1) 罹病葉は伝染源になるので、できるだけ早く摘み取って、ハウス外で処分する。
- (2) 発生が多くなってからでは防除が困難になるので、初期防除に努める。
- (3) 耐性菌出現の恐れがあるので、同一系統薬剤の連用は避ける。

すすかび病

1) 予報内容

発生量 平年よりやや少なく(前年より少ない)、発生程度は「少」

2) 予報の根拠

- (1) 10月第6半旬の巡回調査では、発生を認めていない(平年同時期は、発生圃場率が2.9%、寄生葉率が0.1%)。
- (2) 高松地方気象台が10月28日に発表した1か月予報では、気温、降水量及び日照時間はほぼ平年並の見込みで、平年と同様に晴れの日が多いと予想されており、発生には中間的な気象条件である。

3)防除上注意すべき事項

- (1)罹病葉は伝染源になるので、できるだけ早く摘み取って、ハウス外で処分する。
- (2)発生が多くなると防除が困難になるので初期防除に努める。薬液は下葉の葉裏にも十分付着するよう丁寧に散布する。
- (3)耐性菌出現の恐れがあるので、同一系統薬剤の連用は避ける。

アブラムシ類

1)予報内容

発生量 平年並(前年並)で、発生程度は「少」

2)予報の根拠

- (1)10月第6半旬の巡回調査では、発生を認めていない(平年同時期も未発生)。
- (2)高松地方気象台が10月28日に発表した1か月予報では、気温、降水量及び日照時間はほぼ平年並の見込みで、平年と同様に晴れの日が多いと予想されており、やや発生助長的な気象条件である。

3)防除上注意すべき事項

- (1)多発すると防除が困難になるので初期防除に努める。アブラムシ類は葉裏や芯芽に寄生しているので、薬液は葉裏にも十分付着するよう丁寧に散布する。

ハダニ類

1)予報内容

発生量 平年並(前年並)で、発生程度は「少」

2)予報の根拠

- (1)10月第6半旬の巡回調査では、発生を認めていない(平年同時期は、発生圃場率が9.5%、寄生葉率が0.5%)。
- (2)高松地方気象台が10月28日に発表した1か月予報では、気温、降水量及び日照時間はほぼ平年並の見込みで、平年と同様に晴れの日が多いと予想されており、やや発生助長的な気象条件である。

3)防除上注意すべき事項

- (1)多発すると防除が困難になるので初期防除に努める。ハダニ類は葉裏に寄生しているので、薬液が葉裏にも十分付着するよう丁寧に散布する。

ミナミキイロアザミウマ

1)予報内容

発生量 平年よりやや少なく(前年並)、発生程度は「少」

2)予報の根拠

- (1)10月第6半旬の巡回調査では、発生圃場率が14.3%、寄生葉率が0.3%と、平年(66.9%、14.5%)に比べて低い。なお、被害果実は認められていない(平年同時期は、発生圃場率が13.6%、被害果率が1.3%)。
- (2)高松地方気象台が10月28日に発表した1か月予報では、気温、降水量及び日照時間はほぼ平年並の見込みで、平年と同様に晴れの日が多いと予想されており、やや発生助長的な気象条件である。

3)防除上注意すべき事項

- (1)多発すると防除が困難になるので初期防除に努める。

コナジラミ類(オンシツコナジラミ、タバココナジラミ)

1)予報内容

発生量 平年より多く(前年よりやや多い)、発生程度は「多」

2)予報の根拠

- (1)10月第6半旬の巡回調査では、発生圃場率が100%、寄生葉率が43.3%と、平年(77.9%、11.9%)に比べて高い。
- (2)高松地方気象台が10月28日に発表した1か月予報では、気温、降水量及び日照時間はほぼ平年並の見込みで、平年と同様に晴れの日が多いと予想されており、やや発生助長的な気象条件である。

3)防除上注意すべき事項

- (1)多発すると防除が困難になるので初期防除に努める。薬液は葉裏にも十分付着するよう丁寧に散布する。

秋冬ダイコン

アブラムシ類

1) 予報内容

発生量 平年よりやや少なく(前年並), 発生程度は「少」

2) 予報の根拠

(1) 10月第6半旬の巡回調査では, 発生を認めていない(平年同時期は, 発生圃場率が29.0%, 発生程度指数が1.0)。

(2) 高松地方気象台が10月28日に発表した1か月予報では, 気温, 降水量及び日照時間はほぼ平年並の見込みで, 平年と同様に晴れの日が多いと予想されており, やや発生助長的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

(1) 多発すると防除が困難になるので初期防除に努める。

アブラナ科野菜共通

黒腐病

1) 予報内容

発生量 平年より少なく(前年より少ない), 発生程度は「少」

2) 予報の根拠

(1) 10月第6半旬の巡回調査では, 発生を認めていない(平年同時期は, 発生圃場率が12.3%, 発病度が0.5(※但し過去3年間の平均値))。

(2) 高松地方気象台が10月28日に発表した1か月予報では, 気温, 降水量及び日照時間はほぼ平年並の見込みで, 平年と同様に晴れの日が多いと予想されており, 発生抑制的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

(1) 多発すると防除効果が期待できない場合が多いので, 発病前から定期的に薬剤を散布して予防する。

(2) 害虫による食害痕も病原菌の侵入口となるので, 害虫の防除も行う。

アブラムシ類

1) 予報内容

発生量 平年並(前年よりやや多い)で, 発生程度は「少」

2) 予報の根拠

(1) 10月第6半旬の巡回調査では, 発生圃場率が52.9%, 寄生株率が4.6%と, 平年(63.0%, 14.8%)に比べてやや低い。

(2) 高松地方気象台が10月28日に発表した1か月予報では, 気温, 降水量及び日照時間はほぼ平年並の見込みで, 平年と同様に晴れの日が多いと予想されており, やや発生助長的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

(1) 多発すると防除が困難になるので初期防除に努める。

コナガ

1) 予報内容

発生量 平年並(前年より少ない)で, 発生程度は「少」

2) 予報の根拠

(1) 10月第6半旬の巡回調査では, 発生圃場率が5.9%と, 平年(21.5%)に比べて低いが, 10株当たり寄生幼虫及び蛹数は0.1頭と, 平年(0.1頭)並の発生である。

(2) 高松地方気象台が10月28日に発表した1か月予報では, 気温, 降水量及び日照時間はほぼ平年並の見込みで, 平年と同様に晴れの日が多いと予想されており, やや発生助長的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

(1) 多発すると防除が困難になるので初期防除に努める。葉裏に生息しているので, 薬液は葉裏にも十分付着するよう丁寧に散布する。

(2) 薬剤抵抗性獲得の恐れがあるので, 同一系統薬剤の連用は避ける。

モンシロチョウ

1) 予報内容

発生量 平年よりやや多く(前年並), 発生程度は「少」

2) 予報の根拠

(1) 10月第6半旬の巡回調査では, 発生圃場率が11.8%, 10株当たり寄生幼虫数が0.1頭と, 平年(13.1%, 0.1頭)に比べてやや高い。

(2) 高松地方気象台が10月28日に発表した1か月予報では, 気温, 降水量及び日照時間はほぼ平年並の見込みで, 平年と同様に晴れの日が多いと予想されており, やや発生助長的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

(1) 若齢幼虫時の防除に努める。

秋冬ネギ

さび病

1) 予報内容

発生量 平年並(前年並)で, 発生程度は「少」

2) 予報の根拠

(1) 10月第6半旬の巡回調査では, 発生を認めていない(平年同時期は, 発生圃場率が1.1%, 発病株率が0.0%)。

(2) 高松地方気象台が10月28日に発表した1か月予報では, 気温, 降水量及び日照時間はほぼ平年並の見込みで, 平年と同様に晴れの日が多いと予想されており, 発生には中間的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

(1) 多発すると防除効果が期待できない場合が多いので, 発病前から定期的に薬剤を散布して予防する。

(2) 肥料切れすると発生が多くなるので, 適切な肥培管理に努める。

アブラムシ類

1) 予報内容

発生量 平年並(前年より少ない)で, 発生程度は「少」

2) 予報の根拠

(1) 10月第6半旬の巡回調査では, 発生を認めていない(平年同時期は, 発生圃場率が8.9%, 寄生株率が0.2%)。

(2) 高松地方気象台が10月28日に発表した1か月予報では, 気温, 降水量及び日照時間はほぼ平年並の見込みで, 平年と同様に晴れの日が多いと予想されており, やや発生助長的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

(1) 多発すると防除が困難になるので初期防除に努める。

ネギアザミウマ

1) 予報内容

発生量 平年並(前年よりやや少ない)で, 発生程度は「少～中」

2) 予報の根拠

(1) 10月第6半旬の巡回調査では, 発生圃場率が44.4%と, 平年(60.0%)に比べてやや低いが, 被害度は1.3と, 平年(3.1)並の発生である。

(2) 高松地方気象台が10月28日に発表した1か月予報では, 気温, 降水量及び日照時間はほぼ平年並の見込みで, 平年と同様に晴れの日が多いと予想されており, やや発生助長的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

(1) 多発すると防除が困難になるので初期防除に努める。

ネギハモグリバエ

1) 予報内容

発生量 平年より少なく(前年より少ない), 発生程度は「少」

2) 予報の根拠

- (1) 10月第6半旬の巡回調査では、発生を認めていない(平年同時期は、発生圃場率が82.2%、被害度が7.4)。
- (2) 高松地方気象台が10月28日に発表した1か月予報では、気温、降水量及び日照時間はほぼ平年並の見込みで、平年と同様に晴れの日が多いと予想されており、やや発生助長的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

- (1) 多発すると防除が困難になるので初期防除に努める。
- (2) 被害葉は有力な発生源となるので、圃場周辺に放置せずに、速やかに処分する。

冬レタス

アブラムシ類

1) 予報内容

発生量 平年並～やや多く(前年よりやや多い)、発生程度は「少」

2) 予報の根拠

- (1) 10月第6半旬の巡回調査では、発生圃場率が7.7%、寄生株率が0.2%と、平年(12.9%、0.5%)並の発生である。
- (2) 高松地方気象台が10月28日に発表した1か月予報では、気温、降水量及び日照時間はほぼ平年並の見込みで、平年と同様に晴れの日が多いと予想されており、やや発生助長的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

- (1) 多発すると防除が困難になるので初期防除に努める。

冬春ホウレンソウ

べと病

1) 予報内容

発生量 平年並(前年並)で、発生程度は「少」

2) 予報の根拠

- (1) 10月第6半旬の巡回調査では、発生を認めていない(平年同時期も未発生)。
- (2) 高松地方気象台が10月28日に発表した1か月予報では、気温、降水量及び日照時間はほぼ平年並の見込みで、平年と同様に晴れの日が多いと予想されており、やや発生抑制的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

- (1) 徳島県では、本病原菌レース1～13まで確認されているため、品種はレース1～13に抵抗性があるものを利用する。
- (2) 病原菌は被害株上で越冬し、春になると分生胞子を形成して伝染源となる。春先の発生を抑制するために、薬剤を予防的に散布して伝染を防止する。
- (3) 葉が繁茂して軟弱となると被害が多いので、肥培管理に注意する。

アブラムシ類

1) 予報内容

発生量 平年並～やや多く(前年よりやや少ない)、発生程度は「少」

2) 予報の根拠

- (1) 10月第6半旬の巡回調査では、発生圃場率が10.0%、1株当たりの寄生虫数が0.0頭と、平年(12.2%、0.0頭)並の発生である。
- (2) 高松地方気象台が10月28日に発表した1か月予報では、気温、降水量及び日照時間はほぼ平年並の見込みで、平年と同様に晴れの日が多いと予想されており、やや発生助長的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

- (1) 多発すると防除が困難となるので初期防除に努める。

冬春イチゴ

うどんこ病

1) 予報内容

発生量 平年並(前年並)で、発生程度は「少」

2) 予報の根拠

- (1) 10月第6半旬の巡回調査では、発生を認めていない(平年同時期は、発生圃場率が3.7%、発病葉率が0.0%)。
- (2) 高松地方気象台が10月28日に発表した1か月予報では、気温、降水量及び日照時間はほぼ平年並の見込みで、平年と同様に晴れの日が多いと予想されており、発生助長的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

- (1) 発生が多くなってからでは防除が困難になるので初期防除に努める。
- (2) 罹病葉は伝染源になるので、見つけ次第圃場外に持ち出し、病原菌密度の低下に努める。
- (3) 古葉を早めに除去し、葉裏に薬液が十分かかるよう丁寧に散布する。
- (4) 耐性菌出現の恐れがあるので、同一系統薬剤の連用は避ける。

アブラムシ類

1) 予報内容

発生量 平年並(前年よりやや少ない)で、発生程度は「少」

2) 予報の根拠

- (1) 10月第6半旬の巡回調査では、発生圃場率が16.7%と、平年(26.7%)並の発生であるが、寄生株率は1.0%と、平年(3.0%)に比べて低い。
- (2) 高松地方気象台が10月28日に発表した1か月予報では、気温、降水量及び日照時間はほぼ平年並の見込みで、平年と同様に晴れの日が多いと予想されており、やや発生助長的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

- (1) 多発すると防除が困難になるので初期防除に努める。アブラムシ類は葉裏や芯芽に寄生しているので、薬液は葉裏にも十分付着するよう丁寧に散布する。

ハダニ類

1) 予報内容

発生量 平年よりやや多く(前年より多い)、発生程度は「中」

2) 予報の根拠

- (1) 10月第6半旬の巡回調査では、発生圃場率が16.7%と、平年(29.4%)並の発生であるが、寄生葉率は5.8%と、平年(2.5%)に比べて高い。
- (2) 高松地方気象台が10月28日に発表した1か月予報では、気温、降水量及び日照時間はほぼ平年並の見込みで、平年と同様に晴れの日が多いと予想されており、やや発生助長的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

- (1) 多発すると防除が困難になるので初期防除に努める。ハダニ類は葉裏に寄生しているので、薬液が葉裏にも十分付着するよう丁寧に散布する。
- (2) 薬剤抵抗性獲得の恐れがあるので、同一系統薬剤の連用は避ける。

野菜共通

ハスモンヨトウ

1) 予報内容

発生量 平年並(前年よりやや多い)で、発生程度は「中」

2) 予報の根拠

- (1) 10月第6半旬のアブラナ科野菜(ブロッコリー・カリフラワー)における巡回調査では、発生圃場率が23.5%、寄生株率が1.3%と、平年(41.4%、3.6%)に比べて低い。
- (2) 10月のフェロモントラップへの誘殺虫数(調査9地点の平均)は、ほぼ平年並に推移している(図1)。




図1 ハスモンヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(野菜圃場)
* 徳島市,石井町,阿波市,吉野川市,東みよし町,三好市の9地点平均

(3) 高松地方気象台が10月28日に発表した1か月予報では、気温、降水量及び日照時間はほぼ平年並の見込みで、平年と同様に晴れの日が多いと予想されており、やや発生助長的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

(1) 幼虫の齢期が進むと薬剤の効果が著しく低下するので、早期発見に努め、若齢幼虫時に防除を行う。

オオタバコガ

1) 予報内容

発生量 平年よりやや少なく(前年よりやや少ない)、発生程度は「少」

2) 予報の根拠

(1) 10月第6半旬における冬レタスの巡回調査では、発生を認めていない(平年同時期は、発生圃場率が1.5%、寄生株率が0.0%)。

(2) 10月のフェロモントラップへの誘殺虫数(調査6地点の平均)は、第1～2半旬は平年より少なかったが、第3半旬以降は、平年並に推移している(図2)。

(3) 高松地方気象台が10月28日に発表した1か月予報では、気温、降水量及び日照時間はほぼ平年並の見込みで、平年と同様に晴れの日が多いと予想されており、やや発生助長的な気象条件である。

3) 防除上注意すべき事項

(1) 結球野菜では、幼虫食入後は薬剤の効果が無いので、結球直前までに、使用基準に基づき必ず薬剤防除を行う。




図2 オオタバコガフェロモントラップ誘殺数推移
* 阿波市,三好市,東みよし町,石井町の6地点平均

シロイチモジヨトウ

1) 予報内容

発生量 平年並～やや多く(前年より少ない)、発生程度は「中」

2) 予報の根拠

(1) 10月第6半旬におけるブロッコリー・カリフラワーの巡回調査では、発生圃場率が17.6%と、平年(11.5%)に比べてやや高く、寄生株率は1.4%と、平年(0.6%)に比べて高い。

(2) 10月第6半旬における冬レタスの巡回調査では、発生圃場率が7.7%、寄生株率が0.2%と、平年(8.0%, 0.3%)並の発生である。

(3)10月のフェロモントラップへの誘殺虫数(調査7地点の平均)は、ほぼ平年並に推移している(図2)。

(4)高松地方気象台が10月28日に発表した1か月予報では、気温、降水量及び日照時間はほぼ平年並の見込みで、平年と同様に晴れの日が多いと予想されており、やや発生助長的な気象条件である。

3)防除上注意すべき事項

(1)幼虫の齢期が進むと薬剤の効果が著しく低下するので、早期発見に努め、若齢幼虫時に防除を行う。




図3 シロイチモジヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(野菜圃場)
* 徳島市,石井町,阿波市,吉野川市の7地点平均

II. その他

1. 薬剤の使用に当たっては、必ず農薬ラベル記載事項を遵守すること。

発生量の表示

発生程度：甚>多>中>少>無

発生量：多い>やや多い>並>やや少ない>少ない

徳島県立農林水産総合技術支援センター病害虫防除所
URL : <https://www.pref.tokushima.lg.jp/tafftsc/t-boujoso/>

○ 病害虫の発生予察情報, 発生状況, 防除法等をお知らせしています。