

徳島県における環境放射能調査（第26報）

徳島県立保健製薬環境センター

平井 裕通・森兼 祥太・高島 京子*

Radioactivity Monitoring Data in Tokushima Prefecture (XXVI)

Hiromichi HIRAI, Syouta MORIKANE, and Kyoko TAKASHIMA

Tokushima Prefectural Institute of Public Health, Pharmaceutical and Environmental Sciences Center

Key words : 環境放射能 environmental radioactivity

I はじめに

令和2年4月から令和3年3月の間に実施した原子力規制委員会委託「環境放射能水準調査」について報告する。この調査は昭和61年チェルノブイリ原発事故を契機として始まり、全都道府県が「環境放射能水準調査」として実施しているものである。

II 方法

1 調査期間

令和2年4月1日～令和3年3月31日

2 調査項目

環境放射能調査項目を表1に示す。

3 測定装置

- (1) 全β放射能測定 : β線測定装置 (ALOKA 社製 JDC-5200)
- (2) γ線核種分析 : Ge 半導体核種分析装置 (SEIKO EG&G 社製 GEM-25-70)
- (3) 空間放射線量率 : モニタリングポスト (ALOKA 社製 MAR-22, 応用光研工業社製 FND-303)

表1 環境放射能調査項目

番号	調査項目	調査地点		備考
1	定時降水	徳島市 (保健製薬環境センター)		全β放射能測定
2	大気浮遊じん	徳島市 (保健製薬環境センター)		γ線核種分析
3	降下物	徳島市 (保健製薬環境センター)		
4	陸水 (蛇口水)	徳島市 (保健製薬環境センター)		
5	土壌	上板町 (農林水産総合技術支援センター)		
6	精米	石井町		
7	野菜 (大根)	石井町 (農林水産総合技術支援センター)		
	野菜 (ほうれん草)	石井町		
8	牛乳 (原乳)	上板町 (農林水産総合技術支援センター)		モニタリングポスト
9	空間放射線量率	徳島局	徳島市 (徳島保健所)	
		鳴門局	鳴門市 (鳴門合同庁舎)	
		美波局	美波町 (南部総合県民局美波庁舎)	
		池田局	三好市 (池田総合体育館)	

* 令和3年3月退職

4 試料の調製及び測定方法

試料の調製及び測定方法は「環境放射能水準調査委託実施計画書」¹⁾、文部科学省「全ベータ放射能測定法」²⁾、「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」³⁾、「連続モニタによる環境ガンマ線測定法」⁴⁾、「環境試料採取法」⁵⁾に準拠し実施した。

(1) 定時降水

保健製薬環境センター（以下「当センター」という。）屋上に雨水採取器（受水面積 423 cm²）を設置し、9 時に前 24 時間の降水を採取し、全 β 放射能を測定した。

なお、全 β 放射能が検出された試料については γ 線核種分析を行った。

(2) 大気浮遊じん

当センター屋上においてハイボリュームエアサンプラーを用いて約 1,680 m³の大気を吸引し、ガラス繊維ろ紙上に捕集した。これを 1 か月に 2 回行い、3 か月分の試料をまとめて γ 線核種分析を行った。

(3) 降下物

当センター屋上に大型水盤（受水面積 5,000 cm²）を設置し、1 か月間の降下物を集め、濃縮乾固した後、γ 線核種分析を行った。

(4) 陸水（蛇口水）

当センター4階の蛇口水を 100 L 採取し、濃縮乾固した後、

γ 線核種分析を行った。

(5) 土壌

農林水産総合技術支援センターで 0~5 cm, 5~20 cm の深さの土壌をそれぞれ採取し、105°C で乾燥した後、ふるい（目開き 2 mm）に通し、γ 線核種分析を行った。

(6) 精米

購入した精米を前処理することなく、γ 線核種分析を行った。

(7) 野菜

購入した大根及びほうれん草について、各検体を 105°C で 72 時間乾燥した後、電気炉を用いて 450°C で 24 時間灰化処理を行い、ふるい（目開き 0.35 mm）に通し、γ 線核種分析を行った。

(8) 牛乳

農林水産総合技術支援センターで採取した牛乳 2 L を前処理することなく、γ 線核種分析を行った。

また、牛乳 3 L をガスコンロで炭化処理し、電気炉を用いて 450°C で 24 時間灰化処理した後、ふるい（目開き 0.35 mm）に通し、γ 線核種分析を行った。

(9) 空間放射線量率

徳島局、鳴門局、美波局及び池田局にモニタリングポストを設置し、24 時間連続測定を行った。

表 2 定時降水試料中の全 β 放射能調査結果

採取年月	降水量 (mm)	放射能濃度 (Bq/L)			月間降下量 (MBq/km ²)
		測定数	最低値	最高値	
令和2年 4月	110.6	3	N.D	N.D	N.D
5月	103.8	6	N.D	N.D	N.D
6月	155.3	9	N.D	N.D	N.D
7月	273.0	12	N.D	N.D	N.D
8月	21.2	2	N.D	N.D	N.D
9月	301.6	8	N.D	N.D	N.D
10月	374.0	7	N.D	N.D	N.D
11月	39.5	4	N.D	N.D	N.D
12月	10.1	2	N.D	N.D	N.D
令和3年 1月	65.3	3	N.D	N.D	N.D
2月	57.6	6	N.D	0.72	3.6
3月	101.5	8	N.D	N.D	N.D
年間値	1613.5	70	N.D	N.D	N.D
過去3年間の値(平成29~令和元年度)		241	N.D	1.1	N.D~7.3

※N.Dは検出限界値未満（計数値がその計数誤差の3倍を下回るもの）を示す。

表3 ゲルマニウム半導体検出器による γ 核種分析測定調査結果

^{131}I

試料名	採取場所	採取年月	検体数	^{131}I		前年度までの過去3年間の値		単位	
				最低値	最高値	最低値	最高値		
大気浮遊じん	徳島市	R2.4 - R3.3	4	N.D	N.D	N.D	N.D	mBq/m ³	
降下物	徳島市	R2.4 - R3.3	12	N.D	N.D	N.D	N.D	MBq/km ²	
陸水(蛇口水)	徳島市	R2.6	1	N.D		N.D	N.D	mBq/L	
土壌	0~5 cm	上板町	R2.8	1	N.D		N.D	N.D	Bq/kg乾土
					N.D		N.D	N.D	MBq/km ²
	5~20 cm	上板町	R2.8	1	N.D		N.D	N.D	Bq/kg乾土
					N.D		N.D	N.D	MBq/km ²
精米	石井町	R2.10	1	N.D		N.D	N.D	Bq/kg精米	
野菜	大根	石井町	R3.1	1	N.D		N.D	N.D	Bq/kg生
	ほうれん草	石井町	R3.1	1	N.D		N.D	N.D	
牛乳	上板町	R2.8	1	N.D		N.D	N.D	Bq/L	

^{134}Cs

試料名	採取場所	採取年月	検体数	^{134}Cs		前年度までの過去3年間の値		単位	
				最低値	最高値	最低値	最高値		
大気浮遊じん	徳島市	R2.4 - R3.3	4	N.D	N.D	N.D	N.D	mBq/m ³	
降下物	徳島市	R2.4 - R3.3	12	N.D	N.D	N.D	N.D	MBq/km ²	
陸水(蛇口水)	徳島市	R2.6	1	N.D		N.D	N.D	mBq/L	
土壌	0~5 cm	上板町	R2.8	1	N.D		N.D	N.D	Bq/kg乾土
					N.D		N.D	N.D	MBq/km ²
	5~20 cm	上板町	R2.8	1	N.D		N.D	N.D	Bq/kg乾土
					N.D		N.D	N.D	MBq/km ²
精米	石井町	R2.10	1	N.D		N.D	N.D	Bq/kg精米	
野菜	大根	石井町	R3.1	1	N.D		N.D	N.D	Bq/kg生
	ほうれん草	石井町	R3.1	1	N.D		N.D	N.D	
牛乳	上板町	R2.8	1	N.D		N.D	N.D	Bq/L	

^{137}Cs

試料名	採取場所	採取年月	検体数	^{137}Cs		前年度までの過去3年間の値		単位	
				最低値	最高値	最低値	最高値		
大気浮遊じん	徳島市	R2.4 - R3.3	4	N.D	N.D	N.D	N.D	mBq/m ³	
降下物	徳島市	R2.4 - R3.3	12	N.D	N.D	N.D	N.D	MBq/km ²	
陸水(蛇口水)	徳島市	R2.6	1	N.D		N.D	N.D	mBq/L	
土壌	0~5 cm	上板町	R2.8	1	1.9		2.1	3.0	Bq/kg乾土
					120		63	100	MBq/km ²
	5~20 cm	上板町	R2.8	1	1.6		1.9	2.4	Bq/kg乾土
					130		130	160	MBq/km ²
精米	石井町	R2.10	1	N.D		N.D	N.D	Bq/kg精米	
野菜	大根	石井町	R3.1	1	N.D		N.D	N.D	Bq/kg生
	ほうれん草	石井町	R3.1	1	N.D		N.D	N.D	
牛乳	上板町	R2.8	1	N.D		N.D	N.D	Bq/L	

※N.Dは検出限界値未満(計数値がその計数誤差の3倍を下回るもの)を示す。

表4 空間放射線量率測定結果

測定年月日	徳島局			鳴門局			美波局			池田局		
	最高値	最低値	平均値									
令和2年 4月	59	37	39	84	48	54	75	50	53	100	55	60
5月	55	37	39	76	50	53	82	50	54	80	56	60
6月	60	37	39	93	51	54	97	48	54	109	55	61
7月	59	37	39	79	50	54	77	49	53	89	55	60
8月	43	37	39	59	49	53	59	50	54	86	57	62
9月	54	37	39	83	50	54	69	49	53	83	56	60
10月	50	38	40	67	47	54	74	50	54	77	56	60
11月	53	37	40	75	50	54	78	49	54	84	56	60
12月	47	38	40	69	50	54	64	50	54	100	56	60
令和3年 1月	55	38	40	76	50	54	69	50	54	93	54	59
2月	51	37	40	78	51	54	67	49	54	92	55	59
3月	59	37	39	92	50	54	77	47	54	111	55	60
年間値	60	37	40	93	47	54	97	47	54	111	54	60
過去3年間の値 (平成29～ 令和元年度)	62	36	40	113	47	54	95	48	54	114	53	60

※単位：nGy/h

Ⅲ 調査結果及び考察

1 降雨中の全β放射能測定

表2に定時降水試料中の全β放射能濃度測定結果を示す。1試料で全β放射能が検出されたが、γ線核種分析の結果、人工放射性核種は検出されなかった。なお、検出下限値は、計数誤差の3倍とした。

2 γ線核種分析

表3に大気浮遊じん、降水物、陸水、土壌及び食品試料中のγ線核種分析結果を示す。土壌試料から人工放射性核種である¹³⁷Csが検出されたが、例年同様、低レベルであった。これは、過去に行われた大気圏核実験等に由来するものと推察され、また、例年のデータと比較しても大差はない値であった。

その他の試料については、人工放射性核種である¹³¹I、¹³⁴Cs、¹³⁷Csはいずれも検出限界値未満であった。

3 空間放射線量率

表4に空間放射線量率の測定結果を示す。徳島局における空間放射線量率は、37～60 nGy/hであり、過去3年間の値と同程度で推移した。鳴門局、美波局、池田局においても、降雨の影響により、最高値の変動はあるが、平均値としてはいずれの局も年間を通して同程度で推移した。いずれの局においても、最高値を記録した際は天候不良であり、降雨もしくは降雪により、大気中の天然放射性核種が地表面に落下する一般的な現象によるものと考えられる。

なお、徳島局に比べ、他の3局が高い値を示しているが、これは設置場所の状況の違いや、地面、地質の違いによるものと考えられる⁹⁾。

Ⅳ まとめ

令和2年度における環境放射能水準調査については、γ線核種分析の結果、土壌試料で¹³⁷Csが検出されたが、例年同

様、低濃度であった。

全β放射能測定では、1試料で全β放射能が検出されたが、γ線核種分析の結果、人工放射性核種は不検出であった。空間放射線量率は4局で測定した結果、設置場所の状況により測定値はそれぞれ異なるが、各局ともに年間を通して、概ね変動のない数値であった。

以上から、本調査結果により、徳島県の環境放射能については、これまでと同程度の放射線量のレベルで推移していることが確認された。

参考文献

- 1) 原子力規制委員会：令和2年度環境放射能水準調査委託実施計画書（2020）
- 2) 文部科学省編：全ベータ放射能測定法（1976）
- 3) 文部科学省編：ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー（1992）
- 4) 原子力規制委員会：連続モニタによる環境ガンマ線測定法（2017）
- 5) 文部科学省編：環境試料採取法（1983）
- 6) 中村友紀，海東千明，永峰正章，他：徳島県内の環境放射能に対する福島第一原子力発電所の事故の影響，徳島県立保健製薬環境センター年報，2，25-30（2012）