

家畜衛生便り

No.382 令和4年11月22日発行

西部家畜保健衛生所

○吉野川庁舎

〒776-0002 吉野川市鴨島町麻植塚136-3

TEL 0883-24-2029 FAX 0883-24-1397

○東みよし庁舎

〒779-4703 三好郡東みよし町中庄856-1

TEL 0883-82-2397 FAX 0883-82-4843

家畜保健衛生所ホームページURL

<https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/sangyo/chikusangyo/7206483/>

全国で高病原性鳥インフルエンザ(HPAI) が続発しています!!

国内各地でHPAIが猛威を振るっており、養鶏場では、過去最も早い10月に初めて確認されて以降、今シーズンはすでに、10県14事例の発生が続いています（令和4年11月22日現在）。

例年にも増して、全国的に発生リスクが極めて高い状況です。

「鳥インフルエンザ・とくしまアラート」 を引き上げました。

香川県での続発を受け、「鳥インフルエンザ・とくしまアラート」の区分が、

警戒レベル最高の
ステージⅣ(特別警報)
に引き上げられました。

区分	発動基準
平常時 (感染観察)	(家きん・野鳥) 遠方諸国等で発生
ステージⅠ (感染観察(強化))	(家きん)近隣国で発生 (野鳥)近隣国で陽性
ステージⅡ (感染拡大注意報)	(家きん)国内で発生 (野鳥)国内で陽性
ステージⅢ (感染拡大警報)	(家きん)近隣県で発生
ステージⅣ (特別警報)	(家きん)近隣県で続発

- ・消石灰散布による消毒（週1回以上実施）
- ・農場敷地内の除草

など、これまで以上に防疫対策を強化してください。

本病の発生防止に万全を期するため、次の重点7項目の確実な実施，不備の改善など，飼養衛生管理基準の遵守をお願いします。

- 1 衛生管理区域に立ち入る者の**手指消毒**等
- 2 衛生管理区域**専用の衣服及び靴**の設置並びに使用
- 3 衛生管理区域に立ち入る**車両の消毒**等
- 4 家きん舎に立ち入る者の**手指消毒**等
- 5 **家きん舎ごとの専用の靴**の設置及び使用
- 6 野生動物の侵入防止のための**ネット等の設置，点検，修繕**
- 7 **ねずみ及び害虫の駆除**

消毒ポイントの設置について

香川県でのHPAI続発に伴い，県内へのウイルス侵入を防ぐため，消毒ポイントを設置しています。

付近を運行する養鶏関係車両は，必ず消毒ポイントを通過するよう，お願いします。

設置場所 国道32号（三好市池田町込野）別図参照
設置期間 令和4年11月22日 から 当面の間

異常家きんの早期発見，早期通報を徹底してください。


日々の健康観察を徹底し，死亡羽数の急増（通常の死亡率の2倍以上）など，飼養鶏に異常が確認された場合は，直ちに，最寄りの家畜保健衛生所に御連絡下さい。

＜連絡先＞西部家畜保健衛生所（**24時間対応**）

○吉野川庁舎 0883-24-2029

○東みよし庁舎 0883-82-2397

別図



令和4年度 国内における高病原性及び低病原性鳥インフルエンザ発生状況

○野鳥 10道県35事例

※詳細は環境省HP参照 <https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/birdflu/>

検体回収場所	検体回収日	種名	病原性	亜型
1 神奈川県伊勢原市	9/25	ハヤブサ	HPAI	HSN1
2 宮城県栗原市	10/4	マガン	HPAI	HSN1
3 福井県南越前町	10/11	ハヤブサ	HPAI	HSN1
4 北海道野付郡別海町	10/8	黄鵪(ガンカモ類)	HPAI	HSN1
5 宮城県栗原市	10/14	マガン	HPAI	HSN1
6 新潟県新潟市	10/16	ハヤブサ	HPAI	HSN1
7 新潟県聖籠町	10/21	ノスリ	HPAI	H5
8 北海道紋別市	10/23	黄鵪(ガンカモ類)	HPAI	HSN1
9 北海道札幌市	10/28	ハシブトカラス	HPAI	HSN2
10 鹿児島県出水市	11/1	ナベヅル	HPAI	HSN1
11 鹿児島県出水市	11/2	ナベヅル	HPAI	HSN1
12 鹿児島県出水市	11/3	ナベヅル	HPAI	HSN1
13 鹿児島県出水市	11/4	ナベヅル	HPAI	HSN1
14 宮城県石巻市	11/2	オオハクチョウ	HPAI	H5
15 鹿児島県出水市	11/5	ナベヅル	HPAI	HSN1
16 鹿児島県出水市	11/6	ナベヅル	HPAI	HSN1
17 宮城県仙台市	11/4	オオハクチョウ	HPAI	H5
18 鹿児島県出水市	11/7	ナベヅル	HPAI	HSN1
19 香川県観音寺市	11/7	ヒドリガモ	HPAI	H5
20 宮城県日向市	11/6	マガモ	HPAI	H5
21 北海道斜里町	11/6	オオセグロカモメ	HPAI	H5
22 鹿児島県出水市	11/8	ナベヅル	HPAI	HSN1
23 鹿児島県出水市	11/7	環境試料(水)	HPAI	HSN1
24 鹿児島県出水市	11/9	ナベヅル	HPAI	HSN1
25 鹿児島県出水市	11/10	ナベヅル	HPAI	HSN1
26 鹿児島県出水市	11/11	ナベヅル	HPAI	HSN1
27 北海道斜里町	11/10	ハシブトカラス	HPAI	H5
28 鹿児島県出水市	11/12	ナベヅル	HPAI	HSN1
29 鹿児島県出水市	11/13	ナベヅル	HPAI	HSN1
30 鹿児島県出水市	11/14	ナベヅル	HPAI	HSN1
31 鹿児島県出水市	11/14	マナヅル	HPAI	HSN1

○飼養鳥 2県2事例


※詳細は環境省HP参照 <https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/birdflu/>

検体回収場所	検体回収日	種名	病原性	亜型
1 香川県丸亀市	11/7	コバクチョウ	HPAI	H5
2 和歌山県白浜町	11/13	モモイロペリカン	HPAI	H5

※ HPAI: 高病原性鳥インフルエンザ
LPAI: 低病原性鳥インフルエンザ

○家きん 10道県13事例

	地域	疑似患者判定日	用途	羽数(約)	亜型
1	岡山県倉敷市	10/28	採卵鶏	17万羽	HSN1
2	北海道厚真町	10/28	肉用鶏	17万羽	HSN1
3	香川県観音寺市	11/1	採卵鶏	4万羽	HSN1
4	茨城県かすみがうら市	11/4	採卵鶏	104万羽	HSN1
5	岡山県倉敷市	11/4	採卵鶏	51万羽	HSN1
6	北海道伊達市	11/7	肉用鶏	15万羽	HSN1
7	岡山県倉敷市	11/11	採卵鶏	3.4万羽	HSN1
8	和歌山県白浜町	11/11	あひる等	約60羽	HSN1
9	兵庫県たつの市	11/13	採卵鶏	4.4万羽	HSN1
10	鹿児島県出水市	11/18	採卵鶏	12万羽	H5
11	新潟県阿賀町	11/18	肉養鶏	15万羽	H5
12	宮城県新富町	11/20	採卵鶏	16万羽	H5
13	青森県横浜町	11/20	肉用鶏	12.2万羽	H5



●14事例目 (11/22追加)

所在地 香川県観音寺市
飼養状況 約2.4万羽 (肉用鶏)
【疫学関連農場】
香川県観音寺市 (1農場, 約0.9万羽)

(令和4年11月21日時点)