

イチゴの育苗管理（台風対策）

- 天気が崩れることが明らかな場合は摘葉等の管理は避ける
 - 晴れてる間に炭疽病予防のため殺菌剤を散布する
 - 苗が飛ばされない様に寒冷紗やネット等で被覆する
 - 台風通過後は速やかに被覆資材を取り除き、炭疽病予防のため殺菌剤を散布する
- ※ 「イチゴ炭疽病防除のための殺菌剤散布モデル」を参考に防除して下さい
- ※ 農薬の登録内容は変更される場合がありますので、最新の情報を確認して下さい
- ※ 防除の際は使用履歴に注意して下さい

イチゴ炭疽病防除のための殺菌剤散布モデル <秋ランナーから苗受・9月4週定植>

【週一防除】

| 時期 | 商品名 | 使用回数 | 治療 or 予防 | FRACコード | 耐性菌リスク | | |
|--------------------------------|-------|--------------|--------------|---------|--------|-----|-----|
| 10月中旬 | 親株定植 | キノドーフロアブル | 3回以内 | 予 | M1 | 低 | |
| ~11月中 | 定植7日後 | セイビアーフロアブル20 | 3回以内 | 予 | 12 | 低~中 | |
| | 適宜 | コサイド3000 | — | 予 | M1 | 低 | |
| 3月 第3週 | | アントラコール顆粒水和剤 | 6回以内 | 予 | M3 | 低 | |
| 第4週 | | トレノックスフロアブル | 5回以内 | 予 | M3 | 低 | |
| 4月 | 育苗期 | 第1週 | オーソサイド水和剤80 | 5回以内 | 予 | M4 | 低 |
| | | 第2週 | ジマンダイセン水和剤 | 6回以内 | 予 | M3 | 低 |
| | | 第3週 | セイビアーフロアブル20 | 3回以内 | 予 | 12 | 低~中 |
| | | 第4週 | トレノックスフロアブル | 5回以内 | 予 | M3 | 低 |
| 5月 | | 第1週 | オーソサイド水和剤80 | 5回以内 | 予 | M4 | 低 |
| | | 第2週 | ジマンダイセン水和剤 | 6回以内 | 予 | M3 | 低 |
| | | 第3週 | セイビアーフロアブル20 | 3回以内 | 予 | 12 | 低~中 |
| | | 第4週 | オーソサイド水和剤80 | 5回以内 | 予 | M4 | 低 |
| 6月 | | 第1週 | トレノックスフロアブル | 5回以内 | 予 | M3 | 低 |
| | | 第2週 | キノドーフロアブル | 3回以内 | 予 | M1 | 低 |
| 薬剤散布回数はランナー切り離し後から新たに開始 | | | | | | | |
| ランナー切り離 | 直後 | セイビアーフロアブル20 | 3回以内 | 予 | 12 | 低~中 | |
| | 3日後 | アントラコール顆粒水和剤 | 6回以内 | 予 | M3 | 低 | |
| | 3日後 | ベルコートフロアブル | 5回以内 | 予治 | M7 | 低 | |
| 6月 第3週 | | 第4週 | ジマンダイセン水和剤 | 6回以内 | 予 | M3 | 低 |
| | | 第4週 | トレノックスフロアブル | 5回以内 | 予 | M3 | 低 |
| 7月 | | 第1週 | アントラコール顆粒水和剤 | 6回以内 | 予 | M3 | 低 |
| | | 第2週 | ジマンダイセン水和剤 | 6回以内 | 予 | M3 | 低 |
| | | 第3週 | セイビアーフロアブル20 | 3回以内 | 予 | 12 | 低~中 |
| | | 第4週 | トレノックスフロアブル | 5回以内 | 予 | M3 | 低 |
| 8月 | | 第1週 | アントラコール顆粒水和剤 | 6回以内 | 予 | M3 | 低 |
| | | 第2週 | トレノックスフロアブル | 5回以内 | 予 | M3 | 低 |
| | | 第3週 | アントラコール顆粒水和剤 | 6回以内 | 予 | M3 | 低 |
| | | 第4週 | セイビアーフロアブル20 | 3回以内 | 予 | 12 | 低~中 |
| 9月 | | 第1週 | トレノックスフロアブル | 5回以内 | 予 | M3 | 低 |
| | | 第2週 | アントラコール顆粒水和剤 | 6回以内 | 予 | M3 | 低 |
| | | 第3週 | ベルコートフロアブル | 5回以内 | 予治 | M7 | 低 |
| | | 第4週 | トレノックスフロアブル | 2回以内 | 予 | M3 | 低 |
| 10月 中旬 | 定植後 | ファンタジスタ顆粒水和剤 | 3回以内 | 予治 | 11 | 高 | |
| 下旬 | | オーソサイド水和剤80 | 5回以内 | 予 | M4 | 低 | |

散布間隔が7日以上開かないよう散布する

【追加防除】
風雨の前後

【追加防除】
風雨の前後

「ベルコート」はうどんこ病を同時防除
ファンタジスタは灰色カビを同時防除

定植後は10日に1回散布
ただし、雨前後や、葉かき後は【追加防除】

※オーソサイド水和剤80、キノドーフロアブルは高温期薬害注意
 ※オーソサイド水和剤80の登録内容が収穫14日前まで5回以内に変更(R3.9.8)されました。
 ※オーソサイド水和剤80とデランフロアブルについて、「サフオイル乳剤」との混用及び近接散布は避けて下さい。前後28日間隔の散布で葉が焼けるような症状の薬害発生が確認されています。
 ※ジマンダイセン水和剤は収穫76日前までなので、早出し栽培では使用時期に注意

【追加防除】

・上記「週一防除」の合間、風雨の前後などに散布

| | | | | | | | |
|--------|------|--------------|------|----|------|---|-----------|
| 育苗期 | 残効3日 | ベルコートフロアブル | 5回以内 | 予治 | M7 | 低 | うどんこ登録 |
| | 残効3日 | デランフロアブル | 2回以内 | 予 | M9 | 低 | — |
| | 残効不明 | フロンサイドSC | 1回 | 予 | 29 | 低 | — |
| 収穫21日前 | 残効3日 | ゲッター水和剤 | 3回以内 | 予治 | 1,10 | 高 | — |
| 収穫前日 | 残効不明 | ファンタジスタ顆粒水和剤 | 3回以内 | 予治 | 11 | 高 | 灰色カビ登録 |
| 収穫前日 | 残効不明 | シグナムWDG(残効◎) | 2回以内 | 予治 | 7,11 | 高 | うどんこ・灰色カビ |