

注 意 報

農技セ第5052号
令和5年10月17日

各関係機関長 殿

徳島県立農林水産総合技術支援センター
病害虫防除所長
(公印省略)

令和5年度農作物病害虫発生予察情報について

令和5年度農作物病害虫発生予察注意報第1号を公表したので送付します。

令和5年度病害虫発生予察注意報第1号

令和5年10月17日
徳 島 県

9月第5半旬から10月第3半旬のフェロモントラップ定点調査において、オオタバコガの誘殺数が平年に比べやや多く推移していることから、今後、野菜類で被害の拡大が予想されますので、注意報を発令します。

現地ほ場においては、本虫の発生状況に注意し、適切な防除指導をお願いいたします。

作物名：野菜類(特にブロッコリー、レタス)

病害虫名：オオタバコガ

1. 発生地域 県内全域(特に県西部)
2. 発生時期 10月中旬～下旬
3. 発生程度 やや多(前年よりやや多い、平年よりやや多い)

4. 注意報発令の根拠

- (1) フェロモントラップの定点(6地点)調査において、9月第5半旬より誘殺数が増加し、10月第3半旬には平均で58.2頭と、平年(46.3頭)の約1.26倍となった(図1)。特に10月第3半旬には三好市では80頭と、平年(38頭)の約2.1倍(図2)、東みよし町では96頭と、平年(59頭)の1.6倍(図3)となった。
- (2) 高松地方气象台が10月12日に発表した1か月予報では、気温は平年より高く、降水量は少なく、日照時間は多く、平年に比べ晴れの日が多くなると予想されており、やや発生助長的な気象条件である。




図1 オオタバコガ フェロモントラップ誘殺数 阿波市、三好市、東みよし町、石井町の6地点平均




図2 オオタバコガ フェロモントラップ誘殺数 三好市三野町勢力




図3 オオタバコガ フェロモントラップ誘殺数 東みよし町屋間

5. 防除法等

- (1) 新しい食害痕や虫糞を見つけたら、その周辺に幼虫がいる可能性が高いので、発見しだい捕殺する。
- (2) 作物内に食入した幼虫や発育が進んだ幼虫に対しては薬剤の効果が著しく低下するため、被害を確認次第、直ちに防除を実施する。
- (3) 防除については、徳島県植物防疫指針 (URL: <https://www.nouyaku-sys.com/nouyaku/user/top/tokushima>) を参照するとともに、薬剤の使用に当たっては、必ず農薬ラベル記載事項を遵守する。




図4 オオタバコガ卵



図5 オオタバコガによるトマトの被害



図6 オオタバコガ成虫