

広報家畜衛生

令和5年11月28日発行

○徳島家畜保健衛生所

〒770-0045 徳島市南庄町5丁目94

TEL 088-631-8950 FAX 088-631-8938

○阿南支所

〒774-0030 阿南市富岡町あ王谷46

TEL 0884-22-0304 FAX 0884-22-2225

家畜保健衛生所ホームページURL

<https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippanokata/sangyo/chikusangyo/2014022000090/>


佐賀県鹿島市で
高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜確認

今シーズン 国内1例目

茨城県笠間市で
高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜確認

今シーズン 国内2例目

佐賀県鹿島市
採卵鶏
約40,000羽



茨城県笠間市
採卵鶏
約72,000羽

異常家きんの早期発見、早期通報に留意してください

鶏の日常の健康観察を徹底し、死亡羽数の急増（通常の死亡率の2倍以上）や、飼養鶏に異常が確認された場合は、直ちに最寄りの家畜保健衛生所にご連絡ください。

＜連絡先＞ 徳島家畜保健衛生所（24時間対応）

徳島本所 088-631-8950

阿南支所 0884-22-0304

家畜保健衛生所は、休日・夜間も24時間対応しています

緊急消毒を実施するため、 各農場に消石灰を配布します


ウイルスの侵入を防ぎ、更なる防疫対策の徹底を図るため、消石灰を配布します。

配送手配が終了後、順次配布しますので、鶏舎周りを中心に、確実に消毒を実施するようお願いします。

なお、配布されるまでは、お手持ちの消石灰等の消毒薬で消毒を徹底するよう、よろしくお願いします。

消石灰散布方法について

★ 散布のイメージ




◎鶏舎周辺・衛生管理区域外縁部以外の部分についても、可能な限り散布してください。

注意：消毒薬散布にあたっては、住居・河川等隣接地の環境・立地状況を考慮して、その消毒薬散布量及び実施を判断してください。

★ 散布量

1㎡あたり0.5kg以上(地面がほぼ見えなくなる程度)になるよう散布してください。




高病原性鳥インフルエンザ

発生予防のポイント

01

農場に入る全ての
人・車両・物品は衛生対策

作業員や外部事業者等を含め、衛生管理区域と家きん舎に入る人は衛生対策を徹底。車両も入場前の洗浄・消毒を必ず実施。物品は原則農場専用。やむを得ず持ち込む場合は洗浄・消毒を忘れない。


 周囲にはウイルスがあると認識。
農場内・家きん舎内には入れない。



02

衛生管理区域・家きん舎ごとに
専用の長靴を着用

農場に入るとき、家きん舎に入るときは、必ず衛生的な長靴に交換。農場内では専用の衣服を着用。


 着替え・履き替えの前後で
交差しないよう境界を明確に。



03

ウイルスを媒介する
野生動物の侵入防止対策

家きん舎は定期点検し、防鳥ネットや壁等の破損などはすぐに修繕。目の届きにくい屋根裏や入気口も注意が必要。

 「農場に近寄らせない」
「農場内に入れない」
「ネズミ・ハエ等の定期的な駆除」



飼養家きの異状を見つけた場合は、最寄りの家畜保健衛生所に連絡。

徳島県徳島家畜保健衛生所

TEL 088-631-8950 (徳島本所)
TEL 0884-22-0304 (阿南支所)

農林水産省HP
「鳥インフルエンザに関する情報」→



農場付近の水場は水抜き、忌避テープの設置等により、野鳥を寄せ付けない工夫を。



長靴は洗浄してから消毒の徹底。消毒薬は定期的、または汚れた都度交換。

農場の


重点対策



集卵コンベアなどの開口部の隙間を塞ぐ。普段目の届きにくい屋根裏や入気口も点検し、破損があれば補修。



農場辺縁を含め敷地内の草刈りや枝の剪定を行い、野生動物が隠れる場所を作らない。



車両の消毒の徹底。車体、タイヤ周りや溝の汚れをしっかりと落とす。



洗浄・消毒された衛生的な衣服や長靴を用意。



着替え、履き替えの前後で動線が交差しないよう境界を明確に。

— 例外を作らずに必ず実施することが大切です。 —