

注 意 報

農技セ第5505号
令和6年7月2日

各関係機関長 殿

徳島県立農林水産総合技術支援センター
病虫害防除所長
(公印省略)

令和6年度農作物病虫害発生予察情報について

令和6年度農作物病虫害発生予察注意報第2号を発表したので送付します。

令和6年度病虫害発生予察注意報第2号

令和6年7月2日
徳 島 県

6月第4半旬～第6半旬のフェロモントラップ定点調査において、オオタバコガの誘殺数が平年に比べて多く推移していることから、今後、野菜類で幼虫による被害の拡大が予想されますので、注意報を発令します。

現地ほ場においては、本虫の発生状況を注視するとともに、適切な防除指導をお願いいたします。

作物名：野菜類(特に夏秋ナス、夏秋トマト、オクラ)

病虫害名：オオタバコガ

- 1.発生地域 県内全域
- 2.発生時期 7月上旬～
- 3.発生程度 多(前年より多く、平年より多い)

4.注意報発令の根拠

- (1) フェロモントラップの定点(6地点)調査において、6月第4半旬以降誘殺数が増加し、6月第4半旬から第6半旬までの平均誘殺数が94頭と、平年(57.8頭)の約1.6倍誘殺された(図1)。
- (2) 本年は、越冬世代成虫数が多かった(4月第5半旬から5月第5半旬までのフェロモントラップへの平均誘殺数が94.8頭と、平年(33.2頭)の約2.9倍誘殺された。)ことから、第一世代の成虫数も多く、今後、幼虫発生に伴い、被害の増加が予想される。
- (3) 高松地方气象台が6月27日に発表した1か月予報では、気温は平年より高く、降水量はほぼ平年並で、日照時間は平年並か多く、期間の前半は気温がかなり高くなると予想されており、発生助長的な気象条件である。

5.防除法等

- (1) 被害部位(果実、花蕾)や剪定後の茎葉には卵や幼虫が付着している可能性があるため、圃場外に持ち出して適切に処分する。
- (2) 果実や茎、花蕾に食入した幼虫や発育が進んだ幼虫に対しては薬効が著しく低下するので、発生初期に薬剤防除を行う。

- (3) 本虫は作物の花蕾や生長点付近の新葉に1個ずつ産卵するため、寄生部位を注意深く観察してから防除する。
- (4) 今後、7月上旬及び8月上旬頃に幼虫の発生ピークが来ると予想されるため、表1～3を参考に薬剤防除を行う。
- (5) 今後の発生動向については、農林水産総合技術支援センターウェブページ内、病害虫防除所の各種データ(<https://www.pref.tokushima.lg.jp/tafftsc/t-boujoshou/various-data/>)を参考にする。
- (6) 防除等の詳細については、徳島県植物防疫指針(<https://www.nouyaku-sys.com/nouyaku/user/top/tokushima>)を参照するとともに、薬剤の使用に当たっては、必ず農薬ラベル記載事項を遵守する。




表 1 ナスでオオタバコガに登録のある農薬(登録内容：2024年7月1日現在)

農薬の名称	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	IRAC コード
スピノエース顆粒水和剤	5000倍	収穫前日まで	2回以内	5
ディアナSC	2500～5000倍	収穫前日まで	2回以内	5
アニキ乳剤	2000倍	収穫前日まで	3回以内	6
アフーム乳剤	2000倍	収穫前日まで	2回以内	6
コテツフロアブル	2000倍	収穫前日まで	4回以内	13
マトリックフロアブル	1000～2000倍	収穫前日まで	3回以内	18
プレバソンフロアブル5	2000倍	収穫前日まで	2回以内	28
フェニックス顆粒水和剤	2000～4000倍	収穫前日まで	3回以内	28
グレーシア乳剤	2000倍	収穫前日まで	2回以内	30
プレオフロアブル	1000倍	収穫前日まで	4回以内	UN

表 2 トマトでオオタバコガに登録のある農薬(登録内容：2024年7月1日現在)

農薬の名称	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	IRAC コード
スピノエース顆粒水和剤	5000倍	収穫前日まで	2回以内	5
ディアナSC	2500～5000倍	収穫前日まで	2回以内	5
アニキ乳剤	2000倍	収穫前日まで	3回以内	6
アフーム乳剤	2000倍	収穫前日まで	5回以内	6
コテツフロアブル	2000倍	収穫前日まで	3回以内	13
マトリックフロアブル	1000～2000倍	収穫前日まで	3回以内	18
プレバソンフロアブル5	2000倍	収穫前日まで	3回以内	28
フェニックス顆粒水和剤	2000～4000倍	収穫前日まで	2回以内	28
ベネビアOD	2000～4000倍	収穫前日まで	3回以内	28
グレーシア乳剤	2000倍	収穫前日まで	2回以内	30
プレオフロアブル	1000倍	収穫前日まで	2回以内	UN

表 3 オクラでオオタバコガに登録のある農薬(登録内容：2024年7月1日現在)

農薬の名称	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	IRAC コード
アフーム乳剤	2000倍	収穫前日まで	2回以内	6
コテツフロアブル	2000倍	収穫前日まで	2回以内	13
アタブロン乳剤	2000倍	収穫前日まで	4回以内	15
プレバソンフロアブル5	2000倍	収穫前日まで	3回以内	28
グレーシア乳剤	2000倍	収穫前日まで	2回以内	30
プレオフロアブル	1000倍	収穫前日まで	2回以内	UN