

令和6年度 播磨灘広域共同調査（6月10日調査） 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (℃)	塩分	透明度 (m)	DO (mg/L)	細胞/mL								
							シャットネラ アンティーカ	シャットネラ マリナーナ	シャットネラ 区分不能	シャットネラ オバータ	シャットネラ グロボーサ	カレニア ミキモトイ	コクロディニウム ポリクリコイデス	アレキサンドリウム sp.	
T4	08:56	0-5			13.1		-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	19.23	31.83		7.9									
		1	19.21	31.73		7.8	-	-	-	-	-	-	-		
		5	19.10	31.70		7.7	-	-	-	-	-	-	0.02		
		10	19.00	31.74		7.7	-	-	-	-	-	-	-		
		15	18.98	31.77		7.6									
		20	18.91	31.79		7.6	-	-	-	-	-	-	-		
		25	18.72	31.85		7.4									
		30	18.48	31.99		7.2	-	-	-	-	-	-	0.08		
		B-1	18.18	31.98		7.1	-	-	-	-	-	-	0.04		
T1	09:27	0-5			12.0		-	-	-	-	-	-	0.12		
		0	18.78	31.72		7.7									
		1	18.77	31.73		7.6	-	-	-	-	0.02	-	-	0.08	
		5	18.75	31.69		7.6	-	-	-	-	-	-	-	0.04	
		10	18.69	31.72		7.6	-	-	-	-	0.02	-	-	0.02	
		15	18.65	31.76		7.5									
		20	18.53	31.77		7.4									
		25	18.45	31.88		7.2									
		30	18.18	31.90		7.1									
		B-1	17.93	31.91		6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	
St.4	09:45	0-5			11.7		-	-	-	-	-	-	-	0.05	
		0	18.74	31.79		7.6	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.12
		1	18.58	31.81		7.6	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.12
		5	18.44	31.79		7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.13
		10	18.36	31.82		7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04
		15	18.30	31.83		7.3									
		20	18.21	31.87		7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		25	18.13	31.88		7.0									
		30	17.94	31.92		7.0	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-
		35	17.07	32.08		5.9									
		B-1	17.07	32.07		5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02

播磨灘

◎ T4

◎ T1

◎ St.4

大浦

栗田

折野

淡路島

・ 有害種のシャットネラ グロボーサが検出されましたが、ごく僅かでした。

・ 貝毒原因種を含むアレキサンドリウム属が検出されましたが、僅かでした。

・ 珪藻は非常に低密度でした。

珪藻細胞数
St.4(0-5m) : 5 cells/ml
T4(0-5m) : 2 cells/ml